


B.P. 6

Professeur
d'histoire Naturelle

QL34
.A1
K5



LIBRARY

Kenneth K. Mackenzie
Collection

Released from Library
Horticultural Society of New York, Inc.

EX-LIBRIS



Bequest of
Kenneth K. Mackenzie
October 1934

Koeler
Graminei



GEORGII LUDOVICI KOELERI
PROFESSORIS HISTORIAE NATURALIS
IN UNIVERSITATE MOGUNTINA

DESCRIPTIO
GRAMINUM
IN GALLIA ET GERMANIA
TAM SPONTE NASCENTIUM QUAM HUMANA
INDUSTRIA COPIOSIUS PROVENIENTIUM.

FRANCOFURTI AD MOENUM
APUD VARRENTRAPP ET WENNER.
1802.

+ QL34

A1

K5

DISAPPOINTED

MUNICIPALITY

10189

VIRO ILLUSTRI,
DE SCIENTIA NATURALI
IMMORTALITER MERITO
LACEPEDE,
SENATORI, INSTITUTI NATIONALIS
ALIARUMQUE ACADEMIARUM
MEMBRO ETC.

DESCRIPTIONES HASCE

D. D.

A U C T O R.

INTERVIEW WITH

Издано в 1958 году

ОЗНАМ АКЦИЯТОВЫЕ

ANSWER

СИМФОНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА

1000+1000=2000 2000+1000=3000

— 1 —

P r a e f a t i o .

F RANCIAE BOTANICIS AC TEUTONIAE
specimen hoc trado *descriptionis graminum*
per ingentem utriusque regionis ambitum et
sponte nascentium, et humana curante indu-
stria copiosius provenientium. In quo eden-
do *hoc* mihi fuit in primis *propositum*, ut
plantarum investigatoribus minus exercitatis
libellum offerrem, quo duce patrii soli grami-
nūm, quorum cognoscendorum fuerit usus,
facilem certamque sibi compararent notitiam.

Neque igitur in exploranda eorum *indole*
nativa; nec in explicanda *vitae ratione, nec*
denique, pro vera naturae eorum diversitate,

statuendis inter ea discriminibus (quae *Varietates*, *Progenies classificae* (Races), *Species* et *Genera naturalia* vocantur); *sed in exponenda tantummodo ratione, facilime alia ab aliis discernendi, versari constitueram,*

Quare nec incongruum cuiquam videbitur, genera graminum et species memoratas a nobis, ingenio potissimum ac disciplina jubente finiri, quanquam passim etiam ex naturali inter se cognatione iunctim videoas allatas, quod non raro accidit, ut ad externae speciei similitudinem conformata virtutibus et effectibus congruentia deprehendantur.

Neque vero, saepius me forsitan plurimorum Botanicorum auctoritatem secutum,

eiusdem, si verum spectes, plantae formis, levi tantummodo naturae diversitate a specie sua recendentibus, peculiarem inter ipsas species locum tribuisse negaverim. Etenim *Formas corporum organicorum tantum recenti*, sive in universum respiciat similitudines, sive quorundam tantum partium conformatiōnem numerum etc. consentientem sequatur, solertissima partium fabrica vitalium, signa diversa, ab ipsa natura demonstrata, vix subtiliter satis persequi licuerit. Nimirum motus tantum vitae indices, viriumque varii nisus, *generandi* praecipue *facultatis indicia* et *effectus*, si cum partium conformatione conjuncte spectentur, iustas demum afferunt caussas, generum ac specierum tum familia-

rum et leviorum de hinc diversitatum praecipiente natura, discernendarum.

Sed quanta, quaeso, tenuitas est eorum, quae usque a *Koelreutero*, *Sprengelio*, et aliis egregiis scrutatoribus, ad hunc diem de plantarum universitate ad istam rationem explorata habemus et cognita, si praesertim infinitam plane cogitemus plantarum vim et copiam omnem terrarum orbem longe lateque convestientium. Adhuc quidem certe nostrae aetatis indagatoribus in singulis tantummodo naturalis scientiae partibus exornandis collectanda est opera, qua consequentium demum seculorum eruditii ad effingendum aliquando plantarum scientiae corpus integrum absolu-
tumque, recte utantur.

*Equidem Agrostographiam scripturus, signa
a Linneo, magni nominis viro, aliisque Botani-
cis prodita, haud ubique sequi potui, Na-
tura quam magistram delegeram, mirum
quantum a magnis illis artificibus saepe dis-
sentiente. Itaque ea tantum, quoties licuit,
signa notavi, quae non *perpetua* modo, sed
inventu quoque essent *facilia*.*

Descriptionibus uberioribus *Tabulas* pre-
misi *analyticas*, quibus adiuti quam facillime
singula studiosi reperirent. Quae quamvis
magno mihi sudore constiterint condendae,
haud vanum tamen eum fuisse laborem que-
rar, dummodo *temporis pretiosissimi et laboris*
frustra insumendi lucrum aliquod, me ju-
vante, Botanices studiosi faciant iuvenes.

Pluriflorium in primis plantarum haud paucas pluribus tabularum locis illatas, variis etiam easdem saepe diversisque generibus adscriptas a nobis videas. Quod non potuit non fieri, quo certius quaerentis labori adfereretur compendium, quoque saepius accidit, ut forma inconstantes dubium, cui sint accensandae generi, plantae speculatorem relinquent, aut quoties eo me destitutum judicii acumine sensissem, qui stabiles earum ac perpetuas notas constitueret. Caussae vero loci cuiusque, singulis plantis in tabulis attributi, ex copiosa satis formarum descriptione non dubito quin pateant omnes.

Fateor etiam, multa me grama ad genera retulisse ab iis, quibus *Linneus*, *Jussievus*,

aliique adscripserant, maxime diversa. Sed eam mihi statueram hujus rationis legem, ne qua externa specie, certis aliis et indubiis signis reclamantibus ducerer. Synonyma quoque, aliorumque scriptorum loca, pro testimonio allata, quam ubique plantam dicam satis declarant, quamvis equidem alio eam atque ceteri nomine appellaverim. Quid? quod *novis* mihi *generibus* constituendis opus fuit, quoties vel una aliqua species vel plures, nota, quae generis, cui adscriptae fuerant, priva esset et propria, carere deprehenduntur. Quae genera recens inventa nominibus ornavi *eorum virorum*, qui Naturae, omnium quae vigent usquam, *Genetricis fecundissimae*, quasi veri nominis *sacerdotes*

et *Mystae* (*Flora*, nil refert an *Fauna auspiciibus?*) proprius admoti, pleniores ejus *Numinis* nobis discipulis conciliarunt notitiam. Quapropter genera hic deprehendes *Ventenati*, *Fibichii*, *Cuvieri*, *Blumenbachii*que venerandis nominibus illustrata.

Diligentius itentidem speculando id praeterea mihi secutus esse visus sum, ut nondum descripta, in medium proferrem *gramina*. Quorum descriptionem disciplinae *peritioribus* trado, et cum privatis meis de reliquorum natura animadversionibus examinandam relinquo. Qui sicubi erratum fuerit, admoneant, doceantque velim, quo, si forte scriptio huic labes adhaeserit aliqua, hanc posthac deleam

studiosius. Qua in re id unum eos oro, ut de signis a me proditis facturi judicium ipsa consultrice natura potiorem audiant nominem.

Ceterum libelli formam duodenae propriorem, eamque manibus in primis habilem et circumgestando aptissimam fieri curavi, verbo, eam, quae plantas per agros investiganti commodissimam. Lingua autem usus sum latina, quae utriusque gentis Botanicis cognita et brevitatis opportunitatem praebat, et expeditissimae distinctionis pariter atque subtilissimae.

Nec omissendum putavi, microscopium in naturae indagatione adhibuisse me tale, quod corporum magnitudinem multis partibus ampliorem praeberet conspiciendam.

*Quodsi collata in hanc disciplinam opera
mea scientiae peritis haud inutilis visa com-
probabitur, integrum Floram gallico-germa-
nicam (quantum equidem utriusque regionis
plantas habeo cognitas) edere in animo habeo,
maxima parte iam absoluta.*

Scripsi Moguntiae d. XXIII. Nivosi, a. X.
Jan. vero XIII. a. 1802.

Koeler.

guinalis.

2.
iformis.

3.
iliaris.

--	--	I. <i>schoenoides.</i>
--	--	2. <i>aculeata.</i>

ppensis.

nis

--	--	I. <i>paradoxum.</i>
--	--	2. <i>lendigerum.</i>
--	--	3. <i>effusum.</i>

u m.

I.
tensis.

2.
restis.

3.
lobosus.

4.
culatus.

2.
stis. var.

--	--	<i>odorata.</i>
----	----	-----------------

--	--	I. <i>pennata.</i>
--	--	2. <i>junccea.</i>
--	--	3. <i>capillata.</i>

T a b. II. Leersia.		Species.
Leersia.	Spiculae semper clausae, superne striato-hispidae.	Oryzoides.

T a b. III. Panicum.		
Bromioides.	spiculae verticillatae;	verticillatum.
ciformis.	Paniculae zamosi, plures	1.
simplex.	panicula apiciformis,	viride.
	spiculae gerentes,	2.
densa, stricta.	Pedunculi simplices; spi-	3.
	cula polystachiae.	glaucum.
Panicum.	Panicula spiculae in ramis glomeratae.	4.
ciformis.	spiculae ramis spiciformibus, unilateribus ad-	italicum.
composita.	fixae.	Crusgalli.
	(Panicula perfecta, laxa, flaccida.	6.
		miliaceum.

T a b. IV. Digitalaria.		
Digitaria.	valvulae glumae calycinae inaequales (minima in parte con-	1.
	vexa spiculae) ad basim interiore ramorum paniculae noduli.	sanguinalis.
	valvulae glumae calycinae subaequales (gluma calycina glabra,	2.
	basis ramorum paniculae nec nodosa).	filiformis.
	gluma calycina ciliata.	3.
		ciliaris.

T a b. V. Blumenbachia.		
Blumenbachia.	Spicula hermaphroditis, certe plurimis, strictis, masculis	haleppensis.
	muticis.	

T a b. VI. Alopecurus.		
Alopecurus.	Culmus ad maximum par-	1.
	tum rectus.	pratensis.
	radix fibrosa.	2.
	spiculae glabrae in carinis	agrestis.
	tantum ciliatae, Culmus	3.
	scabriusculus.	bulbosus.
	radix bulbosa fibrosa.	4.
	spiculae villosae; culmus flexuo-	geniculatus.
	se geniculatus.	geniculatus.
	spiculae in carina dorsalii tantum ci-	2.
	listae, Culmus curvato-geniculatus.	agrestis. var.

T a b. VII. Phalaris.		Species.
Phalaris.	Panicula spiciformis	valvulae glumae calycinae dorso
	semper contracta	valde membranaceo-carinatae;
		canariensis.
		2. arenaria.
		3. paradoxa.
		4. ulriculata.
		5. arundinacea.
		Panicula florens manifeste ramosa, ramulis pretentioribus.

T a b. VIII. Phleum.		
Phleum.	Panicula spiciformis-nuda.	radix ramosa fibrosa.
	in flexione	pratense.
	lobata	radix manifeste bulbososa,
		fibrosa.
	Panicula spiciformis-nuda	panicula submollis; val-
	in flexione	vesigata; cal. ferulaginea;
	lobata	particula arida. valv. gl.
		chil. dorso gibboso-cur-
		vato.
	Panicula spiciformis villosa.	4. asperum.
		5. alpinum.
	Panicula ramosa.	6. monspeliense.

T a b. IX. Crysipis.		
Crysipis.	Panicula spiciformis ovata.	1. schoenoides.
	Panicula capituliformis.	2. aculeata.

T a b. X. Milium.		
Milium.	Spiculae aristatae.	1. paradoxum.
	Panicula contracta spiciformis	2. lindigerum.
	Spiculae muticas.	3. effusum.

T a b. XI. Anthoxanthum.		
Anthoxanthum.	Panicula spiciformis oblonga.	odorata.

T a b. XII. Stipa.		
Stipa.	arista corollacea plumosa	1. pennata.
	arista corollacea nuda	2. juncea.
	recta. pagina interna (superior) folio-	3. capillata.
	rum glabra	
	flexuosa. pagina interna (superior) fo-	
	lorum pubescens	

A g r		<u>S p e c i e s .</u>
implices.	In	I. stipata.
—	—	2. bromooides.
is (certe per ler	izontales	3. rubra.
	contracti.	4. miliacea.
	antes.	5. Spica-Venti.
lulum infra apic	a rhacheos	6. interrupta.
—	—	7. compressa.
erta.	arista longa	8. canina.
	aut longior	9. vinealis.
	instructa.	10. gigantea.
	arista perb	II. pallida.
—	as longae	12. alpina.
	spiculae onum i lin.	Molin. caer. (var.) vid. Tab. XX.
	—	9. vinealis. var.
	spiculae al	Poa. nem. var. vid. Tab. XXII.
ummum semipe	insidentes	14. sylvatica.
lis decumbens,	—	15. pumila.
, supremum in	—	16. minima.
rectus aut basi	—	19. stolonifera.
ecumbens, genic	celli recti	18. divaricata.
	elli mani-	20. coarctata.
	—	13. capillaris.
		17. alba.

T a b. XIII. A g r o s t i s.

				Species.
	Pedunculi rhachi adfixi simplices, aut fere simplices. In quovis pedunculo ad summum spiculae 1 - 5.	arista laevis arista scabra		1. stipata. 2. bromoides. 3. rubra. 4. miliacea. 5. Spica-Vent.
Agrostis.	valvula exterior ecollacea aut arista longa aut brevi mucriformi instruens.	arista perfecte terminalis (certe per lentem) arista (aut mucro) paululum infra spicem inserta (certe per lentem.) arista medio dorsi inserta arista basi inserta	mod. antecedens arista curvata arista longitudine spiculae, aut longior (certe in antesi). spiculae omnes sequales.	6. pedunculi florentes horizontaliter arista recta stricta, pedunculi florentes paululum contracti. arista spicata (pedunculi longi rhachim occultantes, longior, pedunculi breviores; internodia rhacheos inde non occultata). arista macroformis per brevevis. nodi culmei 4 - 5. basis peduncularum nuda (basis peduncularum nodo purpureo circulares instructa). arista per brevevis mucriformis. spiculae 2 - 3 lineas longae spiculae ad summum 1 lin. longae
	Pedunculi rhachi adfixi ramosissimi, spiculis numerosis.			7. compressa. 8. canina. 9. vinealis. 10. gigantea. 11. pallida. 12. alpina. Molin. caer. (var.) vid. Tab. XX.
	Gluma corollacea non aristata.	culmus ultrapalmaris. culmus pollicaris, ad summum semipedalis culmus plurimis geniculis decumbens, aut prostratus, oblique adscendens, supremum internodum tantum erectum. culmus (certe florens) erectus aut basi tantum incurvus aut paucis geniculis decumbens, geniculis superioribus vix incurvis.	culmus non nutans. culmus superne nutans. spiculae alias (focundatae) manifeste longioribus alteris (virginis.). spiculae pedicellatae pedunculis semiverticillatis insidentes spiculae pedicellatae unilateraliter rhachi adfixae. spiculae ad summum lineam longae. spiculae ultrolineares.	13. vinealis. var. Pos. nem. var. vid. Tab. XXII. 14. sylvatica. 15. pumila. 16. minima. 17. stolonifera. 18. divaricata. 20. coarctata. 13. capillaris. 17. alba.
	Radix repens aut stolonifera.	folia angusta fere setacea folia planiora, latiora	pedunculi et pedicelli recti pedunculi et pedicelli manente flexuosi.	(3)

Cal

Species.

es, nervos	1. <i>arenaria.</i>
{ gluma c	9. <i>Lagurus.</i>
{ gluma c	8. <i>Epigejos.</i> var.
{ valvula	5. <i>Pseudophragmitis.</i>
{ valvula e e dorso as lata.)	4. <i>stricta.</i>
{ valvula e e dorso as lata.)	5. <i>lanceolata.</i>
{ lanata	8. <i>Epigejos.</i>
issima, c antum pilis ae),	2. <i>Arunde.</i>
	6. <i>Leersii.</i>
	7. <i>arundinacea.</i>

T a b. XIV. Calamagrostis.

			Species.
callosa velutina		valvulae corollaceae fere aequales, nervosae, (Pappus, lineam longus).	1. arenaria,
callosa velutina varians ciliata ciliata non lutea	1.10	valvula exterior corollacea non aristata, valvulae corollaceae valde inaequales enerviae. (Papp. longitud. valvul. aut longiore)	2. Lagurus,
		gluma corollacea calycina latior gluma corollacea calycina angustior	3. Epigejos, var.
Calamagrostis.			4. Pseudophragmitis,
aperta de his typis (a) (b) (c)		valvula ultraque corollaces glabra quamvis interdum scabria. (Pop- pus ad basin glumar, coroll.)	5. sticta,
valvula exterior corollacea aristata, (certe per lentem.)	1.10	valvula exterior corollacea ex apice aristata, i.e. spiculae ovali-lanceolatae	6. lanceolata,
		valvula exterior corollacea e dorso aristata, — spicul. angusto-lanceolatae	7. Epigejos,
		folia angusta, (2'-3' lineas lat.) folia latiora, (6-12 lineas lat.)	8. Arundo,
		valvula exterior corollacea tota lanata	
		valvula interior corollacea pilosissima, certe basi et prope basin: exterior glabra aut basi tantum pilis nonnullis cincta.	9. Leersii,
		arista recta, spiculae ovatae, (vix linea longiores), arista geniculata, spiculae lineares, (2' lineas longae),	10. arundinacea.

	<i>Species.</i>
nus teres.	1.
ita. —	ciliata.
culmus	2.
teaglabra.	uniflora.
Melica.	3.
scundus.	nutans.
xissimus	4.
superiore	pyramidalis.
abescentia	1
ntissima	ciliata. var. 5
	hirsuta.
—	
Molinia —	coerulea.
—	
Briza. —	tremula. maxima.

T a b. XV. Lagurus.

Lagurus. | Panicula spiciformis, pilosissima et avistata, — ovatus,

T a b. XVI. Andropogon.

Andropogon.	panicula simplex laxa	1. inceptiflora	Gryllus,
	ramis spiciformibus 2.	—	hirtum,
	ramis spiciformibus plurimis,	Ischaemum,	

T a b. XVII. Saccharum.

Sacharum. Panicula ramosa, sericea, — — Ravennae,

T a b. XVIII. Aira.

Aira.	panicula certe culmus vix digitalis aut palmaris; hand pedalis, in aethesidi-	2. caryophylla,	
	varicata, Culmus ultrapedalis	folia superiore pagina sulcato-	1. caespitosa,
	xissima,	strata, —	3. flexuosa,
Aira.	panicula contracta, (pedunculi longi, semiverticata).	folia setacea angustissima,	4. montana,
	contracta, aut	—	5. praecox,
	spiciformis, —	aristis gluma calycina longioribus, teretibus,	6. canescens,

1. —

2. —

3. —

4. —

5. —

6. —

T a b. XIX. Melica.

Melica.	gluma calycina uniflora, tenui rudimento corollae alfeius,	panicula spiciformis erecta, culmus teres, valvula exterior corollacea ciliata, — racemos laxans secundus, nutans culmus iniquiter, valvula exter, corollacea glabra,	1. ciliata,
	gluma calycina biloba, cum rudimento tertiae, raro et quartae corollae	racemos pauciflorus erectus laxissimus folia in superiore	2. uniflora,
	racemos spiciformis erectus	racemos spiciformis pagina pubescens folia hirsutissima	3. nutans,
Melica.	gluma calycina biloba, cum rudimento tertiae, raro et quartae corollae	racemos pauciflorus erectus laxissimus folia in superiore	4. pyramidalis,
	racemos spiciformis erectus	racemos spiciformis pagina pubescens folia hirsutissima	5. ciliata, var,
	racemos spiciformis erectus	racemos spiciformis pagina pubescens folia hirsutissima	5. hirsuta,

T a b. XX. Molinia.

Molinia. gluma calycina corollacea certe triplo brevior, — — — corylea.

T a b. XXXI. Briza.

Briza. spiculae ex rhomboideo-triangulares, aut subrotundae, — — tremula, maxima,

spiculae ex ovato-oblongae, — — —

P o a.

S p e c i e s .

rollacea marginata	Melica ciliata. (var.)
	vid. Tab. XIX.
ollacea haud ciliata	18. cristata.
ulis pollicares —	34. curvata.
ves { spiculae 2 - 3 li	21.
ves { oblique adscendentes	compressa. (var.)
ves { spiculae 3 - 5 li	23. dura.
pitosi decumbens	35. disticha.
ata — —	33. loliacea.
rugata — —	Festuca pinnata var.
atera planae --	vid. Tab. XXIV.
— — —	29. foliacea.
— — —	phoenicooides.
— — —	31. intermedia.
— — —	27. littoralis.
— — —	22. bulbosa.
— — —	20. rigida.
culmus spithamea	Triticum unilaterale. var.
	vid. Tab. XXXIV.
	30. alutacea.
	16. alpina.
	2. trivialis.
	24. nemoralis.
	1. palustris.
superiora plana	8. angustifolia.
calia,	9. omnia convergens
a.	6. to-setacea
— — —	7. strigosa.
	Avena odor. var.
	vid. Tab. XXVII.

<i>Panicula spiciformis sequialis</i>		valvula exterior corollacea marginata valde ciliata	Molles ciliatae (ver.)
<i>Panicula spiciformis unilateralis aut secunda</i>		valvula exterior corollacea head ciliata	vid. Tab. XII.
		[pedunculi cum spiculis palustre] — 2 + linearis longior, ex ovario — pedunculi few linearis, Calix obliquus adscendens, superne erectus	cristata.
		spiculus 3 + linearis longior, ex anfractuoso — linearis obtusus. Culmi cespitosi decumbentes	cristata.
<i>Panicula spiciformis disticha</i>	spiculas compressas	spicis ovatis	compreensa. (ver.)
		spicis elongatis	dura.
		spiculas teretis aut una tantum latero planae	disticha.
			litterata.
			retusa pinnata ver.
			vid. Tab. XXIV.
			39.
			phoenicoides.
			intermedia.
			litterata.
			budosa.
			rigida.
			Tridens paniculatus var.
			vid. Tab. XXXIV.
			spicata.
			37.
			flavicans.
			Bromus arundinaceus (var.)
			vid. Tab. XXXIII.
			21.
			compressa.
			curvata.
			22.
			budosa.
			30.
			rigida.
			Tridens paniculatus var.
			vid. Tab. XXXIV.
			spicata.
			38.
			flavicans.
			Bromus arundinaceus (var.)
			vid. Tab. XXXIII.
			21.
			compressa.
			curvata.
			22.
			budosa.
			31.
			anastom.
			Bromus arundinaceus (var.)
			vid. Tab. XXXIII.
			23.
			Adonis amurensis
			vid. Tab. XXVII.
			12.
			flavicans.
			34.
			genuivalvis.
			annata.
			23.
			budosa.
			Bromus studioi var.
			vid. Tab. XIII.
			Bromus elatior var.
			vid. Tab. XXIII.
			rubens
			24.
			communis.
			25.
			secunda.
			26.
			sylvestris.
			27.
			pratensis.
			Bromus tectorum var.
			vid. Tab. XXIII.
			4.
			Genuina.
			rhizans.
			28.
			alivodes.
			29.
			flavicans.
			Avena sterilis var.
			vid. Tab. XXV.
			17.
			diantha.
			Bromus inermis var.
			vid. Tab. XIII.
			Bromus sterilis var.
			vid. Tab. XXIII.
			scrofularis.
			33.
			Eragrostis.
			19.
			Megathyrsus.
			34.
			spicata.
			35.
			erectilis.
			36.
			memorialis.
			37.
			palustris.
			38.
			australis.
			39.
			divaricata.
			40.
			setacea.
			41.
			strigosa.
			Avena sativa var.
			vid. Tab. XXVII.
			(6)

alvulis longiores		17. erectus.
alvulis breviores		16. pratensis.
longae		1. montanus.
ongae	{ spiculae spiculae	13. inermis.
glabrae aut mat-		9. sterilis.
		8. tectorum.
e aut pubes-	culmum 6 orae	Agrostis spic. vent. var. vid. Tab. XIII.
aut villosae		
sutae, certe	osae	
ores.	eam	
		5. arvensis.
et maculata	culmæ	12. mollis.
lato - plicata		6. squarroſus.
nto nempe aristae		15. racemosus.
		14. versicolor.
gosae aut pubescent		II. multiflorus.
		13. inermis.
		10. asper.
		2. giganteus.
		7. secalinus.
		19. decumbens.
		2. giganteus.
		20. glomeratus.
		18. pseudarvensis.
		Avena (Sativ. var.) vid. Tab. XXVII.
		13. inermis.
		2. giganteus.
		3. elatior.
ſculmus basi in		4. arundinaceus.
	ea).	Poa curvata var. vid. Tab. XXII.
ſculmus decur		

T a b. XXIII. Bromus.

												Species
Folia superiora inferioribus manifeste latiora.												17. crectus.
												16. pratinensis.
												1. montanus.
												13. inermis.
												9. sterilis.
												8. tectorum.
Bromus.												Agrostis spic. vent. var. vid. Tab. XIII.
												5. arvensis.
												12. mollis.
												6. squarrosum.
												15. racemosus.
												14. versicolor.
Folia superi- ora certe inferiora, su- periore pagi- na aut pubes- centia aut vil- losa aut hirs- uta.	valvulae exter- coroll. spic. bi- fido.		Folia ad basin nec maculata, necaauriculata,									11. multiflorus.
												13. inermis.
												10. asper.
Folia superi- ora non la- tiora.												2. giganteus.
												7. secalinus.
												19. decumbens.
												2. giganteus.
												20. glomeratus.
												18. pseudoarvensis.
Foliaglabra.												Avena (Sativ. var.) vid. Tab. XXVII.
												13. inermis.
												2. giganteus.
												2. elatior.
												4. arundinaceus.
												Poa curvata var. vid. Tab. XXII.

	10.
stac aut	<i>pinnata.</i>
	12.
stae long	<i>sylvatica.</i>
	11.
culmus	<i>gracilis.</i>
	13.
	<i>distachya.</i>
culmus : Triticum unilaterale var.	
2-5 in	vid. Tab. XXXIII.
	14.
	<i>pseudostachya.</i>
— Poa cristata var. v. T. XXII.	
	3.
	<i>rubra.</i>
etaceis au	7.
	<i>heterophylla.</i>
Poa intermed.	var. vid.
	Tab. XXII.
	1.
	<i>myurus.</i>
longiore	8.
	<i>sciurooides.</i>
	9.
	<i>bromooides.</i>
	5.
	<i>amethystina.</i>
	16.
	<i>tenuifolia.</i>
	6.
	<i>dumetorum.</i>

T a b. XXIV.

Festuca.

							Species.
							10. pinnata.
							11. sylvatica.
							11. gracilis.
							13. distachys.
							Triticum unilaterale, var. vid. Tab. XXXIII,
							14. pseudostachys.
							Postristata, var. T. XXII.
							3. rubra
							7. heterophylla.
							Fox intermed. var. vid. Tab. XXII.
							1. myurus.
							8. sciurooides.
							9. bromooides.
							5. amethystina.
							16. tenuifolia.
							6. dumetorum.
							4. duriorcula.
							2. ovina.
							15. multiflora.
							Poa megastachya, var. vid. Tab. XXII.
							Bromus elatior, var. vid. Tab. XXIII.
							Poa curvata, var. vid. Tab. XXII.
							Bromus glomeratus, var. vid. Tab. XXIII.

T a b. XXV.

Ventenata.

Ventenata.	aristae in quavis spicula e basi dorso et spicula valvularum provenientes.						1. bromooides.
	aristae in quavis spicula e dorso et spicula valvularum provenientes.						2. avenacea.
							Bromus pinnatus, var. vid. Tab. XXII.
							Avens strigosa, var. vid. Tab. XXVII.
							Avens mollis, var. vid. Tab. XXVII.

Tab. XXVI. Arundo.

Arundo.	culmus rigido-herbaceus.	—	—	—	—	I. Phragmitis.
	culmus sublignosus.	—	—	—	—	2. Donax.

			17.
			<i>mollis</i> var.
			13.
			<i>fragilis</i> .
			5.
			<i>strigosa</i> .
			II.
			<i>brevis</i> .
			4.
			<i>sesquitertia</i> ,
			7.
			<i>sativa</i> .
			6.
			<i>fatua</i> .
			9.
			<i>nuda</i> .
			10.
			<i>orientalis</i> .
			7.
			<i>sativa</i> .
			15.
			<i>airoides</i> .
			17.
			<i>mollis</i> .
			18.
			<i>lanata</i> .
			1.
			<i>pubescens</i> .
			19.
			<i>elatior</i> .
			3.
			<i>flavescens</i> .
			14.
			<i>alpina</i> .
			12.
			<i>versicolor</i> .
			6.
			<i>adorata</i> .
			8.
			<i>bromoides</i> .
			2.
			<i>pratensis</i> .
			19.
			<i>elatior</i> .

U. S.

<i>ecies</i> .		1.
		<i>stricta</i> .
<i>ellata</i> .		2.
		<i>aristata</i> .
		3.
		<i>gangites</i> .

T a b. XXVII. A v e n a.

			<i>Species.</i>
	<i>Gluma calycina trivalvis.</i>		17. mollis var.
	{ <i>Spica disticha, spiculis omnibus sessilibus.</i>		13. fragilis.
Avena.		{ <i>spiculae pendulae aut omnes horizontales, pedunculis curvatis aut valde nutantibus insidentes.</i>	5. strigosa.
		{ <i>valvulae exteriore corollaceae spicis biaristatae.</i>	11. brevis.
	<i>Gluma calycina bivalvis.</i>		4. sesquiteria.
		{ <i>spiculae exteriore corollaceae, spicis aut bi- aut triido aut integro.</i>	7. sativa.
	<i>Paniculus plus minus manifesta.</i>		6. fatus.
		{ <i>Vaginæ glabrae (semina angusta oblonga).</i>	9. nuda.
		{ <i>valvulae exteriore corollaceae pubescentes.</i>	10. orientalis.
		{ <i>Vaginæ glabrae (semina angusta oblonga).</i>	7. sativa.
		{ <i>valvulae exteriore corollaceae pilosissimæ.</i>	15. airoides.
		{ <i>arista recta, nec torta. Valvulae corollaceae maturæ dehiscentes.</i>	17. mollis.
		{ <i>valvulae exteriore corollaceae glabrae.</i>	18. lanata.
		{ <i>aristæ si adsunt geniculatae tortæ. spiculae horizontales.</i>	1. pubescens.
		{ <i>valv. coroll. maturæ nec dehiscentes.</i>	19. elatior.
		{ <i>spiculae pendulae.</i>	3. flavescens.
		{ <i>Culmus digitalis-pedalis. Vaginæ glabrae.</i>	14. alpina.
		{ <i>Folia, certe inferiores, villosa.</i>	12. versicolor.
		{ <i>Culmus 1 - 4 pedalis. Vaginæ villosæ aut pubescentes.</i>	6. adorata.
		{ <i>glumæ calycinae ciliatae.</i>	8. bromoides.
		{ <i>vaginæ pubescentes. (aristæ aetate recurvatae?)</i>	2. pratensis.
		{ <i>glumæ calycinae villosæ. (aristæ aetate incurvatae?)</i>	19. elatior.
		{ <i>aristæ 8 - 10 lineas longæ, spicul. hermaphr. 6 lineas longæ.</i>	
		{ <i>glumæ calycinae glabrae.</i>	
		{ <i>aristæ 7 lineas longæ, spiculae polygam. 4 lineas longæ.</i>	
		{ <i>aristæ 4 lineas longæ, spiculae hermaphr. 3 lineas longæ.</i>	
		{ <i>aristæ rectæ</i>	
		{ <i>Folia glabra.</i>	
		{ <i>vaginæ superiores foliis praeditæ.</i>	
		{ <i>Aristas 1 - 5 lineas longæ.</i>	
		{ <i>vagina superior ventricosa aphylla.</i>	
		{ <i>Aristas 6 et plures lin. longæ.</i>	
		{ <i>Folia convoluto-aut complato-filiformia.</i>	
		{ <i>spiculae 4 - 8 floræ, (plerumque 7 - 8 floræ).</i>	
		{ <i>spiculae 3 - 7 floræ, (plerumque 3 - 5 floræ).</i>	
		{ <i>Folia plana.</i>	

T a b. XXIX. N a r d u s.

		<i>Species.</i>	
	<i>Fibichia.</i>	{ <i>Spicas plures unilaterales umbellatae,</i>	1. stricta.
		{ <i>umbellata.</i>	2. aristata.
Nardus.		{ <i>spica recta.</i>	3. gangites.
		{ <i>spica incurvata.</i>	
		{ <i>spica curvata.</i>	
		{ <i>spica recurvata.</i>	

rius.	—	<i>echinatus.</i>
nus.	—	<i>2.</i>
—	—	<i>cristatus.</i>
Cy	—	<i>3.</i>
—	—	<i>coeruleus.</i>
ns.	—	<i>4.</i>
um.	—	<i>microcephalus.</i>
icum.	—	<i>5.</i>
um.	—	<i>sphaerocephalus.</i>
—	—	—
—	a	—
La	—	<i>aurea.</i>
—	—	—
—	.	—
Ce	—	<i>capitatus.</i>
—	—	—
Tr	—	<i>racemosus.</i>
—	—	—
Ze	—	<i>Mays.</i>

T a b. XXX.

<i>Hordeum</i> :		<i>Species.</i>
spiculae ordinum lateralem	[spica latitudine fere aequali. Aristas erectae - substrictis lanceolata. Aristae patentes]	3. distichon.
muticar. — — —	[spica (sabae strictis) lanceolata. Aristae patentes]	4. Zeocriton.
	[spica ex tereti quadrangularis crassa. aristae nec pollicem longae. — — —]	2. hexastichon.
spiculae omnes	vaginae cum foliis glabrat. Invulneri folioli (cum foliis certe aequali, aut inferiore pubescens testa hirsuta). Invulneri folioli (valvulae calyci) altera spiculorum lateralium margine exteriore membranaceo alata.	1. vulgare.
aristatae	[intermedia pubescens et ciliata. valv. exter. coroll. spiculata. rump. lateral. dorso scabro vix pubes. atri glabrae. valv. exter. coroll. spiculata. an. glabra. lateral. dorso scaberrimo villosa.]	5. secalinum.
		6. murinum.
		7. maritimum.
		8. rigidum.

T a b. XXXI. Cuviera.

Cuviera. [spica cylindrica rigida. — — — — —] europaea.

T a b. XXXII. Elymus.

Elymus.	[Valvulae subpungentes. — — — — —]	1. arenarius.
	[Valvulae aristatae. — — — — —]	2. caninus.

T a b. XXXIII. Triticum.

Triticum.	[Spica disticha crassa, plus minusve quadranglearia. — — — — —]	1. sativum.
	[Rami quadrangulares crassi. — — — — —]	2. polonicum.
	[spica ramosa. Rami graciles. — — — — —]	1. sativum.
	[spica ramosa. Rami graciles. — — — — —]	3. maritimum.
	[spica secunda. — — — — —]	9. cristatum.
	[spiculae irregulariter quadrangulares. — — — — —]	5. repens. var.
	[spiculae compresse aut teretiusculae. — — — — —]	7. unilaterale.
	[spiculae compresse aut teretiusculae. — — — — —]	3. monococcum.
	[folia plana. — — — — —]	4. dicoccum.
	[folia convoluta. — — — — —]	8. Elymus canin. var. vid. Tab. XXL
	[Spica secunda aut unilateralis. — — — — —]	5. repens.
		6. junceum.
		7. unilaterale.

T a b. XXXIV. Aegilops.

<i>Aegilops</i> :		<i>Species.</i>
	[spica (absque aristis) ad summum pollicaris. — — — — —]	1. ovata.
	[spica tres pollices longa. — — — — —]	2. elongata.

T a b. XXXV. Lolium.

<i>Lolium</i> :		<i>Species.</i>
	[compresso - planae, 4-13 florae. — — — — —]	1. perenne.
	[spiculae muticæ. — — — — —]	2. laeve.
Lolium.	[Culmus laevus. — — — — —]	3. multiflorum.
	[spiculae aristatae. — — — — —]	4. temulentum.

T a b. XXXVI. Secale.

<i>Secale</i> :		<i>Species.</i>
	[Valvulae extiores corollaceae pilis rigidis ciliatis, dorso scaberissimae; calycinæ fere linearis. — — — — —]	1. cereale.
	[Valvulae calycinæ cuneiformes, corollaceae extiores molliissime ciliatis. — — — — —]	2. villosum.

T a b. XXXVII. Cynosurus.

Cynosurus.	[Bracteæ pinnatæ. Spica brevis, ovata, aristata. — — — — —]	1. echinatus.
	[Panicus spiciformis. — — — — —]	2. cristatus.
	[Panicus angusta, latitudinis fere aequalis, vix aristata. — — — — —]	3. coeruleus.
	[Bracteæ integræ. Spica ex ovo - oblonga coerulea. — — — — —]	4. microcephalus.
	[Bracteæ dentatae. Spica ovata coerulea. — — — — —]	5. sphaerocephalus.
	[spica globosa, albida aut coerulescens. — — — — —]	

T a b. XXXVIII. Lamarckia.

Lamarckia.	[Spiculis sterilibus pendulis, fertilibus erectis. — — — — —]	aurea.
------------	---	--------

T a b. XXXIX. Cenchrus.

Cenchrus.	[Spica ovata echinata. — — — — —]	espitus.
-----------	-----------------------------------	----------

T a b. XXXX. Tragulus.

Tragulus.	[valvulae calycinæ muricatae. — — — — —]	racemosus.
-----------	--	------------

T a b. L. Zea.

<i>Zea</i> :		<i>Species.</i>
	[Panicula terminalis, et spicæ axillares. — — — — —]	Maya.

(10)

AD TAB. I.

Gramina. Graminées. Gräser.

Schreber Beschr. der Graeser. T. I. et 2. Scheuchz.
agrost. Mill. illustr. ic. t. 4 - 7. Lamarck flor.
Franc. n. 1157. Venteu. Tabl. du regn. veg. 2. 93.
Gaertn. T. I. p. 1. sqq. tab. 1. T. II. pag. 2. tab. 80.
pag. 4. tab. 80. pag. 467. tab. 175. Leers flor. herb.
12. sqq. t. 1. sqq. Hoffm. Deutschl. Flor. edit. 2 - 10.
1 - 12.

Plantae plerumque herbaceae, rarissime frutescentes. *Radix* aut annua, aut biennis, aut perennis, fibrosa, capillaris, rarius repens et geniculata, nuda aut squamis tecta, non saepe bulbosa. *Culmus* (saepe plures ex una radice) teres, interdum compressus, raro planus, plus minusve articulatus, nodis solidis, internodiis fistulosis (except. *Zea*.) *Folia* alterna, simplicia, aut plana lanceolata, aut complicata et saepe canaliculata, aut convoluto-filiformia vel setacea; plerumque nervis et striis alternis parallelis notata, basi vaginis inserta. *Vaginae* plerumque foliorum structura et colore, culmum ambientes, raro totae tubulosae, plurimum latere anteriore (folio opposito) ab apice usque ad medium aut ad basin fissae, nodis culmi insertae, non saepe aphyllae. *Ligula* membranacea, dia phana, tenerrima, erecta, apice vaginae sive basi folii, latere anteriore, adfixa; nonnunquam loco ejus margo cartilagineus aut pili. *Flores* glumacei,

A

Spiculae nominati, plerumque *polygamici*, et quidem triandro-digyni; saepe autem *hermaphroditi* et quoque triandro-digyni, raro triandro-monogyni aut trigyni, aut diandro-digyni; non saepe involucrati, aut bracteati; ante anthesin vagina folii vicini tecti, in et post anthesin vero elevati, aut in *Spicam* (spiculis nempe perfecte sessilibus) plerumque *elongatum*, raro *capituliformem*, aut in *Paniculam*, (spiculis certe pluribus pedicellatis) vel *manifestam* (pedicellis satis longis, et plus minusve patentibus), vel *spiciformem*, (pedicellis perbrevibus aut rhachi adpressis). *Receptaculum* commune, cui spiculae sessiles aut pedunculatae adnexae sunt, *Rhachis* vocatur. *Receptaculum* vero pro insertione singularum glumarum *Axeos* nomen habet. *Perigynanda* organa sexus tegentia *Glumae* appellata, haud raro diversa in spiculis reperiuntur, alterum nempe *calycinum*, alterum *corollaceum*, raro unicum; utrumque membranaceum, viride, frequenter etiam purpurascens aut violaceum, rarius flavescentes etc. *Gluma calycina* plerumque praesens, raro carens (*perigynandum externum*, aut *calyx Linnei*), saepius di-quam monophylla aut triphylla observantur, *phyllis valvularum calycinarum* nomen gerentibus, plus minusve squamiformibus et concavis, alternatim approximatis, aut fere oppositis, rarius involucrum mentientibus; glumam aut glumas corollaceas vel includentibus vel partim tegentibus. *Gluma corollacea* (*perigynandum internum*; *corolla L.*) semper praesens, calycina superior, in spicula 1, 2 - 25, diphylla, quandoque monophylla, *phyllis valvulae corollaceae* appellatis, plus minusve quoque concavis, vel alternatim approximatis, vel oppositis, aut organa sexus, et post anthesin semen includentibus, aut, praecipue superiores in spiculis plurifloris, inanibus, sterili-

bus. *Aristae mucrones* nempe, setacei, parvi aut longi, interdum aut apici insertae sunt, aut dorso, aut basi paginae exterioris, rarissime interioris valvularum tam corollacearum (plerumque exteriorum) quam calycinarum. *Stamina* infra Ovarium, si adest, inserta, frequentissime tria, raro 2. *Filamenta* capillaria. *Antherae* oblongae, versatiles, furcatae, raro integrae aut globosae. *Ovarium* (*Germen Lin.*) simplex, liberum, basi *Squamulis* (*nectariis L.*) 2, raro unica, rarissime 3, verticalibus, interdum horizontalibus, saepe vix manifestis, plerumque tenerrimis, membranaceis, pellucidis, rarissime cartilagineis, obvallatum. *Styli* capillares, plurimum reflexi, saepe duo, interdum unicus, rarissime tres. *Stigmata* plumosa aut pubescentia, raro glabra. *Gluma corollacea* loco pericarpii semen fovens, aut ei adnata nec dehiscens nec demittens, aut arcte tantum includens et interdum haud demittens. *Semen* unicum saepe incrustatum, et oblongum. *Embryo* monocotyledoneus, parvus, inferne lateri *Perisperm* farinosi, multo majoris, adnatus. *Vitellus squamaceus, scutellis* pluribus constans, interiore facie embryoni, exteriore perispermo adhaerens. *Lobus* embryonis in germinatione persistens, uni lateri baseos primae vaginæ, *Plumulam* compressam tegentis, adnexus. *Radicula* infera.

Gramina, a Semigraminibus diversa sunt:

Culmo nodoso, certe ad radicem, (in Semigraminibus enodi; except. nonnullis e. gr. *Schoen. marisc.*), *fistuloso* (exc. *Zea*) (in Semigram. semper medulla impleto). *Glumis calycinis* si adsunt magis declaratis: *corollaceis* (exc. nonnullis) *bivalvibus* (in Semigram: aut uni - aut 3, aut plurivalvibus).

AD TAB. II.

I. Leersia. Leerse. Leersie. (Homalocenchrus. Mieg. Haller. Phalaris. L. Gramen. Bauh.)

Leersia in memoriam celeberrimi Agrostographi herborniensis. Roth. 3. p. 564. Pollich. I. 52. Hall. helv. 2. p. 201. Mieg. act. helv. IV. p. 317. Flor. der Wetter. I. p. 41.

Spiculae ovatae, compressae uniflorae, uno late-re magis convexae, obtusae. *Perigynandum glumaceum* unicum, corollaceum, bivalve, clausum. *Valvulae* in secedendo tenaces, naviculares, compressae, membranaceae, dorso argente carinatae, longitudine fere aequales; *exterior* latior. *Squamulas lanceolatae*, diaphanae, acutae. *Filamenta* tria. *Antherae oblongae*. *Ovarium* ovale. *Styli* 2 breves. *Stigmata* plumosa. *Semen* nudum, obovatum, compressum, gluma tectum.

Panicula effusa, magna, composita.

Leersia oryzoides. Leerse herissée. Reisartige Leersie ***.

Leersia oryzoides, panicula effusa, spiculis triandris, glumarum carinis ciliatis. Roth. 3. p. 564,
panicula effusa, spiculis triandris patulis, glumis carina ciliatis. Hoffm. 29.

Phalaris oryzoides, panicula effusa, glumarum carinis ciliatis. Linn. ed. Reich. I. 151. ed. Gil. 3. 66. s. v. ed. Pers. 106. panicula effusa; glumarum carinis ciliatis, petalis deficientibus. Roth. I. p. 26. 2. p. 68. Beitr. I. p. 6. Kröcker Sil. I. p. 82. t. 18.

Homalocenchrus, Hall. helv. vol. 2. pag. 202.

oryzoides Poll. I. p. 53.

Ehrhartia clandestina Wigg. prim. p. 64.

Oryza glumis carina hispidis Gron. virg. 153.

Asperella oryzoides. Dietr. 3. p. 419.

Gramen palustre panicula speciosa. G. Bauh. p. 3.

prodr. 7. theatr. 39.

miliaceum palustre serotinum, paniculis ex locustis compressis compositis.

Mont. prodr. 51. Seguier. Veron. I. p. 351.

aquaticum, asperum, serotinum et elatius, radice repente, oryzae panicula villosa flavescente, semine griseo milii aut lini. Mich. fl. florent. Till. hort. pis. 73.

paniculatum aquaticum asperum, locustis planis, et orbiculatis. Pointed. Comp. t. 57.

Gramini tremulo affine, paniculatum elegans majus.

Sloane. jam: 34. hist. I. p. 113. t. 71. f. 1.

Schwarz pr. p. 21. flor. ind. occid. I. t. 4. Elwerth baruth. p. 7. Lamarck 3. p. 567. Hopp. herb. c. 2. 9. Gmelin. it. 3. p. 347. Hoffm. 29. Scholl. suppl. n. 1019 Jacq. vind. 12. et 206. Fl. d. Wett. I. 73. Schreber B. d. Gr. Vol. 2. t. 22.

Radix perennis, geniculata, repens, fibrosa. *Culmi ramosi*, erecti, aut inferne decumbentes et radicantes, dein adscendentibus, teretes, saepe autem uno latere striato - sulcati, nodis fuscis pilosis, *internodiis laevibus*, glabris, 2 - 4 pedes alti. *Folia aspera*, 5 - 8 pollices longa, 2 - 5 lineas lata, plana, sicca convoluta, mucronata, subtus nervo albo crasso carinata, glauca, saepe maculis fuscis notata, margine praecipue aculeato - scabra, patentia. *Li-*

gula obliqua, parva, albida. Vaginae striatae, retrorsum scaberrimae. Panicula palmaris et longior ramosa, superne primum contracta, et in summi folii vagina latitans, dein divaricata, spiculis plerumque semina imperfecta gerentibus; inferne maxima ex parte semper in vagina latitans, spiculis semina perfecta producentibus. Rhachis teres et flexuosa praecipue inferne. Pedunculi alterni, solitarii, raro gemini, sparsi, saepe ramosi, flexuosi, nutantes, versus apicem Rhacheos breviores et secundi, omnes basi nodosi, scabri. Pedicelli spicularum inaequales, et plurimi vix manifesti, patentiusculi. Spiculae ex albido-virides, obtusiusculae, semper (imo in et post anthesin) clausae. Valvulae glumae margine et carina dorsali, ciliato-hispidae, nervis viridibus, sursum hispidis, donatae; exterior semilunaris, interiore lanceolata latior et margines ejus includens. Filamenta basi ovario saepe adglutinata. Semen nigricans.

Flor. Mess. — Vendem. *Matur.* Therm. — Brum. β . Jun. — β . Octobr. β . Jul. — β . Dec.

Habit. ad ripas fossarum et fluviorum; in rivulis; pratis et sylvis humidis, paludosis. *Gall.* — prope Lutetiam paris: in Departem. montis Jovis prope Lantern. — *Germ.* in Old. Saxon. Hannov. Hanov. Bavar. Austr. Hass. Francon. —

AD TAB. III.

II. *Panicum. Panic. Fench. (Panicum, Milium, et Gramen Tourn. Milium, Moench).*

Linn. ed. Gil. 2. p. 20. Venten. 2. 98. Lam. t. 43. Cavan. Pl. Hisp. t. 110. Gaertn. I. p. 2. t. I. f. 3. Moench. M. 206.

Involucrum aut nullum aut monophyllum, uni—multisесetum, ad basin peduncularum. Gluma calycina trivalvis, uniflora. Valvulae duae majores conniventes, fere aequales, subovatae, muticæ aut aristatae, nervosæ; altera magis convexa minor; altera planiuscula; tertia parva squamuliformis ad basin externam valvulae planiusculæ. Gluma corollacea bivalvis persistens, organa utriusque sexus perfecte tegens: Valvulis cartilagineis subovatis obtusiusculis, subaequalibus: altera convexa paululum majore: altera minore planiore. Filamenta tria capillaria, brevia. Antheræ oblongæ. Ovarium subrotundum. Styli duo capillares. Stigmata plumosa. Gluma haec corollacea crustacea facta, valvularum marginibus conatis, seminis pericarpium non dehiscens refert. Semen unicum, corticatum, subrotundum, inde planiusculum, aut laeve, aut scabriusculum, aut rugosum. Squamula unica intervalvulam calycinam planam et glumam corollaceam, diaphana, margine membranaceo, interdum vix manifesta. Inter hancce squamulam et sic dictam glumæ calycinæ valvulam planiorem etiam Organæ sexus masculi, nempe aut Stamina tria perfecta, aut imperfecta absque Antheris, et saepe, per lentem, rudimentum pistilli minutissimum, observantur (1).

(1) Ita plurimi Botanici fructificationem, sequente modo a me observatam descripserunt. *Gluma calycina* (revera) bivalvis, biflora. *Valvulae calycinæ* inaequales, ovatae, obtusæ: altera major, concava, ad latus fertile spiculae, dorso convexo, aut mutica, aut aristata, subnervosa: altera ad latus sterile, exigua, ovata, squamuliformis, plana, nervosa, mutica. *Glumæ corollaceæ* inaequales geminae; altera frugifera,

Panicula laxa, aut densa *spiciformis*, interdum valde ramosa. *Ligula pilosa* aut nulla.

i. *Panicum verticillatum*. Panic verticillé.
Quirlförmiger Fench. *

Panicum verticillatum, racemulis quaternis involucellis unifloris, bisetis, culmis diffusis. Linn. ed. Reich.

i. p. 153. ed. Gil. 3. 67. s. v. ed. Pers. 107.

Spica tereti, involucellis unifloris, bisetis, retrorsum scabris. Roth. I. p. 26.

altera infecunda. *Gluma corollacea frugifera* bivalvis, hinc convexa, inde plana, persistens, ovata: *Valvula* membranaceis, ovatis, inaequilibus; *exteriore* concava, dorso convexa; *interiore* plana, paululum majore. — *Organa sexus et pericarpium et semén uti supra narratum*. *Gluma corollacea infecunda* bivalvis; *valvulae* inaequilibus: *interiore* (nectar: L. *squamula*) diaphana, margine membranaceo, *valvulae* interiori *glumae corollaceae frugiferentis* adpressa, ex ovato-lanceolata, interdum brevissima: *exteriore* (*valvula sic dicta calycina planiore*) nervosa, plana aut mutica, aut aristata, una cum *valvula calycina* majore, (*loco valvulae calycinae minimae*), *glumam corollaceam frugiferentem*, tegente. *Filamenta* etc. uti supra descriptum. —

Panicum ergo spiculas habet bifloras, flore altero fertili, altero abortiente. Eodem modo in *Digitaria glumae corollaceae* 2 adsunt, partibus vero plerumque minus manifestis.

asperum. Lamarck. f. f. 1175. 3. Lestib. 216.
sylvestre dictum et Dens Canis. I. Bauh.
hist. 2. 443.
spica unica paniculata, setis pancioribus.
Hall. helv. n. 1543.
vulgare spica simplici et aspera. Tourn. 515.
Mapp. 230. Rupp. jen. 304.
Berg. frc. 318.
composita, aristis spica longioribus. Boehm. lips. n.
605. Zinn goett. p. 61. Sauv. 34.
Cynosurus paniceus. Goian. hort. 48. fl. 126.
Gramen geniculatum. Tabern. ic. 200. Krtb. 516. A.
Tabern. J. Bauh. hist. 2. p. 469.
paniceum spica aspera. C. Bauh. p. 8. Magn.
bot. 116. hort. 91. Scheuchz.
agr. p. 47. Dill. giesl. app.
n. 5. Buxb. hal. p. 148. Hall.
goëtt. p. 51.

Moench hass. n. 43. Reich. frc. 166. Scholl. barb.
n. 47. Pollich. 1. 54. Curt Lond. 4. n. 44. t. 260. Schreber
spic. p. 43. Goian. fl. m. 115. Nonne. erf. p. 274.
Plan. erf. p. 51. Dietr. 1. 87. Gmel. tub. p. 15. Wild.
prodr. n. 121. Schrank. 1. 315. Delarbre flor. d'Auvergne. 145.

Radix annua, fibrosa, alba. Culmus plerumque
unicus (plures autem vicini), tenuis, compressus,
obscure trigonus, lateribus 2 latioribus planis, tertio
sulcato angustiore, glaber, infra paniculum vero
angulis scabris, digitalis — 2 pedalis, nodis 4 - 6
purpurascensibus, glabris, inferne plurimum ramosus,
ramis saepe floriferis, geniculatus, dein ad-
scendens, firmus, foliatus. *Folia striata, glabra,*
scabra, laete viidia, plana, ad basin saepe trans-
versaliter undulata, 2 - 3 lineas lata, 2 - 6 pollices
longa, nervo dorsali et margine albido. *Vaginae*

glabrae, virides; inferiores non raro purpurascentes, margine albido vix pubescente aut glabro, compressae. *Ligulae* loco pili breves. *Panicula* spiciformis, cylindrica, nullo modo ventricosa, $1\frac{1}{2}$ – 3 pollices longa, viridis, setosa. *Rhachis* scabra, internodiis alternis, trigonis, lateribus duobus, canaliculatis, tercio plano, angulis duobus sulcatis, tertio integro. *Pedunculi* communes verticillati, plerumque quaterni, racemosi; supremi sparsi. *Verticilli* superiores approximati, inferiores remotiores, interdum dimidiati. *Involucrum* multisetum, pedunculis communibus adfixum, *setis* spiculis longioribus, retrosum scaberrimus, ex albido flavescentibus, interdum rubellis, numero plerumque spicularum duplo. *Spiculae* in verticillis fasciculatim congestae, parvae, striatae, muticae, virides, vix unam lineam longae, dimidiam latae, pedicellis obtusis insidentes. *Glumae* sic dictae *calycinae* (hance nominationem teneo) *Valvulis* inermibus. *Antherae* parvae purpurascentes. *Stigmata* violacea.

Var. Culmo erecto. — Flor. Praer. — Therm. Matur. Vend. — Brum. — Maj. — Aug. — Oct. — Nov.

Habit. in cultis; hortis; vineis; agris; umbrosis; ad vias tot. fere *Gall.* — in Depart. Montis Iovis prope Moguntiacum, Lautern, Bingen, Alzey, Dürckheim. Wormat. Spiram etc. — Germ. in Saxon. Thur. Hass. Brandenb. Wetter. Suev. Siles. Austr. Bavar.

2. *Panicum viride*. *Panic verdâtre*. Grüner Fench. *

Panicum viride, spica tereti, involucellis bifloris, fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. Linn. ed. Reich. I. 154. ed. Gil. 3. p. 67. si v. ed. Pers. 107.

- spica tereti, involucellis unifloris,
trisetis, inermibus. Roth. I. p. 27.
2. p. 69.
- spica tereti glomerata, involucellis
unifloris, bisetis, inermibus:
Schreb. spic. p. 44.
- laevigatum (una cum glauc.). Lamarck. II 75.
4. Lestib. 218.
- bicolor. Moench. n. 206.
- vulgare, spica simplici et molliori (viride et
glauc. conj.). Tourn. 515. Mapp.
230. Rupp. jen. p. 304. Buxb.
hall. p. 148. Scheuchz. agr. p. 46.
- spica simplici vestibus non adhae-
rente. Vaill. 156. (cum
glauc.).
- unica Hosculis sessilibus so-
litariis, setis numerosis.
Hall. helv. n. 154.
- Gramen paniceum sive panicum, sylvestre, spica
simplici. C. Bauh. pin. p. 8.
Scheuchz. gram. 46. Moris hist.
3. p. 139. S. 3. t. 4. f. 10. (c:
glauc.).
- spica simplici laevi. Raj. hist.
1261. (c. gl.).
- spica simplici. Magn. bot. II 6.
hort. 91. brevi. Volk. nor. p.
194. (c. gl.).
- Gouan fl. m. p. 115. hort. m. app. 545. Fl. d. Wet-
ter. I. p. 77. Leers 13. t. 2. f. 2. Reich. fr. 11. Dietr.
I. 86. Hoffm. 30. Schrank. I. 315. Curt. Lond. 4. n. 44.
Villars. hist. des pl. d. Dauph. I. 64. Delarb. p. 146.
*Radix annua, fibrosa, albida. Culmus (aut plu-
res) tenuis, debilis, plerumque inferne geniculato-
decumbens, ascendens, palmaris-sesquipedalis,*

basi plurimum ramosus, ramis non raro floriferis, striatus, superneteretusculus, infra spicam uno latere sulcatus, scaber, dein uno latere plano marginibus scabriusculis, inferne autem circum circa laevis et sicuti in *verticillato*; nodis glabris purpureis 3 - 5, internodio superiore valde longo; foliatus. *Folia* uti in *verticillato*, interdum vero latiora et longiora, in superiore pagina magis scabra quam in inferiore, margine albidiore. *Ligulae* loco *pili* breves. *Vaginae* striatae, glabrae, laeves, aut margine modo superne pilosò, compressae. *Panicula* spiciformis, densa, laete viridis, plerumque crassior quam in *verticillato*, uncialis - biuncialis, teres, fere aequali crassitie, inferne interdum interrupta, apice obtusiore quam in antecedente. *Rhachis* trigona, scabra, uno latere sulcata, internodiis alternis, angulis integris pubescentibus. *Pedunculi* communes brevissimi, racemosi, alterni et sparsi, *pedicellis* brevissimis 4 - 6., apice obtusissimis, aucti. *Spiculae* paululum minores quam in *verticillato*, respectu longitudinis etiam angustiores, minus convexae, racemoso - congestae. *Involucrum* ex setis 2 - 3, raro solitariis, rarius nullum, basi pedicellorum adfixum, setis viridibus aut albidis deorsum, nunquam sursum, scabriusculis, longitudine fere aequali, spiculas cum *pedicellis* superantibus. *Glumae calycinae* virides, glabrae, nervosae. *Valvula* *tertia* *calycina* minutissima, interdum vix manifesta, tamen semper praesens, tempore maturitatis paululum major (quod Leersius quoque minime negavit, quamvis petalum tertium (nect. L. etiam praesentem, tenuissimum vero) non adesse credit). *Semen* laeve et striato - sulcatum dictum, revera nec striatum, nec laeve, sed scabriusculum est, ac valvulis corollaceis nervosis, subaglutinatis, totum tectum (conf. et Hoffm.).

- Var.* 1. Valvula calycina tertia nulla. (?)
 2. Setis rubellis et violaceis.
 3. Culmo statim a basi erecto.

Flor. Praer. — Fruct. Matur. Mess. — Vend.
 β Maj. — β Sept. β Jun. — β Oct.

Habit. sicuti antecedens in tot. fere *Gall.* et
Germ. — in Depart. montis Jovis prope Moguntiam
 abunde; — quoque circa Castellum, Kostheim etc.

3. *Panicum glaucum.* *Panic glauque.* *Grau-*
grüner Fench. *

1693

Panicum glaucum, spica tereti, involucellis bifloris,
 fasciculato-pilosus, seminibus undulato rugosis. Linn. ed. Reich.
 I. 153. ed. Gil. 3. 67. s. v. ed.
 Pers. 107. fl. Zeyl. 144.
 spica tereti, involucellis unifloris
 fasciculato - setosis. Roth. I. 27.
 2. p. 70.

viride. Poll. I. p. 55. Doerr. nass. II. 22.
 Schreb. spic. p. 44. Wigg. prim.
 p. 6 Zinn. goett. p. 61. & Matuschk.
 Sil. 41. Scholl. barb. n. 48. Nonne.
 erf. p. 44. Plan. erf. p. 51. Moench.
 Hass n. 44. Leyss. hal. n. 52.
 Grimm. isen. p. 259.

flavescens. Moench. m. 206.

cynosuroides. Scop. I. p. 50.

lutescens. Weig. obs. p. 20.

spica simplici, aristis aggregatis flosculo sub-
 jectis. Gron. virg. 134.

unica, flosculis sessilibus solitariis,
 setis numerosis. Hall. helv.
 n. 1542.

tereti, involucellis bifloris, fascicu-
 lato-pilosus, seminibus ad

longum sulcatis, culmo decumbente. Willd. I. c. n. 122.

involucellis bifloris, fasciculato-pilosus, seminibus transversim rugosis, culmo erecto. Willd. I. c. n. 122.

Panici effigie gramen, simplici spica. Lob. ic. 13.
Gramen paniceum spicis nigris. C. Bauh. pin. p. 8.

Dill. giess. p. 157. Rupp. jen. p. 304. Hall. goett. p. 51.

simplici spica panici effigie. Volck. n. p. 197.

Schreber spic. p. 44. graes. t. 25. (an variet.?)
Murr. prodr. p. 41. Fl. der Wetter. I. 76. Schrank. I. 315. Leyss. hall. n. 53. Scholl. barb. n. 49. Leers. 12. t. 2. f. 2. *. Wigg. prim. p. 6. Krock. Sil. I. p. 86. Hoffm. 30. Delarb. 145. Zinn. goett. p. 61. Gaertn. I. p. 2. t. I. f. 3. Goian. hort. p. 545. Dietr. I. 87. (vid. quoq. synon. anteced.).

Radix annua, fibrosa, albida. Culmus (interdum plures) inferne saepe geniculatus, striatus, foliatus, erectus, ramosus, ramis non raro fertilibus, nodis purpurascens 4-6, glabris, internodio superiore longissimo, infra paniculam scaber et nodo obsoleto notatus, dein magis teres et laevior, in medio et inferne compressus, angulo altero sulcato. *Folia* longitudine et latitudine uti in praecedentibus, basi nonnullis pilis candidis, praecipue in margine donata, dorso laevia, superiore pagina et margine scabriuscula, nervo dorsali albo. *Vaginae* compresae, striatae, margine laevi diaphano, superne paullulum laxae. *Ligulae* loco pili brevissimi. *Panicula* spiciformis, fere spica, densa, teres, 1-2 pollices longa, crassitiae aequali, apice obtuso. *Rhachis* teres, aspera, vix pubescens. *Pedunculi* brevissimi, simplices, apice obtuso, rhachi circum circa spir-

liter inserti. *Involucra* apici pedunculorum, minime basi, adfixa, multiseta: *singula* ex duobus fasciculis, spiculas superne ubique cingentibus, constantia, altero autem fasciculo magis ad latus dextrum, altero ad sinistrum baseos spiculae inserto. *Setae* involucri 10-12 inaequales, vix scabriuscuae, juniores virides, aetate rufae, spiculam multo superantes. *Spiculae* uno latere valde convexae, crassae, longitudine uti in antecedentibus. *Glumae calycinae* *valvulis* glabris, nervosis, albidis, nervis viridibus ornatis, *tertia* valde manifesta, margine diaphano. *Semen maturum* superne plerumque transversaliter rugosum, rugis undulatis, scabriuscum, *dorso* ex magna parte ad apicem nudo, *plano* vero latere plana sic dicta *valvula* corollacea, plana calycina et calycina minore perfecte tectum. *Antherae* purpureae. *Stigmata* violacea.

Var. I. Seminibus laevibus.

2. — in latere convexo longitudinaliter striatis.
3. Glumis pubescentibus.
4. Setis 6-8.
5. Spicis purpurascensibus.
6. — nigricantibus.
7. — viridescentibus.
8. Culmo a basi statim erecto.

Flor. Mess. — *Fruct. Matur. Therm.* — *Vend. & Jun.* — *& Sept.* — *& Jul.* — *& Oct.*

Habit. Ut praecedentes, quoque in ruderatis tot. fere *Gall.* — in nostro Depart. prope Moguntiam, haud procul Mombach ad officinam laterariam et in monte Hartenberg; circa Lautern etc. — et *Germ.*

4. *Panicum italicum*. Le Panis. Waelscher Fench. **

Panicum italicum spica composita spiculis glomeratis, setis immixtis, pedunculis hirsutis. Linn. ed. Reich. I. 157. ed. Gil. 3. p. 68 s. v. ed. Pers. 107. panicula majore. Tourn. 5. Magn. bot. 197. hort. 152. C. Bauh. pin. p. 27. theatr. 519.

Panicum Rumph. amb. 5. p. 202. t. 75. f. 2. Tabern. Krtb. 659. 660. glomeratum. Moench. meth. 207.

germanicum spica simplici cernua, setis brevibus, pedunculo hirsuto. Roth. I. p. 27. Volst. Verz. a. G. T. I. n. 134. p. 167. spica composita ovata, setis brevioribus, pedunculo hirsuto. Roth. 2. p. 71.

germanicum sive panicula minore. C. Bauh. pin. p. 27. Rupp. jen. p. 303. Magn. bot. 197. hort. 152.

spica composita aristis gluma brevioribus. Sauv. 34.

composita, aristis flosculo brevioribus. Virid. cliff. 7. Hort. ups. 19. Roy. lugdb. 54. Gron. virg. 134.

album vulgare. Volck. norimb. p. 317.

Mill. dict. n. 2. Weig. obs. p. 22. Gotian fl. m. p. 115. hort. 34. Scopol. Del. insubr. Diar. bot. V. p. 45. Schrank. I. p. 316. Dietr. I. 87. Kerner t. 420.

Radix annua, fibrosa. Culmus 2-3 pedalis, inferne compressus, striatus, foliatus. Folia plana, lanceolata, scabra. Vaginae sulcatae, glabrae. Ligulae

gulac loco *pili* breves. *Panicula* spiciformis, composita, ramis paniculato-spiciformibus minoribus adpressis, ex ovato-elongata, 2-10 pollices longa, compacta, inferne interdum interrupta, crassa, obtusa. *Rhachis* cum *Pedunculis* villosa. *Spiculae* glomeratae, breviter pedicellatae. *Involucrum* depauperatum, ex setis 1-3, spicula superantibus, incurvis, scabris. *Semen* ovatum, nitidum, laeve, subflavescens.

Var. I. Germanicum: minore statura, spica vix digitali, magis ovata, saepe cernua, setis spiculas non superantibus (in *Germ.* circa Ienam, in Suevia, Siles. Baruth. passim in *Gallia*).

2. Ratione coloris paniculae, viride, flavescens, et fere rufum.

Flor. Praer. — *Fruct.* Matur. Therm. — *Vend.* ♂. Maj. — ♀. Sept. — ♂. Jul. — ♀. Oct.

Habit. In agris, hortis, inter olera, fossis siccis. *Gall.* in Depart. de l'Herault. In *Gall.* et *Germ.* hinc et iude colitur.

5. *Panicum Crus-Galli*. Panic pied-de-Coq. Hahnfus-Fench.*

Panicum Crus galli, spicis alternis conjugatisque spiculis subdivisis, glumis aristatis, rhachi quinquangulari. Linn. ed. Reich. I. 155. ed. Gil. 3. p. 68. s. v. ed. Pers. 107. Fl. Suec. n. 55. spicis alternis remotis, declinatis compositis. Boehm. lips. n. 606. Roy. lugdb. 55. Dalib. par. 22. virid. cliff. 7. spicis alternis, remotis, laxis. Boehm. lips. n. 607. Zinn. goett.

B

61. Nonne erf. p. 275. hort.
 cliff. 27
vulgare, spica multiplici, asperiuscula.
 Tourn. 515. Rupp. jen. p. 304.
 Berg. frc. n. 319.
 spica multiplici, longis aristis
 circumvallatum. Tourn. 515.
 Mapp. 230. Berg. frc. p. 319.
 Rupp. 304.
 spica ramosa, setis nullis. Hall. helv. n. 1544.
 crus-corvi (rhachitrigona). Scopol. I. p. 52.
 Delarb. p. 146.
Milium Crus-Galli. Moench. meth. 203.
Gramen panicum spica divisa. C. Bauh. pin. p. 8.
 Moris. hist. 3. p. 189. s. 8. t. 4. f. 15.
 Schenckz. agr. p. 49. Volck. nor.
 p. 196. Dill. giess. p. 157. Hall.
 goett. p. 51. Buxb. hal. p. 148.
 spica divisa, aristis longis armata. C. Bauh. pin. p. 8. Moris. hist.
 3. p. 189. s. 8. t. 4. f. 16. Schenckz.
 agr. p. 48. Volck. nor. 197. Magn.
 bot. 116. hort. 91. Buxb. hal. p. 148.
Graminis genus quibusdam, gallis Dens-canis secun-
 dus. J. Bauh. hist. 2. p. 443.
 Flor. dan. t. 852. Lamarek 1175.5. Grimm. iseni
 p. 260. Flor. der Wetter. I. 78. Scholl. barb. n. 50.
 Wilke gryph. n. 32. Hoffm. 31. Gmelin. tub. p. 15.
 Pollich. I. 56. Gmelin. sib. I. p. 90. Leyss. hal. n. 54.
 Delarbre. p. 146. Doerr. nass. p. 24. Matuschk. I. 39.
 Roth. I. p. 27. 2. 73. Goiani. hort. 34. flor. 115. Reyg.
 danz. 2. p. 35. Lestib. 218. Moench. hass. n. 45. Leers.
 13. t. 2. f. 3. Plan. erf. p. 51. Curt. Lond. 4. n. 41.
 Murr. prodr. p. 41. Dietr. I. 86. Weig. pom. n. 40.
 Scop. I. 51. Wiggers prim. p. 6. Schrank. I. 316.
 Nekker. gallob. p. 32. Willd. pr. n. 124.

Radix annua, fibrosa, alba. Culmus (aut plures) *inferne incrassatus, fere bulbosus, compressus et geniculato-decumbens, uno angulo magis quam altero canaliculato, superne autem teretiūsculus, unico tantum latere canaliculato, totus laevis et glaber, oblique adscendens, ad basin albido, supra medium viridis, palmaris - 3 pedalis et altior, nodis 4 - 6 purpureis, inaequaliter compressiusculis, glabris, ramosus, ramis plerumque floriferis, inferne 1 - 3 lineas latus, foliatus. Folia plana, valde striata, 2 - 5 lineas lata, 3 - 10 pollices longa, lanceolato-acuminata, basi saepe undulata, laete viridia, margine vero nervo que dorsali (in pagina superiori quoque manifesto) alba, superiore pagina, nervo dorsali et margine (excepto versus basin) scabra, inferiore pagina laeviuscula. Vaginae glabrae compressae, laxae, superne apertae, laete virides, interdum, praecipue inferiores, rubellae, striatae, laeves, margine pellucido, albo, ciliato. Ligula nulla, basis vero foliorum callosa, albida, aut fusca. Panicula ramosa, unilateralis, ramis unilateralibus, alternis. Rhachis communis scabra flexuosa quinquangularis, et partiales trigonae describuntur, revera autem nec altera quinquangularis, altera nec triangularis observatur. Rhachis communis dorso striato piano, fere lineam lata est: in opposito sive ventrali latere, quoque piano, carinam elevatam plerumque sulcatam aut canaliculatam inveni: versus apicem, rarius inferne, canaliculus ille carinae ventralis vix manifestus est (crus corvi). Ita rem quoque in ramis inveni, ubi canaliculus vix ullus aut nullus adest. In latere ventrali Rhachis tricanaliculata appetet, canaliculis lateralibus majoribus, intermedio magis elevato minori. Rami et Ramuli semper carinae ventrali alternatim in diversis lateribus inserti, Rhachis ramorum flexuosa, viridis, scabra; superiores rhachi*

communi magis adpresso; inferiores, longiores, remotores, patulae, raro conjugatae. *Pedunculi* ramis inserti, racemosi, graciles, nudiusculi, primo aspectu vero, rudimenti involucri causa, pilosi. *Pedicelli* breves, interdum vix ulli, apice truncati. *Involucri* setacei rudimentum pilosum ad basin omnium ramifications, tam majorum, quam minorum, pili nempe breves, albi, plures quam rami, pedunculi et pedicelli. *Spiculae* magnitudinis spicularum glauci, unilateraliter adfixae, aut 2-3 inaequaliter pedicellatae, uno ex loco proveniunt, aut solitariae, aut geminae sunt. *Glumae* caiycinæ pilosae, præcipue in marginibus, nervosae, scabrae, virides aut purpurascentes. *Valvula* convexa trinervia, minor, acuta; *plana* major, arista terminali, tortili, scabra, viridi aut purpurea, recta, mox longa, mox brevi, aucta, *tertia* mucronata. *Glumae* tres corollaceæ diaphanae. *Antheræ* et *Stigmata* uti in antecedentibus. *Semen* ex albido-slavescens, nitidum, laeve, mucronatum.

Var. 1. Pedunculis ad basin magis pilosis

2. Glumis inermibus (prope Lautern).
3. Glumis aristatis et inermibus in una planta (circa Mogunt).
4. Rhachi tota fere triangulari (Mogunt. Crus-corvi).
5. Pumilum. Culmo vix palmari.
6. aristis uncialibus et longioribus (Mog.).
7. foliis glabris (prope Erbenheim).

Flor. Mess. — *Fruct.* Matur. Therm. — Brum.

β Jun. — β Sept. β Jul. — β Nov.

Habit. in siccis et humidis; ruderatis; hortis; vineis, oleraceis; simetis; arvis udis, ad fossas. tot. fere *Gall.* — in nostro Departem. prope Moguntiacum im Gartenfelde, beim Dominicaner Hause, bei Gaubischheim, Gonzenheim, Lautern, — et *Germ.* —

6. *Panicum miliaceum*. Milet. Gemeiner Hirse.

1502

Panicum miliaceum, panicula laxa flaccida, foliorum vaginis hirtis, glumis mucronatis nervosis. Linn. ed. Reich. I. p. 160. ed. Gil. 3. 70. Hort. ups. 20. cliff. 27. s. v. ed. Pers. 109. panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubescentibus. Goian. hort. 35. Fl. m. 115.

Milium. I. Bauh. h. 2. p. 446. Tabern. Kr. 656. Dod. pempt. 506.

semine luteo-albo-nigro. C. Bauh pin. 26. theatr. 502 Tourn. 514. Buxb. hal. p. 216. 217. Rupp. jen. p. 303. Magn. bot. 177. hort. 136. Raj. hist. 1251. Tabern. ic. 278. Kr. 196.

semine nigro spadiceo-voe. J. Bauh. h. 2. 446. esculentum. Moench. M. 203.

Jacq Vind. p. 11. Raj. lugdb. 55. Roth. I. 28. 2. 75. Sauv. 35. Dalib. par. 22. Fl. d. Wetter. I. p. 804 Schrank. I. 319. Dietr. I. 88. Retz. obs. I. p. 11. Willd. prodre. n. 126.

Radic annua, fibrōsa, alba. *Culmus* (aut plur. res) pedalis - 2 pedalis et altior, erectus, striatus, interdum ramosus, foliatus, nodis 4 - 6 purpureis, pilosis; *supra radicem* nodoso-bulbosus, teres, laevis, pubescens, uno latere sulcato, marginibus obtuso-teretibus; *supra medium* canaliculatus, marginibus magis acutis, compressiusculus, pilosus, praecipue in lateribus acutioribus oppositis, *infra paniculam* glaber, subcompressus, latere unico vix plano — *Folia* 10-15 pollices longa, 6-8 lineas lata, lanceolata, nervosa, nervo dorsali et scabro margine alba, paginis oppositis laevia, glabra. *Vaginae* striato-sulcatae, punctato-scabrae, pilosae,

pilis sursum erectis, laxae. *Ligulae* loco *corona* *villosa*, villis basibus coadunatis. *Bractae* ad basin ramorum majorum parvae, lanceolatae, membranaceae. (Involucrum setaceum aut pilosum nullum.) *Panicula* plerumque pedalis, et major, superite nutans, laxa, flaccida, ramossissima. *Rhachis* perfecte trigona, tribus lateribus canaliculatis, glabra, laevis, striata, *Ramis* alternatim progredientibus, solitariis, inferioribus saepe geminis, 6 pollices saepe longis, ramosis, glabris, laevibus, ad basin purpureis, flexuosis, canaliculatis. *Ramuli*, *Pedunculi* et *Pedicelli* glabri, laeves, viridesque. *Spiculae* omnes inaequaliter pedicellatae, solitariae, ovatae, uno latere compressiusculae, mucronatae, virides. *Gluma calycina* nervosa, nervis viridibus, mucronata, glabra, laevis. *Valvula tertia* subremota. *Valvulae glumarum corollacearum* pellucidae. *Senien* slavescens aut luteum, laeve, nitidum, ovatum.

Var. I. Semine albo.

2. spadiceo aut nigrescente.

Flor. Mess. — *Fract.* Matur. Therm. — Vend. 2. Jun. — 2. Sept. — 2. Jul. — 2. Oct.

Habit. Hinc et inde quasi sponte. Planta in Gall. — et Germ. culta. offic. *Mili Semina*.

AD TAB. IV.

II. Digitaria. Digitaire. Blutgras (Panicum L. Gramen Tourn.).

Haller. helv. 2. p. 244. Flor. dan. 388. Venten. 2, p. 98. Moench. meth. 205. Allion. fl. ped. T. 2. p. 238.

Signa characteristicæ Panicis carent. Signa quoque Paspali et Echiae non convenient. Habitus vero externus uti in Digitaria et Echiae.

Involucrum setaceum vel pilosum nullum. *Gluma calyxtina* bivalvis, valvulis subaequalibus aut inaequalibus, aut mucronatis, aut obtusis ovalibus: altera plana longitudine glumae corollaceae, scutum paulo majore; altera paulo minore aut multo minore et angustiore, ita ut interdum vix manifesta sit, hoc in casu sic dicta valvulae tertiae Panici valde simili, parte convexiore spiculae, nunquam planiore uti in panicco adnexa. *Gluma corollacea* sibi in panicco. *Flores* hermaphroditi et masculi imperfecti. Cetera uti in panicco.

Inflorescentia panicci cruris-galli: *panicula* nempe ramosa, fere *spica* ramosa. *Spiculae* unilaterales, plures sessiles, aut vix pedunculatae. *Ligula* membranacea.

I. Digitaria sanguinalis. Digitaire sanguine. 156 Gemeines Blutgras. *

Digitaria foliis subhirsutis, cerule debili, spicis verticillatis, scapo aincipite. Hall. helv. n. 1526. Moench. hass n. 46. *sanguinaria*. Wigg. prim. p. 6.

sanguinalis, culmo decumbenti, vaginis foliorum rubro-punctatis, spicis digitatis, flosculis geminis muticis. Moench. m. 205. 157. ed. Gil. 3. 69. s. v. ed. Pers. 108.

Panicum sanguinale, spicis digitatis, basi interiore nodosis, flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. Linn. ed. Reich. 1. 157. ed. Gil. 3. 69. s. v. ed. Pers. 108.

spicis alternis oppositisque linearibus patentissimis, muticis, flosculis alternatim binis, altero pe-

- dunculato. Roy. lugdb. 35.
 Gron. virg. 154. Dalib. par.
 22. Sauv. 34.
- Dactylis folio latiore.** Berg. frc. p. 320.
Sanguinella. Gleichen. T. 8.
Ischaënum vulgare. Lub. ic. 24.
 ibi. gramen sanguinarium. I. Tabern. ic. 222.
 Krtb. 591. Dill. gies. app. 16.
- Gramen Dactylon folio latiore.** C. Bauh. p. 3. theatr.
 114. Tourn. 520. Mapp. 132. Magn.
 hot. 112. hort. 90. Dill. gies. app.
 p. 4. Rupp. jen. p. 308. Volck. nor.
 p. 198. Scheuchz. agr. p. 101. t. 2.
 f. 2. Hall. goett. p. 46.
 maius repens foliis hirsutissimis.
 Buxb. cent. 5. p. 34. t. 65.
 esculentum. C. Bauh. theatr. 118.
 aquaticum. C. Bauh. pin. 118. Mor.
 ris. hist. 3. p. 184. s. 8. t. 3. f. 5.
 majus panicula longa e spicis plu-
 rimis gracilioribus purpureis et vi-
 riidibus mollibus constante. Sloane
 jam. 3. fl. 10. p. 113. t. 172. f. 2.
- Graminis genus;** Dens caninus tertius. I. Bauh. hist.
 2. p. 444.
- Willd. n. 129. Lamarck. 1175. 7. Fl. dan. 388.
 Poll. I. 57. Lestib. 218. Burm. iad. t. 10. f. 1. Roth.
 I. p. 28. 2. p. 73. Leers. 14. t. 2. f. 6. Murr. prodr.
 p. 41. Goilian. hort. 35. Fl. m. 115. Schöll. barb. n. 51.
 Matuschk. I. 40. Hoffm. 31. Grimm. isen. p. 260.
 Schrank I. 317. Scop. I. p. 52. Leyss. hal. n. 55. Fl.
 d. Wetter. I. 78. Dietr. I. 86. Schreb. spic. p. 45.
 graes. 119. t. 16. Jacq. vind. p. 11. Zinn. goett. p. 61.
 Kerner I. t. 38. Delarbre. 146.
- Radix annua, fibrosa, alba. Culmus (aut plu-
 res) tenuis, laevis, inferne geniculato - procum-*

bens, dein adscendens, 6 pollices — 2 pedes altus, supra radicem teres, uno latere sulcato, in medio compressus, in supra parte teres, nodis plerumque 4, rare 3 aut 5, purpureis, interfodio supremo longissimo, saepe ex geniculis ramosus, foliatus. *Folia* brevia, striata, 3 lineas circiter lata, villosa, mollia, laevia, subcarinata, ex glanco-aut viridi-rubella, interdum laete viridia, lanceolata, margine ad basin saepe undulato. *Ligula* obtusa, fissa. *Vaginae* scabrae, striatae, glanduloso-punctatae, pilosae praecipue in margine, plerumque ex glauco-rubellae. *Panicula* spiciformis ramosa; *ratis* 3-8, 1-4 pollices longis, vix linea dimidia latioribus, linearibus, plerumque curvis, aut paululum flexuosis, junioribus erectis, aetate patentissimis, ad basin subpedunculatis, aut melius nudis, et interiore latere nodulo duriusculo, calloso praeditis, aut alternis, aut unico ex loco venientibus, aut subverticillatis. *Rhachis communis* (sive culmus inter ramos si adest), irregulariter et inaequaliter angulata, angulis pluribus sulcatis. *Rhachis ramorum* inaequaliter trigona, dorso seu parte tota plana coelum spectante nudo, viridi, nervo intermedio albido, parte vero terram spectante alternatim digona, cui in uno et altero latere alternatim spiculae adfixae sunt. *Spiculae* plerumque geminae, altera subpedunculata, aut sessilis, altera longius pedunculata, raro ternae aut solitariae, omnes ovatae, margine scabrae, parte convexa rhachi adpressae, virides aut rubellae, aut purpureae. *Valvulae calycinae* pubescentes, ciliatae, acutae, valde inaequales; *tertia* nulla: *minima* valvulae convexiori, corollaceae incumbit: *major* valvulis corollaceis paululum longior, marginē amplectente. *Gluma* corollacea glabra, apice paululum bifida, valvulis subaequalibus, altera externa nempe plana: *Rudimentum* glumae corollaceae alterius inter valvu-

Iam calycinam planam et corollaceam. *Antherae* purpureae. *Stylis* albi. *Stigmata* plumosa, rubella.

Var. 1. *Spiculis et rhachibus viridibus.*

2. — — — — — *purpureis.*

3. — — — — — *glabris.*

4. — — — — — *altera feminea; altera herma-*

phrodita. Scop.

5. — — — — — *alternis.*

6. *Vaginis* *glabris.*

7. — — — — — *non punctatis* (prope Mogun-

tiam non raro).

Flor. Mess. — Fruct. *Matur.* Fruct. — Brum.

— Jun. — β Sept. — β Aug. — β Nov.

Habit. in cultis et incultis, viis, hortis, are-

titosis, agris, arvis, collibus lapidosis, vineis, tot-

fere Gall. — in Mognuntia in horto seminarii. — et

Gerni. — — America.

2. *Digitaria filiformis.* *Digitaire filiforme.*

Fadenförmiges Blutgras. ***

Panicum *filiforme*, spicis subdigitatis approximatis,

erectis, filiformibus, rhachi fler-

xuosa, dentibus bifloris, altero

sessili. Linn. ed. Reich. I. p.

158. s. v. ed. Pers. p. 108. Jacq.

obs. 3. p. 18. t. 70.

Radix annua, fibrosa, alba. *Culmus* (aut plures) *filiformis*, inferne ramosus, digitalis-pedalis, sup-*ra radicem* geniculato-decumbens, et compressi-*usculus*, uno latere canaliculato, dein adscendens et magis teres, uno latere sulcato, nodis 3 purpu-*reis*, glabris, raro 2 - aut 4, internodio supremo longissimo, maxima ex parte nudo, glaber, laevis. *Folia* brevia, vix 4-5 lineas longa, lanceolata, unam lineam lata, glabra, laevia, striata. *Ligula* membranacea, obtusa, integra, alba. *Vaginae* pau-

lulum inflatae, laeves, glabrae, striatae. *Panicula ramosa, ramis 2-3, inferiore plerumque remotiore, pollicem & circiter longis.* *Rhachis ramorum, absque nodulo, gracilis, filiformis, flexuosa, uti in antecedenti.* *Spiculae parvae, latere plano exteriore violaceo, convexiore viridi rhachini spectante, rachi latiores, minime adpressae, oxyatae, acutae, geminae, pedunculatae; pedunculo altero longiore.* *Valvulae calycinae subaequales, alternae convexior, viridis, altera purpureo-violacea; utraque striata, laevis.* *Valvulae corollaceae purpureae, altera margine membranaceo argenteo, tempore maturitatis, non solum semen, sed quoque magnam alterius valvulae partem arte includens.* *Semen nigro-purpureum nitidum.* *Antherae purpureae.* *Stigma pluma, purpurea.*

Var. Spiculis alternis pedunculatis et sessilibus (Mogunt.).

Flor. Mess. — Fruct. Matur. Fruct. — Brum. — Jun. — Sept. — Aug. — Nov.
Habit. in arenosis; siccis; agris; Gall. — abunde prope Moguntiam in agro sylvatico inter sic dictum Geiersgipfel, et Finden. — Germ. in Carinth. et Palatinatu. — America.

3. Digitaria ciliaris. Digitaire ciliée. Gewimpertes Blutgras. ***

Panicum ciliare spicis subdigitatis approximatis erectis, linearibus, rachi flexuosa, dentibus bifloris, calycibus ciliatis. Retz. obs. fasc. 4. p. 16.
Maerklin in schrift. d. bot. ges. in Regensb. I. p. 332. Hoffm. 31.
Roth. 3. p. 564.

Differt a filiformi:

Culmo non raro majori, saepe sesquipedali, nodis pilosis. Foliis et Vaginis pilosis. Ligula fuscescens. Spicis bi- et triuncialibus. Gluma calycina ciliata, pilis fuscescens.

Floret et matur. uti antecedens.

Habit. in palatinatu rhenano.

AD TAB. V.

IV. Blumenbachia. Blumenbache. Hoeniggras (Holcus, Sorghum. Milium. Gramen).

In memoriam celeberrimi Professoris Goettingensis. Schreb. t. 18. Mieg act. helv. 8. p. 123. t. 4. f. 2.

Spiculae inaequales. Aliae hermaphroditae, latiores, aristatae; Gluma calycina bivalvi, uniflora; valvulis inaequalibus; exterioro cochleariformi, planiore, margine inflexo; interioro longitudine exterioris, sed angustiore et convexiore; Gluma corollacea bivalvi, interdum univalvi, calycina minore; Valvulis inaequalibus, exterioro versus basin ventricosa, apice bisido, laciniis reflexis; interioro lanceolata, margine inflexo, obtusa, interdum incisa; exterioro longiore; Arista interna, receptaculo inserta; aut longa, torta, planiuscula, geniculata, aut brevis, vix manifesta, aut nulla: Squamulis 3 quarum tertia longior, 2 vero latiores. Filamentis 3 brevibus, capillaribus: Antheris oblongis, prismaticis: Ovario ovato: Stylis 2 nudis: Stigmatis oblongis pilosis; Gluma corollacea arcte semen includente: Semine unico obovato, compressiusculo, laevi. — Aliae Spiculae masculae angustiores, muticae: Gluma calycina valvula exterioro lanceolata, interioro oblonga: Arista nulla: Squamulis, Filamentis, Antheris uti in hermaphrodito; Pistillo imperfecto, ob Stigmata carentia.

Panicula laxa;

Differt ab Holco Linn. *floribus hermaphroditis et masculis, in eodem quidem culmo sed in diversis calycibus.*

ab Avena arista receptaculo inserta. etc.

a Sorgho M. ~~et~~ spiculis omnibus calyce instructis, ~~ante~~ valvula altera calycina planiore, altera convexiore.

Blumenbachia haleppensis. Blumenbache d'alep. Aleppisches Honiggras. ***

1693

Holcus haleppensis, glumis glabris, floribus hermaphroditis muticis, femino aristato. Linn. ed. Reich. 4. 307. s. v. ed. Pers. 946. Gouan. hort. 515. flor. 130.

panicula laxa nutante, glumis oblongis, foliis acuminato-setaceis: Schreb. graes. 129. t. 18.
sparsa terminali, acuminata, locustis hermaphroditis, lanceolatis, glabris, seminibus oblongis complanatis. Mieg. act. helv. 8. p. 125. t. 4. f. 2.

Andropagon arundinaceum. Scopoli. 2. 274.

Milium arundinaceum pereenne, minus, semine oblongo nigro. Mont. prodr. 8. Seg. Veron. I. p. 332.

Gramen arundinaceum halepense tragopoginis folio, panicula miliacea. Pluk. alm. 176. t. 32. f. 1.
paniculatum, locustis partim muticis, partim aristatis. Scheuchz. agr. 509. t. 11. f. 12 - 15.

palustre arundinaceum milii panicula, semine phalaridis. Barr. ic. 8.
paniculatum arundinaceum syriacum, Haliaeum indignis dictum. Moris
 Hist. 3. p. 201. s. 2. t. 6. f. 26.
 Raj. Suppl. hist. p. 616.

Radix perennis, geniculata, squamacea, fibrosa, stolonifera, fusca. *Culmi* 2 - 6 pedales, laeves, inferne crassitudinis digiti, erecti, teretes, striati, laete virides; nodis viridibus villosis. *Folia* 1 - 2 pedes et ultra longa, 6 - 10 lineas lata, plana basi attenuata, in medio latiora, laevia, in margine vero scabra, laete viridia, nervosa, nervo intermedio carinante albo, subulato-mucronata, horizontalia, aut pendentia. *Ligula* crenulata, pilosa, pilis albis rigidis. *Vaginae* cylindraceae, nervosae, glabrae, foliis breviores. *Panicula* semipedalis, laxa, purpurascens. *Rhachis* cum *Pedunculis* et *Pedicellis* ilexuosa, angulosa, angulis argutis pilosis. *Pedunculi* patent, nutantes, *inferiores* plures in semi-verticillos alternos dispositi, *superiores* sparsi aut alterni solitarii, basi lateris interioris *nodulo* cartilagineo praediti. *Macula* hirsuta rhacheos ad basin peduncularum. *Spiculae* a medio ad apicem peduncularum adfixae, ex ovali oblongae, planiusculae fere triquetrae, acutae, unilaterales geminae, altera sessilis, aristata, latior, villosior, hermaphrodita, altera pedicellata, angustior, magis glabra, mutica. *Gluma calycina hermaphroditarum*, valvulis laevibus, villosis, nitidis, albidis aut rubellis, exteriore versus apicem, nervosa, interiore ad apicem carina viridi. *Gluma corollacea hermaphr. valvula exteriore* alba, interiore rubella, *Arista* apice alba. *Antherae* luteae, aetate fuscae. *Gluma calycina mascularum valvula exteriore* rubella, nervis viridibus et ciliis praedita; in-

teriorē albida aut rubella. *Gluma corollacea* earum spicularum, *valvula exteriore* pellucida, rubella, margine simbriato, *interiore* quoque pellucida, et rubella.

Var. 1. Spiculis plurimis hermaphr. muticis.

2. *Gluma corollacea* muscularum univalvi.

Habit. in locis elevatis, coliturque, in Gall. Dep. de l'Hérault, — Italia. Syria. Mauritania.

AD TAB. VI.

V. Alopecurus. Vulpin. Fuchs-schwanz (Gramen. Touren.).

Linn. ed Gil. 2. 21. Venten. 2. 97. Lam. t. 42. Flor. dan. t. 607. Gaertn. 1.2. t. 1. f. 2. Moench m. 176.

Gluma calycina bivalvis uniflora, *valvulis* ova-to-oblängis, concavis, carinatis, compressiusculis, aequalibus, basi coalitis. *Gluma corollacea* univalvis; *valvula* concava basi tubulosa marginibus nem-pe coalitis organa sexus cingente, longitudine fere glumae calycinae. — Raro rudimentum alterius valvulae. — *Arista* longa dorso valvulae corollaceae ad basin inserta, geniculata, aut nulla. *Squamulae* nullae aut vix manifestae. *Filamenta* tria capillaria. *Antherae* utrinque bifurcatae. *Ovarium* subrotundum. *Styli* 2, capillares, reflexi, gluma calycina longiores. *Stigmata* simplicia, plerumque plumosa. *Gluma corollacea* semen obvestiens. *Semen* unicum subrotundum, tectum, uno latere sulcatum.

Panicula simplex aut compōsita, spiciformis. *Spiculæ* compressiusculae.

1. Alopecurus pratensis. Vulpin des prés.

Wiesenfuchsschwanz. *

Alopecurus pratensis, culmo spicato erecto, glumis villosis, corollis muticis.

Linn. ed. R. I. 165. ed. Gil. 3.

72. s.v.ed.Pers. 110. Fl. sv. 52. 59.

Spica ovata. Hall. helv. n. 1539.

Gramen typhoides molle. C. Bauh. pin. p. 4. Buxb. hal. p. 147. Volck. nor. pag. 196. Hall. goett. p. 48.

phalaroides spica molli s. germanicum. C.

Bauh. p. 4. prodr. 10.

majus seu italicum. Magn. bot. 115.

Spicatum spica cylindracea, longioribus villosa donata. Tourn. 520.

spica cylindrica molli et densa.

Tourn. 520. Mapp. 131.

Rupp. jen. p. 309.

triticeum pratense spica cylindrica crassiore.

Dill. giess. p. 67. app. p. 42.

myurum spica molli candicante villosa.

Scheuchz. agr. p. 70.

Barret. ic. 123.

Lamarck. 1167. 6. Roy. lugdb. 54. Dalib. par. 21.

Plan. erf. p. 52. Nekker gallob. p. 36. Lestib. 214.

Weig. pom. n. 42. Gnielin sib. 1. p. 87. Curt.

Lond. 5. n. 50. Moench. hass. n. 47. meth. 176.

Panz. 12. 252. Jacq. vind. p. 11. Pollich. 1. 61.

Leers. 15. t. 2. f. 4. Wilke gryph. n. 34. Doerr.

nass. p. 3. Roth. 1. p. 29. 2. p. 77. Goilian hort. 38.

Flor. 69. Leyss. hall. n. 56. Sauvag. 34. et 309.

n. 6. Grimm. isen. p. 260. Fl. d. W. 184. Reich.

frc. 12. Schreber Graes. 133. t. 19. f. 1. Schrank.

1. 321. Gmel. tab. p. 16. Matuschk. 1. 42. Murr.

pr. p. 41. Stilling fl. misc. t. 2. Hoffmann 28.

Willden prodr. n. 129. Kerner 1. t. 57. Scholl.

Barb. n. 52. Dietr. 1. 90. Delarbre 13. Krock sil.

1. 101.

Radix

Radix perennis fibrosa. *Culmus* basi plerumque incurvus, dein erectus, nodis 2 - 3, ex fuseo-hi-grescentibus superne et inferne macula ex albido-flavescente ornatis donatus, laete viridis, 2 - 3 pedalis, glaber, laevis, foliatus, internodio summo longissimo ad maximam partem nudo. *Folia* glabra, aut superiore pagina scabriuscula, marginibus scabris, plerumque 1 - 1 $\frac{1}{2}$ lineam, raro 3 - 4 lineas lata, *superiora* 1 - 3, *radicalia* 4 - 6 pollices longa, patentia, striata. *Ligula* ovato-obtusa. — *Vaginae* glabrae, laeves, striatae, paululum inflato-ventricosae, *summa* valde longa. *Panicula* spiciformis cylindracea, crassior quam in aliis hujus generis speciebus indigenis, tres nempe ad 4 lineas lata, apice obtuso, 1 - 3 pollices longa, mollis, densa, villosa, aristata, ex viridi-argentea. *Spiculae* brevissimis pedicellis insidentes, imbricatae, solitariae et fasciculatae, paululum splendentes, nervis viridibus pictae, ovatae oblongae, 2 lineas circiter longae, 1 latae. *Rhachis* glabra. *Pedunculi* breves, simplices et ramosi, 1 - 5 florae. *Gluma calycina* manifeste villosula, *valvulis* acutis, trinerviis, carina dorsali ciliata, pilis per lentem planis. *Glumae corollaceae*. *Valvula* calycinis vix brevior, quinquenervia, acutiuscula, nuda. *Arista* geniculata, capillaris, spicula duplo longior. *Antherae* magnae, pallide flavae, aetate ferrugineae. *Styli* albi. *Stigmata* alba.

Var. 1. *Culmo* orgyali. *Panicula* 4 - 5 pollices longa, crassiore, subinterrupta. *Spiculis* majoribus, villosioribus. *Pedunculis* longioribus plurifloris.

2. *Foliis* pubescentibus.

3. *Panicula* fere ovata.

Flor. Flor. — *Therm. Matur. Mess.* — *Vend.*
β April — β Aug. β Jun. — β Oct..

C

Habit. in pratis, pomariis, aggeribus humidiis-tulis, ad margines fossarum, in arenosis tot. fere
Gall. et Germ. — in nostro Dep. in omnibus fere
 pratis; prope Moguntiacum abunde. —

2. *Alopecurus agrestis.* *Vulpin agreste.* Akker-fuchsschwanz. *

Alopecurus agrestis, culmo spicato, erecto, glumis laevibus. Linn. ed. Reichardt 165. ed Gil. 3. 72. s.v.ed. Pers. III.

myosuroides. Huds. angl. 23.

culmo spicato erecto. Berg. frc. p. 318.

Boehm. lips. n. 604. Zinn. goett. p. 60. Nonne erf.

erecto spicato, calyce ciliato. Hall. helv. n. 1540.

Gramen alopecurum minus, alterum. Lob. ic. 9.

alopecuroides spica longa tenuiore. Mor. h. 3. p. 192. f. 8. t. 4. f. 12.

myosuroides majus, spica longiore, aristis rectis. Raj. syn. 3. p. 397.

minus spica breviore aristis incurvis. ibid. ic. 51.

typhoides, spica angustiore, longiore et breviore. C. Bauh. pin. p. 4 theatr. 52. 53. Mont. pr. 49. ic. 51.

typhinum plantiginis spica, aristis geniculatis. Barr. obs. 1199. 699. f. 2.

triticeum arvense spica angustiore cylindrica. Dill. giess. p. 82.

humile, spica plantaginis brevi, aristata. Buxb. c. 5. p. 21. t. 40. f. 1.

spicatum spica cylindrica, tenuissima longiore. Tourn. 520. Mapp. 131. Schleuchz. agr. p. 69. t. 2. f. 6. Rupp, jen. p. 308. Hall, goett. p. 42.
 cum cauda muris purpurascente. I. Bauh. h. 2. p. 473.

Lamarck. 1167. 3. Roth. 1. p. 29. 2. p. 78. Curt. Lond. 2. n. 17. Murr. prodr. p. 41. Pollich. 1. 62. Moench. häss. n. 48. meth. 177. Lestib. 213. Gmelin. tub. p. 17. Schreb. Graes. 140. t. 19. f. 2. Wigg. prim. p. 6. Gerard. prov. 74. Leers. 15. t. 2. f. 5. Dietr. 1. 91. Leyss. hall. n. 57. Nekker p. 36. Hoffm. 28. Fl. dan. 697. Fl. d. Wett. 1. 85. Reich. frc. 12. Plan. erf. p. 52. Kröcker syl. 1. 102. Doerr. nass. p. 3. Delarbre. 13.

Radix perennis, fibrosa, alba. *Culmus* plerumque a basi erectus, interdum autem paululum inferne curvatus, internodiis multo minoribus quam in *alop. geniculato*, instructus, scabriusculus, praecipue infra paniculam, ad nodos 2 - 3 - 4 purpurascentes non raro ramosus, *ramis* longis floriferis, ceterum palmaris — 2 pedalis, et glaber. *Folia* superiore pagina et margine scabra, inferiore interdum scabriuscula, 1 - 2 lineas lata, 2 - 6 pollices longa, plana, laete viridia, striata. *Ligula* diaphana, oblonga, obtusa, sissa. *Vaginæ* nervosae, nervis albicantibus, intermedio majore et marginibus scabrae, *superiores* subinflato-ventricosae. *Panicula* spiciformis, 1 - 4 pollices longa, 1 - 2½ lineas lata, teres, aristata. *Spiculae* ovato-oblongae, vix linea latiores, 2 - 2½ lineas longae, solitariae et fasciculatae, laxe imbricatae, ad basin circulo exiguò plicato notatae. *Rachis* glabra. *Pedunculi* inaequales, flexuosi, simplices, et *pedicellis* 1 - 3 brevissimis instructi. *Gluma calycina valvulis* ultra medium connatis, acutis, lateribus glabris, carina ciliatis, minime aut

vix splendentibus, albidis aut violaceis, nervis viridibus. *Gluma corollacea* trinervia, *arista* interdum minore quam in antecedente donata. *Antherae* prismaticae, flavae, aetate ferrugineae. *Stigmata* alba.

Var. geniculatus. Memorabilis haec varietas abunde prope Moguntiacum am Bruch, et circa Bretzenheim crescit; culmo, praecipue inferne, valde geniculato, saepe ex magna parte decumbente et geniculato-adscendente. Facillime autem distinguitur a *geniculato* L. panicleae et spicularum structura, ac culmo modo ad unum latus geniculato.

Flor. Flor. — *Fruct.* *Matur.* *Mess.* — *Vend.*

8 April — 8 Sept. 8 Jun. — 8 Oct.

Habit. in pratis, arenosis, aridis, agris, vineis, ruderatis, tot fere *Gall.* — et *Germ.* in nostro Depart. prope Lautern, Worms, Alzey, Bingen, Moguntiam.

3. Alopecurus bulbosus. Vulpin bulbeux.

Knolliger Fuchsschwanz. ***

Alopecurus bulbosus, culmo erecto, spica cylindrica, radice bulbosa. Linn. ed.

R. I. p. 164. ed. Gil. 3. p. 72.
s. v. ed. Pers. 110.

Gramen myosuroides nodosum. Raj. angl. 3. 397.
t. 20. f. 2.

thyphoides spica angustiore. C. Bauh. p. 4.
theatr. 53.

typhinum phalaroides, pilosa spica, aquaticum, bulbosum. Barr. ic. 699.
f. 1. et 680. f. 1. 2.

Lamarck. 1167. Goian. h. 37. fl. 69. Hudson.
angl. 24. Dicks. h. sicc. 12. 4. Hoffm. 28. Dietr. 1. 90.

Radix perennis, bulbosa, fibrosa, *bulbis* 3 - 4
sibi invicem incumbentibus. *Culmus* pedalis — 2
pedalis, tenuis, teretiusculus, glaber, nodis 2 - 3

purpureis. Folia angusta, culmea 2 pollices vix longa, glabra, marginibus scabris, acuta. Panicula spiciformis, pollicaris aut longior, cylindracea, villosa, aristata, paniculae Alop. pratensis similis.

Flor. Praer. — Therm.

β. Maj. — β. Aug.

Habit. in pratis, humidis, Gall. in Dep. de l'Herault. et Germ.

4. *Alopecurus geniculatus. Vulpin genouillé. Sumpffuchsschwanz* *

Alopecurus geniculatus, culmo spicato infracto, corollis muticis. Linn. ed. Reich. I. 165. ed. Gil. 3. 73. Flor. sv. 53. 60. s. veg. ed. Pers. III.

culmo infracto, aristis glumis longioribus. Roy. lugdb. 54.
aristis gluma longioribus. Fl. lapp. 37.
aequalibus. ib. 38.

Gramen spicatum aquaticum spica cylindrica brevi. Tourn. 520. Mapp. 132.

typhoides, culmo reclinato. Magn. Bot. 115. h. 91.

fluviale album. Tabernaem. 217.

aquaticum geniculatum, spicatum. C. Bauh. p. p. 3. Lob. ic. 13. Moris. h. 3. p. 194. t. 4. f. 15. Buxb. hal. p. 148. Dill. giess. n. 67. Scheuchz. agr. p. 72. t. 2. f. 6. Hall. goett. p. 42.
spicatum, spica cylindrica brevi.

Rupp. jen. p. 309.

Gmelin. tub. p. 17. Dalib. par. 20. Gotian. h. 38. fl. 69. Fl. dan. t. 564. et 861. Jacq. vind. p. 11. Moench. Hass. n. 49. meth. 177. Willden. pr. n. 130. Zinn. goett.

p. 61. Scop. I. 58. Leyss. hal. n. 58. Grimm. isen. p. 260. Schrank. I. 321. Murr. prodr. p. 41. Lamarck. 1167. 7. Sauv. p. 309. n. 7. et p. 34. Curt. Lond. 9. n. 57. t. 339. Wilke gryph. n. 35. Wigg. prim. p. 6. Doerr. nass. p. 3. Roth. I. p. 30. 2. p. 78. Pollich. I. 63. Nekker. gallob. p. 35. Hall helv. n. 1541. Scholl. barb. n. 53. Nonne erf. p. 273. Plan. erf. p. 52. Berg. frc. 318. Weig. pom. n. 43. Hoffm. 28. Fl. d. Wett. I. 86. Boehm. lips. n. 603. Gmelin. sib. I. p. 49. Pant. 12. 267. Leers. 16. t. 2. f. 7. Reich. frc. 12. Lestib. 214. Delarbrec. 14. Krock. sil. I. 103. ~~juv. 17. 18. 19. 20. 21.~~

Radix perennis, mox repens et ramosa, mox simplicior, superne incrassata, fere bulbosa, semper valde fibrosa, albida. *Culmi* ad opposita latera alternatim plus minusve geniculati, aut inferne decumbentes, et non raro ad nodos inferiores radicantes, aut statim geniculato-erecti, aut in aqua natantes, internodio summo plerumque erecto, 1 - 2 pedales, valde foliati, inferne plurimum rubelli et ramosi, superne vix nudi, nodis 4 - 9 instructi. *Folia* plana pagina superiore et marginibus scabriuscula, glabra, vix striata, 1 - 6 pollices longa, 1 - 3 lineas lata. *Vaginae* compressiusculae striatae laxae glabrae laeves, inferiores internodiis longiores, glauco-viridi colore. *Ligula* oblonga, obtusa, aut angusta, aut integra. *Panicula* crassitie. et longitudine agrestis, densior vero et mollior, plerumque ex albido-viridis, subsplendens, raro violacea, *spiculis* ovatis vix lineam unam longis, dimidiata latis, willis parvis praecipue in carina dorsali et marginibus praeditis. *Glumae calycina valvulis* lacviter infra medium connatis marginibus integris. *Glumae corollaceae valvula* trinervia, nuda, obtusiuscula. *Aristam* a nonnullis observatam, et a Scopoli uno latere denticulatam dictam, nunquam in plantis circa Moguntiacum reperio, sed *Stylum* longum ex apice

ovarii provenientem et persistentem. Difficilis ceterum dissectio tenerrimae spiculae est, et fortasse varietates duae reperiuntur.) *Antherae* pallide flavae, aetate aurantiaceae sunt.

Flor. Flor. — Fruct. Matur. Mess. — Vend. β. April. — β. Sept. β. Jun. — β. Oct.

Habit. in locis uliginosis, turfosis; ad fossas piscinas. tot. fere *Gall.* et *Germ.* — in Dep. Mont. Jovis circa Lautern, am AltRhein, et ad paludes moguntinas. —

AD TAB. VII.

VI. Phalaris. Alpiste. Glanzgras.
(Gramen Tourn. Typhoides et Phleum
Moench.).

Linn. ed. Gil. 2. p. 20. Venten. 2. 97. Lam. t. 42.
Flor. dan. t. 531. Gaertner 2. 6. t. 80. f. 6. Moench.
meth. 203.

Gluma calycina uniflora, bivalvis, corollaceam includens, compressa, obtusa; *valvulis* navicularibus, inaequalibus, compressis, supra medium (sacpe, membranaceo-) carinatis, plus minusve acutis, marginibus parallele-conniventibus, rectis, raro altera alteram basi includeat; interdum adhuc *valvae* 2 minores, lanceolatae, inaequales, pubescentes, inter glumam corollaceam et calycinam adsunt. *Gluma corollacea* bivalvis, calycinae minor, *valvulis* subaequalibus, interdum cartilagineis, et basi pilosis. *Valvula exterior corollacea* oblonga, acuminate, convoluta; *interior* minor. *Squamulae* 2, intra Glumam corollaceam. *Flores* plerumque hermaphroditici, interdum polygamico-monoici. *Filamenta* tria, capillaria, calyce breviora. *Antherae* oblongae. *Ovarium* subrotundum. *Styli* duo capillares, raro inferne connati. *Stigmata* villosa. *Gluma co-*

rollacea semine crustae instar circumnata, nec dehiscens. *Semen* unicum, plus minusve compressum, tectum, glabrum, aut paululum inferne pilosum, ex rotundo utrinque attenuato-acutum, laeve, nitidum.

Panicula aut spiciformis aut manifesta.

1. *Phalaris canariensis*. Alpiste des Canaries.
Kanarien-Gras. ***

Phalaris canariensis, panicula subovata, spiciformi, glumis carinatis. Linn. ed.

Reich. I. p. 148. ed. Gil. 3. p. 64. s. v. ed. Pers. 105. hort. ups.

19. Mat. med p. 46.

Phalaris. Dod. pempt. 510. Lob. ic. 43. J. Bauh. hist. 2. p. 442. Raj. hist. 1248.

ovata. Moench. m. 208.

major, semine albo. C. Bauh. pin. p. 28. theatr. 534. Mor. hist. 3. p. 186. S. 8. t. 3. f. 1. Scheuchz. gram. 52. Magnol. bot. 202. hort. 158.

major, semine nigro. C. Bauh. l. c. Magnol. l. c. Raj. l. c.

panicula ovato-cylindrica spiciformi, glumis ciliatis. Ger. prov. 77. radice annua. Hort. cliff. 23. Ray. lugdb. 63. Dalib. par. 20. Sauv. 37.

Gramen spicatum, semine miliaceo-albo- et nigro. Tourn. 518. Buxbaum. hal. p. 147. Rupp. jen. p. 307.

phalaroides semine nigro. Mont. prodr. 47.

Lamarck. 1169. 5. Moench. hass. n. 52. Willden. prodr. n. 119. Leers. 17. t. 7. f. 3. Nekker gallob. p. 30. Lestib. 215. Kniph. orig. cent. 9. n. 76. Gaertner 2. p. 6. t. 80. f. 6. Goüan. hort. 33. Fl. m. 116.

Roth. I. p. 25 — 2. p. 66. Fl. d. Wett. I. 74. Schreber v. d. Graesern. 83. t. 10. f. 2. Boehm lips. n. 599. Reich. frc. 13. Nonne erf. p. 272. Plan. erf. p. 51. Zinn. goett. p. 60. Retz. obs. 3. p. 8. Herb. viv. pl. off. f. 8. n. 10. Hoffm. 28. Dietr. I. 83. Krock. sil. I. 80.

Radix annua, fibrosa, alba. Culmus (aut plures) **2-3** *pedalis*, *erectus, teres, striatus, pubescens aut subvillosum, nodis 4-5, glabris donatus, foliatus et saepe ramosus. Folia* **2-3** *lineas lata, 6 pollices — pedem longa, pubescentia, laeteque viridia. Ligula* *obtusa, alba, diaphana. Vaginae* *longae, striatae, laeves, superiores paululum inflato - ventricosae. Panicula* *densissima crassa, plerumque ovata, spiciformis, pollicem circiter longa. Rhachis* *angulata. Bractea* *infra paniculam, et ejusdem fere longitudinis, aut loco ejus, margo. Spiculae* *circiter 2 lineas longae et paululum angustiores, breviter et inaequaliter pedunculatae. Gluma calycina magna, valvulis* *lineis viridibus et albis pulcherrime pictis, glabris, membrana dorsali carinante, supra medium magna, donatis. Valvulae intermediae* **2**, *inter glumam corollaceam et calycinam, priori duplo minores, carinatae, lanceolatae, aut glabrae, aut pubescentes. Gluma corollacea hirsuta. Semen* nitidissimum, compressiusculum, albido.

Var. 1. Semine griseo aut nigrescente.

2. panicula cylindrica.

3. glumis calycinis laeviter villosis.

Flor. Praer. — Therm. Matur. Therm. — Vend.

β. Mai. — β. Aug. — β. Jul. — β. Aug.

Habit. in pratis; inter segetes; in maritimis.

Gall. in Depart. des Bouches du Rhone, du Gard et de l'Herault. Germ. in Hass. Saxon. Brand. Herborn. Siles. Austr. Nassov. Salisb. et Thur. —

Off. Semen canariense.

2. Phalaris arenaria. Alpiste des Sables.
Sand-Glanz-Gras. ***.

Phalaris arenaria, spica ovato-lanceolata, glumis ciliatis, culmo ramoso. Sow. engl. bot. t. 222. Hoffm. 29.

Phleum arenarium, spica ovata, ciliata, culmo ramoso. Linn. ed. Reich. 1. 164. ed. Gil. 3. 71. s. v. ed. Pers. 110. hort. cl. 23. it. Scan. 190. Fl. svec. 2. n. 58.

Gramen typhinum, maritimum, minus. Scheuchz. agr. p. 63. Pluk. alm. 177. t. 33. f. 8. spicatum maritimum minimum, spica cylindracea. Tourn. 520.

Lamarck. 1168. 7. Roy. lugdb. 54. Goiani. fl. 117. Roth 1. p. 29. 2. p. 77. Reit. 2. p. 153. Flor. dan. 915. Wigg. prim. p. 6. Dietr. 1. 90. Krock. sil. 1. 100.

Radix annua, fibrosa, alba. Culmi plures ex una radice, infra paniculam paululum nudi, aut toti tecti, 4-6 pollices longi, inferne geniculato-decumbentes, dein erecti, firmi, laeves, nodis 3-4, parvis, purpureis. Folia plana, scabra, lanceolato-mucronata, inferiora plerumque sicca, superiora laete viridia. Ligula diaphana, acuta. Vaginae culmum tegentes, glabrate, striatae, summa maxima, inflata. Panicula spiciformis, 6-14 lineas longa, teres, utrinque attenuata, pallide viridis. Spiculae oblongae, brevissime pedunculatae. Gluma calycina valvulis compressis, aequalibus, angustis, navicularibus, dorso rigide ciliatis, lanceolato-acuminatis, nervosis. Gluma corollacea parva, valvulis obtusis, crenatis.

*Flor. Praer. — Fruct. Matur. Fruct. — Vend.
β. Mai — β. Sept. β. Aug. — β. Oct.*

Habit. in locis arenosis, maritimis. *Gall.* in Depart. de l'Hérault; du Gard; des Bouches du Rhône; du Mont-tonnerre (prope Moguntiacum circa Hartemühl ad rivulam Hartebach, versus hortum Wallendorf). — *Germ.* in Holsat. Brem. Hercyn. Siles. Jevern.

5. *Phalaris paradoxa.* Alpiste rongé. Zer-fressenes-Glanz-Gras. ***

Phalaris paradoxa, panicula cylindrica, flosculis microhatis, neutris plurimis, infimis praemorsis. Linn. Reich. I. p. 140. ed. Gil. 3. p. 65. s. v. ed. Pers. 106. Linn. fil. Dec. 35. t. 18. praemorsa. Lamark. 1169. 7. panicula ovato-oblonga, apice dilatata. Ger. prov. 75.

Gramen phalaroides, lusitanicum. Raj. hist. 1218. spica brevi reclinata, ex utriculo prodeunte. Pluk. alm. 77. t. 33. f. 5. Moris. hist. 3. p. 187. s. 8. t. 3. f. 6.

Schreber Graes. t. 12. Moench. meth. 208.

Dietr. I. 84.

Radix annua, fibrosa, alba. *Culmi* plures teretes, pedales — bipedales, ante anthesin decumbentes, dein adscendentibus, ramosi, foliati, internodio supremo brevi, scabro, inferne compressi. *Folia* 2-4 lineas lata, plana, glabra, striata, mucronata, pedalia, sesquipedalia, scabra. *Vaginae* scabriuscule, margine albido, oblongae, inflato-ventricosae, *suprema* paniculam juniores tegens, et apicem florentis fere attingens. *Ligula* membranacea, fissa. *Panicula* spiciformis, oblonga, ex pedunculis congestis, adpressis, densis constans, inferne quasi erosa, versus apicem latior, teres, ex albido-viridis.

Spiculas inferiores, tam peduncularum, quam paniculae, abortientes, aut masculae. Valvulae glumae calycinae compressae, membranaceo-carinatae, acutae, mucrone debili mollique, aristae simili, praeditae. Valvulae intermediae parvae. Valvulae glumae corollaceae pubescentes. Antherae pallide flavae. Stigmata pubescentia.

Flor. Praer. — Fruct. Matur. Therm. — Vend. 8. Mai. — 8. Sept. 8. Jul. — 8. Oct.

Habit. in siccis, apricis, cultis et incultis. Gall. in Dep. du Var; des Bouches du Rhone; des basses Alpes; de la Vaucluse.

4. Phalaris utriculata. Alpiste à Vessié.

Beutelgras. ***

Phalaris utriculata, panicula spicata, petalis arista articulata, vagina supremi folii spathiformi. Linn. ed. Reich. I. 149. ed. Gil. 3. 65. s. v. ed. Pers. 3. 65.

Gramen spicatum pratense, spica ex utriculo prodeunte. Tourn. 519.

spicam folio amplectens. J. Bauh. hist. 3. p. 469.

pratense, spica purpurea ex utriculo prodeunte, s. gramen folio spicam amplexante. C. Bauh. p. pag. 3. theatr. 44. Scheuchz. agr. 55. Magn. bot. 114.

Lamarck. 1169. 6. Goüan. fl. m. 116. hort. 545.

Radix annua, fibrosa, alba. Culmi teretes, glabri, foliati, pedales — sesquipedales. Folia angusta, lineam dimidiata — integrum lata. Vaginae foliorum laxae, glabrae, striatae; suprema spathiformis, paniculam juniores involvens, florenti oppo-

sita et apicem ejusdem fere attingens. *Panicula* spiciformis, ex pedunculis racemosis congestis, densis, adpressis constans, crassa, ovata, 6-9 lineas longa, barbata. *Gluma calycina* ex albido et viridi, interdum ex purpureo, picta. *Gluma corollacea* aristata, *arista* geniculata.

Flor. et *Matur.* Sicuti antecedens.

Habit. in pratis humidis, udis. *Gall.* in Dep. de l'Herault; de l'Aude; du Gard; Haute-Garonne; du Rhone; de la Loire.

5. Phalaris arundinacea. Alpiste roseau. Schilf-Glanz-Gras. *

Phalaris arundinacea, panicula oblonga, ventricosa, ampla. Linn. ed. Reich. I. 150. ed. Gil. 3. 65. s. veg. ed. Pers. 106. Fl. sv. 48. 53.

picta. Linn. l. c.

panicula oblonga. Sauv. p. 311.

Calamagrostis colorata. Sibth. Fl. ox. p. 37.

Baldingera colorata. Fl. d. Wetter I. p. 96.

Arundo, foliis planis, panicula spicata, spiculis confertis. Hort. cliff. 26. Roy. lugd. 66.

locustis unifloris fasciculatis imbricatis, glumis floralibus nitentibus, subhirsutis. Hall. helv. n. 1524.

Typhoides arundinacea. Moench. m. p. 202.

Gramen paniculatum, aquaticum phalaroidis semine. Scheuchz. agr. p. 126. Hall. goett. p. 46. Tourn. 523. Mapp. 135. Rupp. jen. p. 314.

aquaticum latifolium. C. Bauh.

pin. p. 3. Berg. frc. p. 317.

Magn. bot. app. 397. Tourn.

l. c. Volck. nor. p. 197. Rupp.

l. c. p. 313.

folio variegato. C. Bauh. p. 3.

Tourn. l. c. Magn. l. c. et hort.

90. Doerr. nass. n. 23. β.

Scheuchz. agr. p. 127.

arundinaceum, spicatum. C. Bauh. p. p. 6.

theatr. p. 94.

acerosa gluma. Dill. giess,

p. 129.

jerceianum. Raj. angl.

3. p. 400. Mor. h.

3. p. 203. t. 6. f. 41.

minus cum spica. J. Bauh.

h. 2. p. 481.

Lamarck 1169. 8. Poll. I. 51. Lestib. 215. Dalib. par. 19. Goüan. hort. 34. fl. 116. Matusehk. I. 37. Gmelin tub. 15. Doerr. nass. n. 23. Panz. 12. 207. Leyss. hal. n. 62. Gmelin. sib. I. p. 86. Röth. I. p. 26. 2. p. 67. Reyg. gedan. I. p. 34. n. 2. Moench. hass. n. 53. Nekker gallop. p. 30. Murr. prodr. p. 41. Weig. pom. n. 38. Scholl. barb. n. 55. Nonne erf. p. 273. Plan. erf. p. 51. Wigg. prim. p. 6. Jacq. vind. p. 12. Willd. prodr. n. 120. Zinn. goett. p. 60. Reich. frc. 13. Oed. Tab. 259. Leers. 17. t. 7. f. 3. Berg. frc. p. 317. Schirank. I. 314. Boehm. lips. n. 600. Dietr. I. 85. Hoffm. 29. Delarbre. 149. Krock. sil. I. 81.

Radix perennis, lignosa, geniculata, crassa, fibrosa, alba. *Culmus* firmus, glaber, erectus, nodis 4-6, purpureis donatus, laevis, teres, 2-8 pedes altus, foliatus, inferne saepe ex nois radicans. *Folia* plana, 4-6 lineas lata, laete viridia, margine et nervo inter medio albo praedita, nervosa, pagina inferior, et marginibus scabris, acuminata, 4-6 pollices longa. *Ligula* magna, alba, diaphana, obtusa, mox lacera aut incisa, mox integerrima. *Vaginae*

glabrae, striatae. *Panicula junior* contracta, spiciformis, teres, semipedalis et longior, *florens* manifeste composita, *pedunculis* patentioribus, racemosis, geminis, raro ternis, longis, subflexuosis, interdum subbracteatis, altero longiore. *Spiculae* compressae, lanceolatae, imbricatae, inaequaliter pedicellatae. *Gluma calycina valvulis* glabris, angustis, acuminatis, altera alteram basi paululum amplectente, utraque ex albo et viridi, interdum quoque ex violaceo variegata. *Gluma corollacea valvulis* versus basin subcartilagineam pilosis. *Squamulae* 2, lanceolatae, acuminatae, margine exteriore unidentatae. *Antherae* flavae, aut violaceae. *Styli* versus basin connati. *Semen* nitidissimum, vix basi pilosum.

Var. 1. Culmo ramoso.

2. *Foliis latioribus.*
3. — *ex albo s. flavescens variegatis.*
4. *Spicis viviparis.*
5. *Semine nigrescente.*

Flor. Praer. — Therm. *Matur.* Therm. — *Vend.* 6. Mai — 6. Aug. — 6. Julij — 6. Oct.

Habit. in pratis uidis, humidis, sylvis, ad ripas fluviorum, margines piscinarum, lacuum, tot fere. *Gall.* in Dep. du Mont-tonnerre, prope Molluntiam (in fossis circa urbem; in pratis prope der Viehweide), Lautern, Worms, Spiram, Rotenbach, Sambach, Oppenheim. — et *Germ.*

AD TAB. VIII.

VII. Phleum. Fléau. Lieschgras (Gramen Tourn.).

Venten. 2. 97. Linn. ed. Gil. 2. 21. Lam. t. 42.
Fl. dan. t. 380. Gaertn. 1. 1. 1. Moench. m. 177.
Hoffm. D. Fl. ic. 5.

Gluma calycina persistens, uniflora, apice dehiscens, bivalvis; *valvulis* oblongis, fere linearibus, interdum gibbis, plerumque superne paululum latioribus, compresso-et-naviculare-concavis, rectis, subaequalibus, aut aequalibus, apice plus minusve truncatis, e carina dorsali cuspidatis, exteriore interiorem basi subamplectente. *Gluma corollacea* bivalvis, calycina brevior, *valvulis* inaequalibus, obtusis aut acutiusculis, integris aut crenulatis, exteriore majore, minorem *interiore* amplexante. *Squamulae* 2, concavae, ovatae, acuminatae. *Filamenta* tria, raro 2, capillaria, gluma calycina longiora. *Antherae* oblongae, plerumque bifurcatae. *Ovarium* subrotundum. *Styli* duo capillares, reflexi. *Stigmata* plumosa. *Gluma corollacea* semen arcta includens, ei adnatum, nec dehiscens. *Semen* unicum, subrotundum exsulcum.

Panicula aut *spica* densa, plerumque valde arida. *Spiculae* setaceo bicornes, sessiles aut brevissime pedicellatae.

1. Phleum pratense. Fleau des près. Wiesen-Liesch-Gras. *

Phleum pratense, *spica cylindrica*, *longissima*, *ciliata*, *caule erecto*. Linn: ed. Reich. I. p. 162. ed. Gil. 3. p. 70. s. v. ed. Pers. 110. Fl. sv. 50. 56. Fl. lapp. 26. hort. cliff. 22.

caule erecto, *spica cylindrica*, *longissima*, *glumis calycinis oblique truncatis*. Hall. helv. n. 1528.

calycibus linearibus, *ciliatis*, *truncatis aristatisque*, *aristis brevibus* (cum nodoso conj.) Schreb. gr. 102. t. 14.

Gramen

Gramen typhoides maximum, spica longissima. C. Bauh. p. p. 4. pr. p. 10. Dill. giess. p. 129. Vaill. par. 83. Buxbaum hal. p. 47. Scheuchz. agr. p. 60. Hall. goett. p. 50. Zanichel. Ven. p. 121. t. 144. Mor. hist. 3. p. 188. s. 8. t. 4. f. 1.
spicatum, spica cylindrica, longissima.
 Rupp. jen. p. 308. Tourn. 519.
 Mapp. 130.
cum cauda muris majoris, majus. J.B. hist. 2. p. 472.
typhoides asperum primum. C. Bauh. p. p. 4.
molle. Magn. bot. 114. hort. 91?
 Murr. prodr. p. 41. Lamarck. 1168. 4. Ray. lugdb. 53. Moench. hass. n. 50. méth. 177. Pollich. 1. 59. Dalib. par. 20. Dietr. 1. 89. Scholl. barb. n. 54. Nonne erf. p. 273. Panzer. Lin. 12. 254. Wigg. prim. p. 6. Plan. erf. p. 52. Seguier. ver. 1. p. 349. Boehm. lips. p. 601. Weig. pom. n. 41. Leers. 16. t. 3. f. 1. Roth. 1. p. 28. 2. p. 75. Gmelin. sib. 1. p. 89. n. 16. Reich. frc. 12. Willden prodr. n. 127. Goüan. hort. p. 36. n. 1. (err typogr.) fl. 116. Berg. frc. p. 317. Wilke gryph. n. 33. Lest. 214. Doerr. nass. n. 26. Nekker gallob. p. 34. Hoffm. 33. ic. 5. Gmel. tub. p. 16. Sauv. 34. Matuschk. 1. 42. Schrank. 1. 319. Grimin. isen. n. 260. Gunn. norv. n. 60. Jacq. vind. p. 12. Zinn. goett. p. 60. Krook. sil. 1. 99. Delarbre 150.

Radix perennis, ramosa, fibrosa. Culmus inferne plerumque geniculatus, incrassatus (fere bulbosus) erectus, striatus, laevis, interdum ramosus, 2-4 pedes altus, teres, glaber, superne paululum nutans, nodis 4-5 atro-fuscis, glabris. Folia pagina superiore et nervo dorsali albido carinante scabra, lanceolato-mucronata, pedem circiter longa,

D

4-5 lineas lata, laete viridia. *Vaginae* laeves, glabrae. *Ligula oblonga*, obtusa, Rssa. *Panicula*, fere *spica*, in flexione pedunculis ramosis non manifestis, 2-7 pollices longa, cylindrica, pallide viridis. *Spiculae* parvae, densissime confertae, aliae sessiles aliae brevissime pedicellatae, *pedicellis* parvis per lentem ramosis, florentes magis divergentes. *Gluma calycina valvulis* oblique truncatis, punctatis, carina ciliatis (setulis alternatim brevioribus raro furcatis), nervosis, ex albido viridibus. *Gluma corollacea valvula exteriore 5 nervia*, nuda, acutiuscula, crenulata. *Squamulae* ovato-acuminatae, *Ovarium* basi amplexantes. *Antherae* violaceae aut flavae. *Stigmata* alba, plumosa.

Var. I. Spica in flexione ramosa.

2. *Spiculis viviparis.*

Flor. Flor. — *Fruct.* Natur. Mess. — *Vend.*

β. Apr. — β. Sept. β. Aug. — β. Oct.

Habit. in pratis et versuris, siccis et humidis: totius fere *Galt.* (in nostro Dep. prope Moguntiacum, in pratis ante portam Gauthor, Jungensfelder Aue, et mombacensisibus. Lautern etc.) et *Germ.*

2. *Phleum nodosum.* Fléau noueux. Knotiges-Lieschgras. *

Phleum nodosum, spica cylindrica, culmo adscendente, foliis obliquis, radice bulbosa. Linn. ed. Reich. I. 163. ed. Gil. 3. p. 71. s. v. ed. Pers. 110.

bulbosum, Goëtan. h. 36. fl. 117.

pratense. var. Schreber. Graes. I. c.

caule imo bulboso, declinato, glumis calycinis obtuse truncatis. Hall. helv.

n. 1530. radice bulbosa et nodosa. Sauv. 26. et 34.

Phalaris spica cylindrica, brevi, radice nodosa.
Berg. frc. p. 318.

Gramen typhoides, asperum, alterum. C. Bauh. pin.
p. 4. theatr. 52. Buxb. hal. p. 148.
Dill. gress. p. 116. Scheuchz. agr.
p. 62. Hall. goett. p. 50. Seguier.
ver. Suppl. p. 154.
arvense, radice tuberosa, spica
aspera longa. Petiv. gram. ital.
T. 3, f. 1.
minus, Lob. ic. 9.
nodosum. Mor. h. 3. p.
194. s. 8. t. 4. f. 3.

typhinum supinum, tuberosum, spica as-
pera. Barr. ic. 53.

typhinum. Lob. ic. 10.
spicatum, spica cylindrica brevi, radice no-
dosa. Tourn. 520. Rupp. jen. p.
308. Mapp. 131.
nodosum, spica parva. C. Bauh. p. p. 2.
prod. p. 3. theatr. p. 20. Magn.
bot. 114. hort. 91.

Lamarck. 1168. 5. Lestib. 214. Hoffm. 33. Roth.
1. p. 29. 2. p. 76. Poll. 1. p. 60. (verisimil. cum as-
pero conj.) Murr. prod. p. 41. Scholl. barb. suppl.
n. 1018. Wigg. prim. p. 6. Moench. lass. n. 51. meth.
177. Fl. d. Wet. 1. 84. Willden. pr. p. 128. Scop. 1.
55. Oeder. t. 380. Schrank. 1. 320. Doerr. nass. p. 26.
Leers. 17. t. 3. f. 2. Panz. Lin. 12. 257. Reich. frc.
12. Delarbre. 150. Krock. sil. 1. 98.

Radix perennis, bulbosa, bulbis plurimis fas-
ciculatis, fuscis, fibrosis. *Culmus* ex singulo bul-
bo solitarius, tenuis, laevis, glaber, pedalis — bipe-
dalis, geniculato-decumbens dein adscendens, nodis
inferioribus approximatis, foliatus. *Folia* basi obli-
qua, utrinque et in margine scabra, lineam vix lata,

6 lineas - 2 pollices longa, ex viridi - (sicuti tota planta) glauca. *Vaginae* subcompressae, scabriusculae aut laeves, vix ventriculosae. *Ligula* diaphana, alba; *integra*, acuta. *Ausflagescentia* uti in *prateni*. *Panicula* spiciformis, 1. 3 pollices longa, 3 lineas lata, ex viridi, et albido-glaucā, raro purpurascens, basi non semper sed saepe spiculis sterilibus emarcidis instructa. *Spiculae* exiguae. *Gluma calycina* adhuc dorsum carinatis, ciliatis, cuspidibus post anthesin incurvis. *Antherae* violaceae.

Kar. 1. Spica parva, sifere ovata (prope Mogunt. in arenosis).

2. pedunculis radis ex spicae lateribus preventientibus, apice spiculis fasciculatis donatis (Lautern).

3. Culmo a basi erecto (Mogunt. in arenosis).

Flor. Flor. — *Mess.* + *Matur.* Mess. — *Fruct.*

1. 8 Apr. — 8 Julij. 16. 6 Jun. — 6 Sept.
Habit. in sterilibus, arenosis, pratis siccis, veranris; ad vias, fossas humidas; in arvis, cultis: tot. fere Galli (prope Mogunt. in arenosis, et Gonzenheimer Wald, Lautern etc.) et Germ. —

3. *Phleum phalaroides*. Fleau-alpiste. Glanz-Lieschgras *.

Phleum supremi foliis *vagina* ventricosa, *panieula* spicata, cylindrica, locustis aristatis Boelini lips. n. 602.

panicula cylindrica, spiciformi, glumis glabris, culmo subramoso. Hudson. angl. p. 23.

culmo rectio, spicis cylindricis, glabris, calyce brevissime mucronato. Hall. helv. n. 1531.

Boehmeri. Wibel. Fl. Werth. 125.

Phalaris phleoides, panicula cylindrica, spiciformi,
glabra, passim vivipara. Linn. ed.
Reich. I. 149. ed. Gil. 3. 65. s. v.
106. Fl. suec. 49. 34.

Gramen spicatum, spica cylindrica, tenuiore, longa.

Tourne. 520. Mapp. 131. Scupp. Jen.
p. 308.

cum cauda nitida, minus. J. Bauh. hist. I.
p. 471.

typhoides, spica purpurascente, foliacea.

Gmel. 619. Scheuchl. agr. p. 67.

medium Isen. vulgatissimum.

Mor. hist. 3. p. 193. t. 4. f. 2.

typhinum junceum perenne. Barr. ic. t. 21.

Lamarek. I. 69. 2. Dalib. par. 19. Gotha. hort. 33.
fl. 116. Leyss. hall. II. 619. Gmel. sib. I. p. 86. Murr.
prodr. p. 41. Schrank. 1. 314. Wigg. prim. p. 5. Diétr.
I. 84. Hoffm. 29. Oeder. 531. Fl. d.-Wet. I. p. 75.
Roth. I. p. 27. 2. p. 67. Bestib. 215. Berg. fid. 317.
Matuschk. I. 37. Griseb. Isen. p. 126. Pätz. 12. 204.
Weig. pom. n. 38. Reichenb. 13. Wilke. gyph. n. 31.
Zinn. goett. p. 60. Sow. engl. bot. 479. Timm. prodr.
613. Poll. 150. Delarbie. 149. Kruck. sil. I. 79.

Radix annua, fibrosa, saepe ramosa. *Culmi* fa-
sciculati, inferne geniculati, dein erecti, stricti,
magna ex parte audi, pedales (— 3 pedales, tenues,
glaberrimi, laeves, ex viridi et glauco purpurei,
juniores virides, nodis 2—3 raro pluribus praediti,
internodio supremo maximo, foliati. *Folia* lineam
vix dimidiam — unam latam 2—3 pollices longa, plana,
basi oblique inserta, superiora brevissima, mucro-
nata, nervo dorsali et margine albida, glauco-viridia,
glabra, marginibus scabris donata, striata. *Ligula*
diaphana, alba, obtusa. *Vaginæ* glabrae, striatae,

suprema longissima, paululum inflato-ventricosa. *Panicula contracta*, spiciformis, flexa lobosa apparenſ, ratemulis denses adpressis, multifloris, uncialis - 4 pollices longa, 2 - 4 lineas lata, subarida, cylindrica. *Spiculae exiguae*, dense congestae, ex albido-virides, aut paululum violaceae, brevissime pedicellatae, cuspidibus apicibus valvularum calycinarum subtruncatarum insidentibus, brevibus. *Gluma calycina valvulis* margine interiore diaphano, membranaceo, nervo dorsali glabro, (nunquam sub apice valvulas ventricosas vidi,) altera paululum latiore. *Gluma corollacea* glabra valvulis oblongis, integris. *Antherae flavae*. *Stigmata alba*. *Semen exiguum viridescens*.

Var. 1. culmo ramoso, ramis interdum floriferis. (Mogunt.)

2. *Spiculis viviparis*.

Flor. Flor. — *Mess. Matur. Mess.* — *Fruct.*

β. April. — β. Jul. — β. Jun. — β. Sept.

Habit. in muris limosis, versuris, arenosis, pratis siccis, pomariis, collibus juniperinis, montosis, ad margines agrorum, et vineas, *Gall.* in Dep. du Haut- et Bas-Rhin; de l'Herault; du Gard; de la Loire; du Rhône; du Doubs; du Mont-tonnerre etc. (prope Mogunt.) — in arenosis, et am Gonzenheimer Wald, — Dürckheim, Calsstadt, Herxheim, Spiram, Oggersheim, Wormatiam, Alzei, Steinbach.) *Germ.* in Holsat. Saxon. Goett. Wetterau; Siles. Austr. Bavar. Suev. Pom. Francon. Megap.

4. *Phleum asperum*. Fléau rude. Steifes Lieschgras ***.

Phleum asperum spica cylindrica, glumis calycinis carinatis, superne gibbis, mucronatis, asperis. Hoffm. 32.

Phleum ventricosum. Moench. Meth. 177.

Phalaris aspera. Jacq. ic. I. t. 23.
panicula mutica, cylindrica, spiciformi, glumis calycinis carinatis, superne gibbis, corolla bivalvi glabra. Willden.

Radix annua, fibrosa. Culmī inferne fasciculati, plerumque arcuatim curvati, adscendentes, interdum ramosi, superne paululum nudi, glabri, laeves, tenues, virides aut rubelli, nodis 6 - 8 fuscis, foliati, digitales, sesquipedales, teretes. Folia lanceolata, basi oblique inserta, suprema 4 - 10 lineas, inferiora 2 - 3 pollices longa, 1 - 2 lineas lata, scabra, glabra, striata. Vaginae nervoso-striatae, glabrae, subscabrae; suprema inflato-ventricosa, longa. Ligula obliqua, acutiuscula, integra, parva. Panicula spiciformis, in flexione lobosa, lobulis racemosis, 1 - 3 pollices longa, 2 lineas lata, cylindrica, utrinque attenuata, ex glauco- et albo-viridis, spiculae brevissime pedicellatae, fasciculatim et densissime congestae, exiguae, inferiores steriles. Gluma calycina valvulis apice valde truncatis, dorso carinato curvato, gibbo, scabro, cuspide arido mutico, margine anteriore albo, diaphano, nervoso. Gluma corollacea exigua, vix manifesta, glabra, obtusa. Antherae pallide flavae. Stigmata alba.

Var. Culmo erecto. (Mogunt.)

Flor. Flor. — Fruct. Matur. Therm. — Vend.

β. April. — β. Sept. α. Oct. β. Jul. — β. Oct.

Habit. in arenosis, sterilibus, siccis; agris. Gall. (prope Mogunt. im Gonzenheimer Wald, et sic dicto Sand.) Germ. in Franconia.

5. Phleum alpinum. Fléau des Alpes. Alpen-Lieschgras *.**

Phleum alpinum spica oyato-cylindrica. Linn. ed. Reich. I. 163. ed. Gil. 3. 71. s. v.

1634

Panicum 2018 ed. Pers. 110. fl. lapp. 25. fl. suec. 1519 ab aliis 51, 157. spicis ovatis hirsutis, locustis longe bicor-
nibus. Hall. helv. n. 1529.

Gramen typhoides alpinum, spica brevi, densa, et
veluti villosa. Mont. prodr. p. 50.
Scheuchz. agr. p. 64. prodr. 3. app.

Lamark. 1518. Seguier. veron. suppl. 155.
Lamark. 1518. 4. Dalib. par. 20. Roth. I. p. 29.
2. p. 77. Dietr. I. 89. Panz. lin. 12. 257. Hoffm. 32.

Gmelin tub. p. 16. Berg. fr. p. 317. Scop. I. 54.
Jacq. vind. p. 13. Schrank. I. 320. Oeder t. 213.
Engl. bot. 519. Delarbre 150. Kruck sil. I. 97. t. 20.

Radix perennis, repens, fibrosa. *Culmis* laevis,
glaber, geniculato-decumbens, adscendens, pedalis,
et longior, articulatus, foliatus, nodis fuscis 2-4.
Folia lineam lata, 3-4 longa, lanceolata, scabra.
Vaginae striatae, paululum inflatae. *Ligula* diapha-
na, obtusa. *Panicula* spiciformis, densa, in flexione
haud lobata, villosa, utrinque attenuata, plus mi-
nusve ovata, arida, aetate nigrescens, 1-1½ pollic.
longa. *Spiculae* exignae, ex purpureo nigrescentes,
albido variegatae. *Glumae calycinae* valvulae dorso
maximo ciliato, apice truncato-emarginato cuspidato,
cuspite ciliato, longitudinis valvulae aut ea lon-
giore. *Glumae corollaceae* valvula altera truncata,
altera bifida, utraque albida membranacea. *Antherae*
flavae, *Stigmata* alba.

Var. *Panicula* cylindrica.

Flor. Praer. — *Fruct.* Matur. Therm. — *Vend.*
6. Maj. — 6. Sept. — 6. Jul. — 6. Oct.
Habit. in pratis, siccis, montosis, alpinis. *Gall.*
in Depart. de la Loire; du Rhône; du Jura; Haute-
Saône; de la Drome; des hautes Alpes; de l'Isere;
du Var, des Bouches du Rhône; basses-Alpes; et

de la Vauchise etc. *Gesnl.* iii. Carn. Siles. Austr. Bav. Salisb. prope Tubing. ? et Freibfurther ad Viadr. ?

6. Phleum monspeliense. Fléau de Montpelier. Montpelliherisches Lieschgras ***.

1480.

Alopecurus monspeliensis, *panicula subspicata*, *calycibus scabris*, *corollis aristatis*. Linn. ed. Reich. I. 166. ed. Gil. 3. 73. s. v. ed. Pers. III. Goian. II. 69. Kniph. orig. cent. 12. n. 5. Lamarck. 1167. 8. *paniceus*, *panicula subspicata*, *glumis villosis*, *corollis aristatus*. Linn. ed. Reich. I. 167. ed. Gil. 3. 73. s. v. ed. Pers. III. Kniph. or. c. 2. n. 6. Murr. pr. p. 41. Flor. dan. t. 861. Roth. I. p. 30. 2. p. 79. Plan. erf. p. 53. Weig. pom. n. 44. Hoffm. ed. I. p. 20. Wilke gryph. II. 36. Goian. II. 69. Lamarck. 1167. 8. Krock. sil. I. 104. aristatus. Goian. II. 37. *panicula villosa*, *oblonga*, *folio involuta*. Sauv. Mousp. p. 37. altera maxima, anglica paludosa. Moris. h. 3. p. 191. s. 8. t. 4. f. 3. J. Bauh. hist. T. 2. p. 474. Raj. h. I. 266. maxima anglica. Park. theatr. 1166. Raj. syn. 3. p. 396.

Phleum crinitum. Schreber. Graes. I. 151. t. 20. f. 3.

Agrostis crinita. Moench. meth. 178.
panicula oblonga, calycibus aequalibus,
terminatis aristis longis
rectis. Ger. prov. 80.

Panicum maritimum, spica longiore villosa. Tourn.
spica composita, aristis spica longioribus.

vagum. Scopoli. 2. p. 51.
Cynosurus panaceus. Fl. svec. 45. 90.

Cauda vulpis monspeliensis, Alopecurus Theophr.
Lobk. 45.

Gramen alopecurum majus, spica virescente divulsa,
pilis longioribus. Barrel.
ic. 115. f. 2. Scheuchz.
agr. 155.

minus spica virescente divulsa.
Barr. ic. 115. f. 1.

spica longiore. C. Bauh.
pin. p. 4. theatr. 57.
Scheuchz agr. p. 154.

Magnol. bot. 115.

alopecuroides anglo-britannicum maximum.

C. Bauh. p. 4.

Radix annua fibrosa. *Gulmus pedalis - bipedalis,*
teres, foliatus, glaber, laevis, paululum inferne
geniculatus, dein erectus, pennae anserinae crassi-
tie, nodis fuiscis. *Folia 2 - 3 lineas lata, 3 - 10*
pollices longa, glabra, plana, horizontalia, lanceo-
lata, marginibus scabris, laete viridia. *Vaginae*
teretes, laeves. *Ligula alba, oblonga, pilis brevi-*
bus obsita, incisa. *Panicula 2 - 5 pollices longa,*
ex ovali-lanceolata, viridescens, aetate rufescens,
mollis, aristata ramosa, pedunculi spiciformibus
brevibus, inaequalibus, in semiverticilos alternos
collectis, superioribus alternis aut sparsis. *Rhachis*

communis teres, laevis. Pedicelli capillares, ad apicem incrassati, fere tuberculosi, breves. Spiculae semilineam longae, fasciculatae, ex ovato-lineares. *Gluma calycina valvulis* per lentem basi scabris, villosis, membranaceis, albis, apice oblique truncato, nervo dorsali viridi, *arista* tenera alba, 3 lineas longa. *Gluma corollacea per lentem bivalvis*, alba, *valvula* exteriore ovata, apice dentato, aristata, *arista* brevissima, *interiore* angustiore, breviore, lanceolata, crenata. *Squamulae* (in alopeturis carentes) 2, lanceolatae, obtusae, ad basin cartilagineae. *Antherae* albidae.

Var. paniceum (Alop. panic. L.) omnibus in partibus mollior et tenerior. *Culmus* vix palmaris, filiformis. *Panicula* densior, brevior, saepe nutans; ramis pluribus alternis. *Gluma calycina* villosior; marginibus ciliatis, minus scabra. *Arista* brevior. (In locis sterilio-ribus, ad stagna, in pratis, ad littora maris; *Gall.* in Depart. de l'Herault, des Bouches du Rhone etc. *Germ.* in Harcyn. *Goett.* Thur. *Pomer.* Carniol. *Siles.*)

Flor. Praer. — *Therm.* — Mai

— Aug. — Octol.

Habit. sicuti variet. *Gall.* in Dep. indicatis, porro in Dep. du Var; de la Vaucluse; Basses Alpes.

AD TAB. IX.

VIII. *Crypsis. Crëpsis. Kripsis* (*Anthoxanthum. L. Phleum. L. et Jacq.*

Antitragus Gaertner):

Venten. 2. 97. Lam. t. 42. Jacq. fl. austr. 5. t. 7.

Ait, hort. Kew. vol. I. p. 48. Schreber Graes. T. 32.
Gaertner. 2. 7. t. 80. 71 in 100 aut rotundatae.

Diffracta Phlea, foliis ovatis, amplexicantibus,
Bracteis 2-3 ad basin paniculas, foliis imilibus
amplexicanthibus, oppositis. *Glumas calycinae val-*
valvulis inaequalibus, muticis. *Glumae corollaceae*
valvulis oblongis, inaequalibus, muticis, altera
gluma calycina longiore. *Filamenta* 3 aut 2. *An-*
therae hastatae. *Cetera uti in primis.*

Panicula capituliformis, aut fere spiciformis.

11. *Oryopsis schoenoides* Cripsis couchée.

Liegende Kripsis. ***

Phleum schoenoides spicis ovatis obvolutis, foliis
amplexicanthibus, brevissimis mucronatis, am-
plexicantibus. Lin. ed. Reich. 1. p. 164. ed. Gil. 3. 72. s.v.ed.
Pers. mon. Goian. hort. 36. n. 2. Serpatypog. J. fl. 116. Cavanill.
hispan. § 2. 116.

Gramen maritimum typhinum, brevi et crassiore
spica, ad singula genicula pro-
dente, secundum. Scheuchz.
Agrostis supinum. Lantaren. 168. 9.

Rodix fibrosa et *Clematis digitales* - pedales, pro-
cumbentes, geniculati, foliati, glabri, nodis mul-
tis approximatis, rubris, idonati, ramosi, ramis spi-
ciferis. *Folia* 3-5 pollicés longa, $1\frac{1}{2}$ lineam lata,
glauco-viridia. *Hagiza laxae*, striatae. *Bracteas*
2, amplexicantes, breves, mucronatae. *Paniculae*
terminales et axillares, ovato-obtusae, pauculum
densae, 5-6 lineas longae. *Spiculae* lanceolatae,
compressae, $1\frac{1}{2}$ -2 lineas longae. *Kalvulae* *glumae*
calycinae in dorso albae, pellucidae, marginibus
viridibus serrulato-spinulosis et nervo dorsali viri-

di carinante praeditaæ, scabriæ, inaequales, erictæ, muticæ; exterior major et lñtior, subpellucida. Valvulae glumæ corollaceæ calycinis longiores, mutuo amplexantes, vix apertæ, carinatae, obtusiusculæ, in dorso scabrae, subpellucidae, altera integræ et brevior. *Filamenta* 3. *Anthers* gordide flavæ, basi hastatae.

Var. Filamentis 2. (nigra) singulas similes.

Flor. Messuæ — *Fract. australis* — *australis* — *Junæ* — *Septembris*

Habit. in locis humidis; *Gall. in Dep. de l'Hérault; de l'Aude; du Gard; Haute-Garonne.*

Secundum Schreberum Variet. sequentis.

2. Crypsis aculeata *Crypsis piquante.* Stechende Kripstis. ***

Crypsis aculeata. Aiton hort. Kew. vol. I. p. 48.
Phleum schoenoides. Jacq. s. austr. §. 29. t. 7.

aculeatum. Lamareck 1168. 10.

Phalaroides repens 3. floribus sessilibus fasciculatis, fastigiatis, involuero foliaceo bivalvigen compresso obtectis. Loeffl. Hisp. p. 114.

Schoenus aculeatus, culmo tereti rainoso, capitulis terminalibus, involucro triphylio, brevissimo, rigido patente. Linn. ed. Reicht. 1. 173. ed. Gil. 3. 51. Gouan. fl. 388. Geran. fl. gallopr. p. 119.

Anthoxanthum aculeatum, spicis subglobosis, involuero foliaceo brevi micronato. Linn. jun. suppl. p. 89. s. v. ed. Pers. 74.

Agrostis aculeata. Scop. I. p. 62.

Antitragus aculeatus. Gaertner. 2. 7. t. 80. f. 7.

Gramen aculeatum. Cam. epit. 745. supinum aculeatum, J. Bauh. hist. 2. p. 467.

album, capitulis aculeatis italicum. C. Bauli.
pin. 7. theatr. 109. Magn. bot. app.
297. Scheuchz. agr. 85. Moris. hist.
3. p. 195. s. 8. t. 5. f. 3.

spicatum, spicis in capitulum foliatum con-
gestis. Tourn. 519.

Graminis species singularis, an Dactylis? Poll. it. 2.
p. 713. t. K. f. 1. et t. A. f. 2.

Radix perennis (annua Jacq.) fibrosa, alba.
Culmii 4 - 10 pollices longi, rigidi, plus minusve
erecti, foliati, ramosi, ramis brevibus, teretiusculi,
uno latere planiore nodis rubellis instructi,
glabri, geniculato-flexuosi, substriati. *Folia* glau-
co-viridia aut albida, lanceolata, acuminato-mucro-
nata, striata, firma, 6 lin. — 2 pollices longa,
plana, glabra aut inferne rariter pilosa, nervo dorsa-
li et marginibus scabris. *Vaginae* laxae, striatae,
pururascentes, cylindricae, glabrae, superne mar-
ginibus ciliatis, internodiis breviores. *Ligula* bre-
vis, incisa. *Bracteae* 2-4, breves, oppositae, rigi-
dae, apice mucronato fere pungente, et spinuliformi,
basi concavae, latissimae et foliisimiles, vix
capitulo longiores. *Rhachis* oblonga, gracilis. *Pani-
culae* subrotundae, breves, capituliformes, cul-
mum et ramos terminantes. *Spiculae* et *Valvulae*
uti in antecedente. *Filamenta* 3, interdum 2. *Se-
men* irregulariter ovale, flavum.

Var. 1. Culmo procumbente. Jacq.

2. Stylo unico. Scop.

3. Vivipara.

Flot. Mess. — Vend. *Matur.* Vend. — Brum.

β. Jun. — β. Oct. β. Sept. — β. Nov.

Habit. in locis arenosis, maritimis. *Gall.* (in
Depart. de l'Herault; du Var; Bouches du Rhone
et du Gard) — *Germ.* in austriaco littorali.

AD TAB. X.

IX. Milium. Millet. Hirsengras (Miliarium Moench).

Venten. 2. 98. Linn. ed. Gil. 2. 21. Tourn. 298.
Gouan. hort. 38 et 547. t. 11. Schreber. gr. t. 28. f. 2.
t. 23. f. 3.

Gluma calycina uniflora, bivalvis; *valvulis* ventricosis, ovatis, acuminatis, subaequalibus. *Gluma corollacea* bivalvis, *calycina minor*: *valvulis* inaequalibus, ovatis, altera minore. *Filamenta tria* capillaria, brevissima. *Antherae* oblongae. *Ovarium* subrotundum. *Styli duo*, capillares. *Stigmata* penicilliformia. *Gluma corollacea* semen arcte includens. *Semen* unicum, gluma corollacea crustacea tectum, subrotundum, splendens.

Panicula laxa aut spiciformis, vel nuda vel barbata.

1. *Milium paradoxum*. Millet noir. Schwarzes-Hirsegas. ***

Milium paradoxum floribus paniculatis aristatis Linn. ed. Reich. I. 169. ed. Gil. 3. 74. s. veg. ed. Pers. 112. Scop. I. p. 58. t. I. Schreber. gr. t. 28. f. 2. Gouan. h. 38. fl. 117. Dietr. I. 92.

nigrum. Lamark. 1170. 4.

Agrostis paradoxa. Linn. spec. pl. I. p. 62.
racemis ternatis, pendulis, spicis aristatis,
arista undulata longa. Scop. ed. I. p. 186.
panicula patente, petalorum arista terminali recurva. Ger. prov. 81.
flosculis aristatis gemellis, altero sterili,
terminalibus ternatis. Sauv. monsp. 35.

Gramen paniculatum latifolium, locustis crassioribus, semine nigro aquilegiae simili.
Taur. 522.

avenaceum paniculatum, galloprovinciale, aquilegac semine. Moris hist. 3. p. 214.
Pluk. alm. 174. t. 32. f. 2.

Radix perennis, fibrosa. **Culmus** teres, 2-3 pedalis et altior, erectus, glaber, foliatus, nodis tribus, basi subinfractus. **Folia** basi rubella, semi-pedalia, 4-5 lineas lata, plana, glabra. **Vaginae** glabrae, longae. **Ligula** diaphana, longa, obtusa. **Panicula** laxissima, spithamea, superne nutans, alba, pedunculis ramosis, longissimis, plerumque inferiobus ternis, mediis geminis, raro quaternis aut quinque, omnibus angustatis, flexuosis, tenuibus. **Rhachis** teres. **Pedicelli** inaequales, apice dilatato, longi. **Spiculae** solitariae, ellipticae, in uno pedunculo 4-10, pendulae, aristatae. **Gluma calycina** laxa, valvulis glabris, carinatis, striatis, paululum oblongis, acutiusculis, laevibus, basi viridibus, versus apicem albidis et subpellucidis. **Gluma corollacea**, valvulis splendidis, altera elliptica, aristata, **arista** repanda, 4-6 lineas longa armata, altera fere eadem longitudine, acumine mutico. **Antherae** flavae, prismaticae. **Semen** nigrum, pilis raris praeditum, apice arista caduca, hinc sulcato.

Flor. Flor. — Therm. Matur. Mess. — Fruct. β. Apr. — β. Aug. β. Jun. — β. Sept.

Habit. ad vias, in sepibus, sylvis. **Gall.** — in Dep. du Var; bouches du Rhône; basses-Alpes; la Vaucluse; du Gard; de l'Herault. —

1508.
2. Milium Lendigerum. Millet lendier. Spreu-
artiges Hirsegras. ***

Milium lendigerum panicula subspicata, floribus
aris-

aristatis. Linn. ed. Reich. I. 167. ed.

Gil. I. 74. s. veg. ed. Pers. III.

Panicum serotinum arvense spica pyramidata. Tourn. 515.

Agrostis ventricosa calycibus inferne ventricosis,
valvula exteriore acuminata longitudine aristae. Goian. hort. 39. et
547. t. I.

australis. Linn. ed. Pers. III. et II2.

Gramen serotinum arvense, panicula pyramidali.
Raj. hist. 1288. Scheuchz. agrost.
148.

loliaceum panicula ramosa, lutea. Magn.
bot. app. 297. Moris. hist. 3. p. 182.
s. 8. t. 3. f. 12.

alopecuro accedens, ex culmi geniculis
spicas in petiolis longiusculis pro-
mens. Pluk. alm. 177. t. 33. f. 6.

Lamarck. 1170. 3. Dietr. I. 92. Goian. fl. 117.

Schreber. graes. 23. f. 3.

Radix annua, fibrosa, alba. *Culmus* 5 pollices —
pedem longus, foliatus, plerumque ramis contractis,
spiciferis auctus, filiformis, glaber, internodio su-
premo longissimo. *Folia* subulata, acuta, 2-3 pol-
lices longa vix lineam lata, glabra. *Vaginae* tere-
tes, glabrae, striatae. *Ligula* longa, fissa, dia-
phana. *Panicula* ramosa, ramis contractis, spici-
formis, pyramidalis, virescens, aut argentea, matu-
ra rufescens, $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, basi 3-4 lineas lata.
Pedunculi scabri, inaequales. *Spiculae* parvae, ex
viridi-flavescentes. *Gluma calycina valvulis* cari-
natis, ventricosis, acuminatis, membranaceis, gla-
bris, laevibus; *exteriore* majore, carina scabra in-
structa, subpilosa, viridi. *Gluma corollacea mem-*
branacea, *valvula exteriore* ventricosa, pilosa, apice
quinquedentato, infra apicem in dorso aristata, *arista*

geniculata, tortili, fusca, longitudine valvulae calycinae majoris, aut paulo longiore: *interiore laevi*, basi pilosa, apice bisido. *Semen ex flavescenti-fuscum*, latere altero sulcatum, villosulum.

(*Milium lendigerum* et *Agrostis australis* L. specie non differunt sive Herbar. Linn. Vahl. symb. bot. p. 2. pag. 18.)

Habit. in campis, apricis, sterilibus, lapidosis, ad pratorum margines. *Gall.* in Dep. de l'Herault, et de l'Isere. —

3. *Milium effusum.* Millet épars. Flattern-des Hirsegras. *

Milium effusum floribus paniculatis dispersis multiculis. Linn. ed. Reich. I. 168. ed.

Gil. 3. 374. s. v. ed. Pers. 112.

glumis diphylloides. Hort. cliff. 27.

paniculis rarioribus, petiolis longissimis. Hall. helv. 1525.

Miliarium effusum. Moench. M. 204.

Gramen sylvaticum panicula miliacea sparsa. Tourn. 523. C. Bauh. p. p. 8. theatr. 141.

Scheuchz agrost. p. 133. t. 3. f. 6.

Buxb. hal. p. 145. Rupp. jen. p.

313. Volck. nor. p. 198. Hall. goett. p. 46.

miliaceum vulgare. Dill. giess. p. 65. Mor. hist. 3. p. 187. s. 8. t. 5. f. 10.

Lobelii. J. Bauh. hist. 2. p. 462.

Gmelin. tub. 17. Lamarck. 1170. I. Dalib. p. 23.

Leyss. hall. p. 63. Poll. 1. 64. Mill. dict. 3. Hoffm. 33. Moench. hass. n. 54. Weig. pom. n. 45. Murr. prodr. p. 41. Wilke. gryph. n. 37. Lestib. 215. Roth. I. 30 2. p. 79. Zinn. goett. p. 62. Scholl. barb. suppl.

n. 1020. Nekker. gallob. p. 37. Wigg. prim. p. 6. Fl. d. W. I. 86. Dietr. I. 91. Willden. prodr. p. 137.

Panz. 12. 277. Berg. frc. 319. Matuschk. 1. 45. Fl. dan. t. 1143. Boehm. lips. n. 609. Leers. 18. t. 8. f. 7. Doerr. nass. n. 24. Krocker. sil. 1. 104. Grimm. is p. 261. Reich. frc. 13. Jacq. vind. p. 12. Schrank. 1. 322. Nonne erf. p. 276. Plan. erf. p. 53. Curt. lond 4. n. 43. Delarb. 134.

Radix perennis, fibrosa. *Culmus* 2-6 pedalis, erectus, raro geniculatus, gracilis, nodis 2, raro 3, laevis, glaber et teres. *Folia* pauca, plana, utrinque scabriuscula, 2-7 lineas lata, 5 pollices-sesquipedem longa, laete aut ex flavicanti-viridia, glabra, nervo albido dorsali praedita. *Vaginae* glabrae, striatae. *Ligula* oblonga, truncata, alba aut rubella, fissa. *Panicula* semipedalis — pedalis, laxa, ampla, superne nutans. *Pedunculi* capillares, flexuosi, 6-8 ex eodem loco provenientes, subramosi, ad basin nodosi, exiguis squamulis bracteati, patentissimi, horizontales, maturi reflexi. *Spiculae* ovatae, ventricosae, acuminatae, laete aut ex flavicanti-virides. *Glouma calycina valvulis* laxis, exteriore ventricosiore, latiore, utraque trinervia, glabra. *Stigmata* candida.

Var. *Milium confertum*, floribus paniculatis confertis. Linn. ed. Reich. 1. 168. ed. Gil. 3. 74. s. veg. ed. Pers. 112. Delarb. 134. Krocker. sil. 1. 105.

Gramen paniculatum alpinum latifolium, panicula miliacea sparsa. Scheuchz. agr. 134.

Differt ab antec. foliis mollioribus, panicula densiore.

Odor foliorum, Meliloti.

Flor. Flor. — *Mess.* Matur. *Mess.* — *Fruct.*

β April — β Jul. β Jun. — β Sept.

Habit. in umbrosis, nemorosis, sylvis, tot fere

Gall. (in nostro Depart. in sylvis prope Lautern, Kirchheim etc.) et *Germ.*

AD TAB. XI.

X. Anthoxanthum. Flouve. Ruchgras. (Gramen Tourn.).

Venten. 2. p. 96. Linn. ed. Gil. 2. p. 12. Lam. t. 23. Moench. method. 176. Miller. illust. p. 235. t. 4.

Gluma calycina uniflora, acuta, bivalvis, *valvulis* inaequalibus, ovatis, concavis, acuminatis, *exteriore* minima, *interiore* multo majore, *glumam* corollaceam tegente. *Gluma corollacea* bivalvis, oblonga, acuminata, longitudine *valvulae calycinae* exterioris minoris (minime majoris); *valvulis* aristatis, exteriore e dorso, versus apicem, *arista* brevi recta praedita; *interiore* versus basin, *arista* longa geniculata armata. *Squamulae* 2, breves, tenerimae, obtusae, concavae, ovarium et basin filamentorum incurrentes, indeque tubulum teretem referentes. *Filamenta* 2 capillaria, longissima. *Antherae* oblongae utrinque bifurcatae, segmentis divaricatis. *Ovarium* oblongum. *Styli* 2, filiformes, longi, acuti, prius quam stamina erumpentes. *Stigmata* simplicia. *Semen* unicum, *gluma corollacea* adnata tectum, utrinque attenuatum, teretusculum.

Panicula spiciformis.

1. Anthoxanthum odoratum. Flouve odorante. Wohlriechendes Ruchgras. *

Anthoxanthum odoratum, spica oblonga, ovata, flosculis subpedunculatis, arista longioribus. Linn. ed. Gil. 3. 32. ed. Reich. 1. 74. s. v. ed. Pers. 74.

flosculis diandris. Roy. lugdb. 58.

Anthoxanthum. Stilling fl. misc. t. I. Dalib. par. 10. Gisecke ic. fasc. I. f. 2. Flor. suec. 29. 33.

- Gramen anthoxanthum.** J. Bauh. hist. 2. p. 466. Rupp.
jen. p. 307.
majus. Dill. giess. p. 79. app.
p. 44.
spicatum. Tourn. 518.
erectum melilotum redolens, panicula com-
pressina. Bocc. mus. p. 67.
t. 57. Raj. suppl. p. 604.
pratense spica flavescente. C. Bauh. pin. p. 3.
Scheuchz. agr. p. 88.
vernus spica laxa. Dill. giess. p. 48. Raj.
hist. p. 1268. Syn. 3. p.
398. 4. p. 22.
montanum odoratum spicatum. Loes. prus.
p. 110. t. 22. Scheuchz.
agr. p. 89.
**alopecurum vernum pratense spica flaves-
cente.** Moris. hist. 3. p.
193. t. 7. f. 25.
avenaceum odoratum, spica flavescente.
Monti. prodr. p. 57. ic. 84.
**alopecurum spica glumosa lutea villis cris-
pis.** Barr. rar. 1181. t.
124. f. 1.
Avena diantha, folliculo villoso, calycibus glumis
inaequalibus, altera de imo dorso,
altera de summo aristata. Hall.
helv. p. 1491.
Curt. Lond. 1. n. 9. Dietr. 1. p. 49. Schrank. 1.
253. Leers. 6. t. 2. f. 1. Reich. fr. 7. Lestib. 210.
Mill. illustr. 110. t. 4. Hoffm. 14. et ic. Gmel. tub.
p. 9. Moench. hass. n. 23. Scholl. barb. n. 28. Will-
den. pr. n. 63. Berg. fr. 313. Doerr. nass. n. 4.
Nanne erf. 272. Plan. erf. 44. Wilke gryph. n. 19.
Gmelin. sib. 1. p. 127. n. 64. Reyg. gedan. 2. 31.
Gunn. norw. n. 5. Lüder Lustg. 1. 62. Panzer Linn.

Pflz. 5. 12. 51. Kröcker. sil. I. 43. Roth. I. p. 13. 2.
 p. 351. Leyss. hall. n. 30. Murr. pr. 40. Wigg. prim.
 p. 4. Fl. dan. t. 666. Boehm. lips. n. 597. Hall. goett.
 p. 50. Weig. pom. n. 25. Zinn. goett. 59. Lamarck.
 f. f. 2. 1158. Jacq. vind. p. 5. Pollich. I. p. 26. Nek-
 ker. gallob. 16. Matuschk. sil. I. n. 26. Flora der
 Wetter. I. 36. Moench. m. 176. Scopoli. I. p. 31.
 Schreber Graes. p. 49. t. 5. Delarb're. 20.

*Radix perennis, fibrosa. Culmus erectus, pal-
 lide viridis, plerumque longitudine pollicum 8 - 10,
 simplex, articulatus, internodio superiore longissi-
 mo, nodis 2 - 3 fuscis, gracilis, foliatus, teres,
 glaber, laevis. Folia mucronata, infra glabra, su-
 pra pubescens, pollicem — digitum longa, nervo
 albido dorsali donata, pallide viridia, utrinque sca-
 berrima, radicalia subangusta, culmea lanceolata.
*Ligula obtusa, integra, aut crenulata, membrana-
 cea, diaphana. Vaginae striatae, laeves, apice vil-
 lis longis, albidis circumdatae, superiores glabrae,
 aut pubescentes, inferiores subpilosae. Panicula
 flavescentis spiciformis, basi et apice paululum atte-
 nuata, plurimum pollicem aut paulo magis longa,
 ante et post anthesin coarctata. Pedicelli breves, in-
 aequales, solitarii aut fasciculati, interdum subra-
 mosi, erecti. Spiculae inferiores remotiores, su-
 periores densiores et prius florentes, lanceolatae, acu-
 tæ, paululum compressae. Gluma calycina stri-
 ata, glabra, dorso viridi, fere carinato, margine et
 lateribus membranaceis, flavescentibus, pellucidis,
 valvula minore dimidio altera breviore, acuta; ma-
 jore acuminata, ^{aut} trinervia. Gluma corollacea val-
 vulis aequalibus subaequalibus, obtusiusculis, ser-
 rulatis, paululum fisis, basi coalitis. Valvulae ex-
 terioris basi pubescentis arista in medio dorsi, saepe
 autem magis apicem versus inserta, valvula paulo
 brevior, aut aequali longitudine. Arista vero val-**

vulae interioris multo longior, in medio geniculata, parte superiore tortilis, et recurva est. *Squamulae* inaequales, subcrenatae, *interna* minor uninervia, acuta, *externa* trinervia obtusa. *Ovarium* oblongo-ovatum. *Styli* glama longiores, versus apicem plumulosi. *Filamenta* praelonga. *Antherae* purpureae. *Semen* ovale, glabrum, fuscum.

Var. 1. Panicula duplex aut ramosa (an Anth. pan. Gmel.?) Delarb're. l. c.

2. — 3 - 4 pollices longa.
3. Spiculis purpurascens.
4. Glumis calycinis pubescentibus.
5. Culmo inferne decumbente, valde geniculato, foliis et vaginis villosis (im Gonzenheimer Vald).
6. Culmo erecto, foliis et vaginis villosis (eodem loco).
7. Culmo pedali- et bipedali.

Flor. interdum bis in anno, verno nempe et autumnalitempore, plerumque vero Germ. — Therm. β. Jul. — β. Aug. Matur. Mess. — Vend. β. Jun. — β. Oct.

Habit. in arenosis, luteosis, aridis, et humidis aggeribus, sylvis, pratis, pascuis totius fere *Germ.* et *Gall.* — Prope Moguntiam im Gonzenheimer Wald, in sic dicto dem Sand, pratis circa dem Bruch.

Odor radicis Valerianæ officinalis; *caulis*, *foliorum*, et *paniculae*, Trifolii Meliloti offic. praecipue post exsiccationem.

AD TAB. XII.

XI. *Stipa. Stipe. Stielgras* (Gramen Tourn.).

Linn. ed. Gil. 2. p. 25. Venten. 2. 99. Lam. t. 41. Moench. m. 181.

Gluma calycina uniflora, bivalvis, laxa, acuminate; persistens, *valvulis* inaequalibus, aristatis. *Gluma corollacea* bivalvis; *valvula exteriore* apice aristata, *arista longissima*, tortili, basi articulata, recta, terminata: *valvula interiore* longitudine exterioris, mutica et linearis. *Squamulae* 2, lanceolatae, ovario longiores. *Filamenta* tria capillaria. *Antherae* lineares. *Ovarium* oblongum. *Styli* duo hirsuti, basi connati. *Stigmata* pubescentia. *Gluma corollacea* semen arcte includens. *Semen* unicum, oblongum, tectum.

Folia plus minusve capillaria. *Flores* paniculati.

1. *Stipa pennata*. Stipe empennée. Gefiederetes Stielgras ***.

Stipa pennata, aristis lanatis. Linn. ed. Reich. I. 218. ed. Gil. 3. p. 107. s. veg. ed. Pers. 125.

aristis plumosis. Haller helv. n. 1514.

Festuca aristis, paniculae circiter longitudine, plumosis. Roy. lugdb. 68. Sauvag. 28. glumis unifloris, aristis longissimis pennatis. Gimel. Sib. I. p. 114. n. 50.

Spartum austriacum. Clus. hist. 2. p. 221.

Avena capillacea austriaca, aristis longissimis pennatis. Mor. hist. 3. p. 110. f. 8. t. 7. f. 9.

Gramen sparteum pennatum. C. Bauh. pin. p. 5. théatr. 70. Borell. n. 46. Magn. h. 92. bot. 119. Buxb. hal. p. 145. Hall. goett. p. 49.

spicatum aristis pennatis. Tourn. 518. Magn. bot. 119. Scheuchz. agr. p. 153. Rupp. jen. p. 306.

pennatum; aliis sparteum. J. Bauh. hist. 2. p. 512.

Lamarck. 1172. 1. Poll. I. 120. Goian. hort. 51.

fl. 119. Fl. d. Wetter. I. 146. Dietr. I. 114. Lestib. 217.
 Schkuhr. bot. H. t. 16. Roth. I. 114. 2. 94. Weber.
 spicil. p. 5. Moench. meth. 181. Scholl. barb. n. 60.
 Scop. I. p. 85. Leyss. hal. n. 72. Schranck. I. 373.
 Hoffm. 57. Willden. pr. 138. Panz. Lin. 12. 448.
 Jacq. vind. p. 15. Kram. aust. p. 23. Delarb're. 193.
 Krock'r. sil. I. 181. Oestreich's Flora. I. 55.

Radix perennis, fusca, fibrosa. *Culmi* plures
inferne fasciculati, 1 - 3 pedales et altiores, erecti,
tenues foliati, teretes, glabri, nodis 3 purpureis.
Folia convoluta, junciformia, et fere setacea, ex-
 planata, vix lineam lata, *radicalia fasciculata*, *caulina*
pauca, superne laevia, inferne et in margine scabra,
pagina interna (superiore) glabra, 6 pollices - 2 pe-
 des longa, mucronata, rigidiuscula, dura, glauco-
 viridia. *Vaginae striatae*, glabrae, coloris folio-
 rum, *pagina interiori* laeves. *Ligula obtusiuscula*.
Panicula junior primo aristis ex folii supremā *vagi-*
na prominens, pauciflora, in anthesi $1\frac{1}{2}$ - 2 pedes
longa, angusto-lanceolata, inferne contracta; su-
perne patentior. *Rhachis* sulcata. *Pedunculi* semi-
 verticaliter erecti, gemini, raro solitarii, scabrius-
 culi, simplices, non saepe ramosi. *Spiculae lanceo-*
latae, utrinque attenuatae, glabrae, ex viridi flavi-
 cantes. *Glumae calycinae valvulae lanceolatae*, li-
 neares, patentes, 5 - 8 lineas longae, glabrae, mar-
 gine albo membranaceo; *interior latior*, et paululum
longior, *utraque* in aristam albam per lentem pla-
 nam, tenuissimam, quasi membranaceam, 10 - 14
lineas longam, prolongata. *Gluma corollacea val-*
vulis inaequalibus, *exteriore lanceolata*, tereti, du-
 ra, arctissime clausa et convoluta, inferne striatim
villosa, 7 - 9 lineas longa, apice *arista capillacea*
pedali et *longiore*, plumulis albis in duobus lateri-
 bus oppositis pulcherrime ornata, inferne longitu-
 dine 2 - 3 pollicum nulla et *spiculiter torta* et *flavi-*
canti, primo recta, aetate vero curvata, aucta.

Flor. Flor. — Messid. Matur. Praer. — Fruct.
β. April. — β. Jul. — β. Maj. — β. Sept,
Habit. in montosis, collibus, apricis, arenosis,
siccis, Gall. — in Depart. de la Loire; du Rhône;
de l'Aube; Haute-Saone; de l'Herault; du Mont-
tonnerre etc. — prope Moguntiam in collibus sic-
dictis Geiersgipfel; prope Dürckheim; Bingen;
Calstadt; Umstein; Herxheim; Nierstein. — Germ.
in Saxon. Siles. Brandenb. Thuring. Hercyn. Han-
never, Goett. Bavar. Barb. Austria, Wetterau. —
Suecia.

2. Stipa juncea. Stipe jonciere. Binsen-Stiel-
gras *.**

Stipa juncea aristis nudis, rectis, calycibus semine
longioribus, foliis intus laevibus. Linn.
ed. Reich. I. p. 218. ed. Gil. 3. 105. s.
v. ed. Pers. 125.

Gramen sive Festuca junceo folio. C. Bauh. pin. p. 9.
prodr. p. 19. theatr. 145. Magn. bot. 122.?
Scheuchz. agr. 151. t. 3. f. 13. Hall.
goett. p. 49. Rupp. jen. p. 318.

Festuca glumis unifloris, aristis longissimis nudis.
Boehm. Lips. n. 644. Gmel. sib. I. p.
145 p. 49. Rupp. jen. p. 318.
aristis circiter longitudine paniculae nudis.
Roth. I. p. 34. 2. p. 94. Fl. d. V. I. p. 149.

Hoffm. ed. II. p. 38. Leyss. hal. n. 73. Scop. I. 86.
Jacq. austr. p. 13. Hall. helv. n. 1513. (cum capill.
conj.) Delarbre. 194. Krock. Sil. I. 182. Oestr. fl.
I. 55.

Difffert ab antecedente.

Radicibus magnos caespites formantibus; Glu-
mis calycinis albidis, semine longioribus; aristis
corollaceis, rectis, nudis, basi semicylindricis, mi-

nus tortis, superne per lentem planis, minoribus; *Vaginis* latioribus, et interiore pagina splendentibus, laevissimis. *Pedunculis* quinis — senis. *Glumæ corollaceæ valvulis* basi interne quoque villosis, *Nodis culmi* 5 — 6. *Ligula* lanceolata, longa, acuminata.

Flor. Praer. — *Fruct.* Matur. Fruct. — Vend. β . Maj. — β . Sept. — β . Aug. — β . Oct.

Habit. sicuti anteced. *Gall.* — in Dep. i Rho-
ne. ? de l'Herault; du Cantal etc. — *Germ.* n Wetterav. Austr. Carn. Sil. Saxon. ? —

3. Stipa capillata. Stipa capillaire. Haarför- miges Stielgras. **.

Stipa capillata, aristis nudis curvatis, calycibus se-
mine longioribus, foliis intus pu-
bescens. Linn. ed. Reich. 1.
p. 219. Gil. 3. 105. s. v. ed. Pers. 125.
juncea. Lamarck. 1172. 2. Goian. hort. 52.
fl. 119.

aristis nudis flexuosis, calyce semine longiore.
Hall. helv. n. 1513.

Aegilops. IV. A. Tabern. Ktb. 545.

Festuca longissimis aristis, glumis vacuis, spadicei
coloris. C. Bauh. p. p. 10. theatr. 152. 153.
Buxb. hal. 143.

Pollich. 1. 121. Pallas. it. 1. p. 267. Plan. erf. p.
59. Moench. m. 181. Roth. 1. p. 34. 2. p. 95. Hoffm.
57. Jacq. vind. p. 13. Fl. d. Wetter. 1. 149. Leyss.
hal. n. 74. Scholl. barb. suppl. 313. n. 61. Ehrh. Phyt.
91. Delarbre. 194. Krock. sil. 1. 183. Wibel. flor.
werth. p. 122. Oestr. flor. 1. 55.

Difffert ab juncea, cui valde similis.

Foliis rigidioribus, minus scabris, pagina in-
terna sive superiore, pubescente aut villosula, (mi-
nime autem planis, certe prope Moguntiam); *Ari-*

stis brevioribus, 4-6 pollices longis, adultioribus; spiraliter flexis et curvatis; Glumis calycinis in dorso viridibus (marginibus albis).

Var. panicula minore, glumis calycinis rubellis.

Floret, maturat et habitat uti antecedens, Gall. — in Depart. de l'Herault; du Rhone, du Monttonnerre, — prope Moguntiacum, auf dem Judenkirchhofe, et sic dictis Geiersgipfeln; prope Oppenheim, Nierstein, Worms, Dürckheim; Frankenthal, Klein-Nidesheim. — Germ. in Saxon. Barb. Siles. Austr. Hannov. Thuring. Franconia.

AD TAB. XIII.

XII. Agrostis. Agrostis. Strausgras.

Linn. ed. Gil. 2. p. 22. Venten. 2. 99. Lam. t. 41. Flor. dan. t. 853. Moench. m. 178. Hoff. fl. ic. 6.

Gluma calycina bivalvis, uniflora, lanceolata, acuminata, saepe mucronata, raro aristata, valvulis aut valvulam majorem corollaceam aequantibus, aut eas superantibus, aut iis minoribus, saepe inaequalibus. Gluma corollacea acuminata, bivalvis, valvulis inaequalibus, exteriore majore, modo mutica, modo aristata. Arista ex apice, dorso, aut basi proveniens, nec quindupla spicula longior. Squamulae exiguae, lanceolatae, interdum triangulares. Filamenta tria, capillaria, gluma corollacea longiora. Antherae furcatae. Ovarium subrotundum. Styli duo, reflexi, villosi. Stigmata plumosa. Gluma corollacea semini adnata, nec dehiscens. Semen unicum, plerumque subrotundum, utrinque attenuatum, glabrum, raro villosum.

Panicula plus minusve laxa et ramosa, raro spiciformis.

1. Agrostis stipata. Agrostis stipeforme. Stielgrasartiges Strausgras. ***

Stipa aristella, aristis nudis rectis, calyce vix duplo longioribus, germinibus lanatis. Linn. ed. Reich. I. 219. Gil. 3. 107. s. veg. ed. Pers. 125. Goüan illustr. 4.

Habitus stipae. Radix perennis. Culmi bipedales. Folia angusta. Panicula subspicata, Pedunculi bi- s. triflori. Gluma calycina, longitudine seminis. Semen teres, raris villis pubescens. Arista calycis longitudine.

Habit. Gall. in Dep. del' Herault.

2. Agrostis bromoides. Agrostis bromoïde. Trespenartiges Strausgras. ***

Agrostis bromoides panicula simplici, angustata, corolla pubescente, arista recta calycē longiore. Linn. ed. Reich. I. 170. ed. Gil. 3. 77. s. veg. ed. Pers. 112.

panicula linearis simplicissima, flosculis binatis, ternatisque, altero sessili, arista recta, flosculis triplo longiore. Goüan. obs. 8. t. I. f. 3.

Lamarck fl. fr. 1171. 25

Radix perennis, fibrosa. Culmi erecti, laeves, rigidi, 1-2 pedales. Folia laevia, angustissima, aut canaliculata, aut marginibus convolutis, indeque saepe cylindrico-subfiliformia. Panicula erecta, simplex, oblonga, angusta, ad singulos Rhacheos dentes aut pedunculis 2 bifloris, spicula altera sessili, aut spiculis 2, altera pedicellata, altera sessili, praedita. Gluma calycina, oblonga, acuta, striata, laevis, ex flavicanti-rubella, valvulis subaequalibus. Gluma corollacea subpubescens, valvula exteriore aristata, arista recta, scabra, calyce duplo aut triplo longiore.

Habit. in Gall. in Dep. del' Herault.

3. Agrostis rubra. Agrostis rouge. Röthes Strausgras. ***

Agrostis rubra, panicula parte (inferiore prius. — Roth. I. p. 31. 2. p. 81.) florente patentissima, petalo exteriore glabro, arista terminali, tortili, recurva. Linn. ed. Reichl. I. 172. ed. Gil. 3. 77. s. v. Pers. 113. fl. suec. 60. 62. panicula lanceolata, spiciformi, calyce flosculo triplo longiore petalorum arista dorsali recurva. Huds. angl. 26? inferiore verticillatim laxa, superiore contracta. Zinn. goett. p. 62. flor. lapp. 46.

Gramen serotinum arvense, panicula contracta pyramidali. Scheuchz. agr. p. 148. t. 3. s. II. c. Hall. goett. p. 46. arvense, spica pyramidali. Raj. angl. 394. hist. 1288.

Dalib. par. 24. (n. synon.) Goiani h. 40. fl. 118. Murr. prodr. p. 41. Fl. d. VV. I. 88. Berg. frc. p. 320. Wigg. prim. p. 7. Weig. pom. n. 48. Hoffm. ed. I. p. 24. Willden. pr. n. 133. Wilke gryph. n. 39. Delarbre. 8. Krocker. sil. I. III.

Radix annua, fibrosa, alba. Culmi plures, erecti, nodosi, foliati, glabri, laeves, 1-2 pedales. Folia subtus et in margine scabra, sicca convoluta. Vaginae striatae. Ligula incisa. Panicula pedunculis semiverticellato-alternis, pluribus ex uno articulo, parte inferiore, prius florente, horizontali, patente, superiore serius florente contracta, fructifera tota contracta, rubra. Gluma calycina mucronata, valvulis inaequalibus. Gluma corollacea valvula exteriore glabra, arista spicula plerumque longiore, tortili, recurva, praedita.

Flor. Praer. — *Fruct.* *Matur.* Mess. — *Vend.*
β. Mai. — *β. Sept.* *β. Jun.* — *β. Oct.*

Habit. ad vias, in pratis sterilioribus, humi-disque. *Gall.* — circa Lutet. paris. et in Dep. de l'Herault etc. — *Germ.* in Herc. Hols. Brem. Siles. Pom. Darmstadt. Wetterav. Goett. —

4. *Agrostis miliacea*. Agrostis miliacé. Hir-senartiges Strausgras. ***

Agrostis miliacea, petalo exteriori arista terminali recta stricta, mediocri. Linn. ed. Reich. I. p. 170. ed. Gil. 3. 76. s.v. ed. Pers. 112.

miliacea. Roy. Lugdb. 59.

montis aurei. Delarb. 8.

An gramen a gramine pratensi, spica fere arundinacea, glumis parum aristatis, differens? Scheuchz. agr. 142.

Lamarck 1171. II. Goian illustr. 3. Krock. I. 107.

(*Habitus quidem Agr. spicaeuentii, tamen, imo culta, diversa.*)

Radix annua, fibrosa, alba. Culmi toti fere erecti, nec geniculati, foliati, 1 - 2 pedes alti, glabri, striati. Folia angusta, lanceolata, plana. Panicula subdiffusa, paululum contracta, (minus ampla quam in spic. vent.), 3 - 6 pollices longa, pedunculis semiverticillatis, fere capillaribus, valde divisis. Spiculae parvae, numerosae, rimbellaee. Gluma callycina corollaceam aequans. Gluma corollacea valvula exteriore breviter aristata, arista longitudine spiculae, aut vix duplo longiore, recta.

Flor. Praer. — *Therm.* *Matur.* Mess. — *Vend.*

β. Mai. — *β. Aug.* *β. Jun.* — *β. Oct.*

Habit. in arenosis, gramineis. *Gall.* in Dep. de l'Herault; de l'Aude; du Gard; Haut-Garonne; du Tarn.

*5. Agrostis spica venti. Agrostis eventé.
Akkerstrausgras *.*

*Agrostis spica venti, petalo exteriore arista recta,
stricta, longissima, panicula patula.
Linn. ed. Reich. 1. 169. ed. Gil. 3.
75. s. v. ed. Pers. 112.*

*petalo exteriore exserente aristam rectam
strictam longissimam. Roy. lugdb.
59. Fl. sv. 58. 62.*

*Avena monantha, panicula adscendente, multiflora,
calyce laevi, florali arista longissi-
ma. Hall. helv. n. 1480.*

Agrorum venti spica. Lob. ic. 3.

*Gramen harundinaceum arvense. Tabern. Krbch.
526. A. ?*

agrorum. J. Bauh. hist. 3. p. 461.

*miliaceum majus, glumis aristatis, spadi-
ceis. Monti. gram. t. 63.*

*segetum panicula arundinacea. Tourn. 524.
C. Bauh. p. p. 3.*

*capillatum paniculis viridantibus et ru-
bentibus. ibid. et Mapp. 130.*

*paniculis viridantibus. J. Bauh. hist. 2.
p. 462.*

*capillatum. Buxbaum. Hall. p. 144. Dill.
giess. p. 89. Rupp. jen. p. 315.*

*segetum altissimum, panicula sparsa. C.
Bauh. pin. p. 3. Scheuchz. agr. p. 144.
t. 3. f. 10. Volck. nor. p. 197. Hall.
goett. p. 49.*

segetale paniculatum. Tabern. Kr. 517.

*Lamarck. 1171.8. Goian. h. 39. fl. 118. Wigg. prim.
p. 6. Pollici. 1. 65. Sauv. 35. n. 44. Roth. 1. p. 30. 2.
p. 80. Nekker. n. 39. Gmel. tub. p. 18. Kramer austr. p.
18. Leyss. hall. n. 64. Doerr. nass. p. 1. Moench. hass.
n. 55.*

n. 55. meth. 178. Gmelin sib. I. p. 92. n. 22. Murr. prodr. p. 41. Fl. d. VVett. I. 87. Scholl. barb. n. 56. Matuschk. sib. 146. Berg. frc. 320. Flor. dan. t. 853. Willden. pr. n. 131. Scop. I. p. 59. Weig. pom n. 47. Jacq. vind. p. 12. Schrank. t. 322. Grimm. isen. p. 61. Leers. 17. t. 4. f. I. Boehm. lips. n. 610. Reich. frc. 14. Nonne erf. p. 276. Plan. erf. p. 53. Dietr. 2. 92. Wilke. gryph. n. 38. Lestib. 216. Zinn. goett. p. 62. Panz. 12. 281. Hoffm. 33. Delarbre. 8. Krock. sil. p. 106. Wibel. werth. p. 123. Oestr. Flor. I. 55.

Radix annua, fibrosa, alba. Culmhus fere erectus, 1 - 3 pedalis; teres, glaber, foliatus, nodis 4 - 5 purpureis. Folia pagina superiore pubescens, inferiore et margine scabra, nervis albicantibus, 2 - 3 lineas lata, 6 - 7 pollices longa. Vaginae striatae, glabrae aut pubescentes. Ligula longa, fissa. Panicula subnutans, pollicem dimidiam - I lata, palmam — pedem longa, ampla, ramis ultra pollicem longis, erecto - patentibus, ante anthesin contractior, fructifera patentior. Pedunculi saepe 15. in semiverticillis alternis remotis, per lentem compressi et scabri, capillares, ramosissimi. Spiculae numerosae, parvae, inaequaliter pedicellatae. Gluma calycina glabra, valvula interiore longitudo glumae corollecae. Gluma corollacea valvulis calycinis parum saepe longioribus, per lentem bifidis; exteriore infra apicem aristam rectam aut paullum incurvam, non raro 4 - 6 lineas longam, capillarem, armato oculo scabram, producente. Squamulae ovatae. acutae. Antherae pallide flavae.

Var. 1. Spiculis purpurascensibus (Moguntia Lautern.)

2. — — glaucis.

3. — — albis.

4. glumae calycinae valvulis in dorso scabris.

F

5. glumis calycinis plurimis, bifloris,
flosculo altero muticiori.

Flor. Praer. — *Fruct.* Matur. Therm. — Vend.
8. Maj. — 8. Sept. 8. Jul. — 8. Oct.

Habit. ad margines agrorum et viarum, inter
segetes, in arenosis sterilibus. tot. fere *Gall.* et
Germ. — in nostro Dep. abunde e. g. prope Mogunt.
in sic d. Sande, prope Lautern, Nierstein, Bin-
gen etc. —

6. *Agrostis interrupta.* *Agrostis interrompu-*
Unterbrochenes Strausgras. ***.

Agrostis interrupta petalo exteriore aristata, pani-
cula attenuata, coarctata, in-
terrupta. Linn. ed. Reich. t.
170. ed. Gil. 3. 75. s. v. ed.
Pers. 112.

Gramen arvense paniculatum, spica interrupta.
Schœuchz. agr. p. 146.

capillatum minus. Dill. giess. p. 90. ?
paniculis interruptis angustiori-
bus. Vaill. pár. 88. t. 17. f. 4.

Lamarck. 1171. 7. Goian. fl. 117. Wigg. prim.
p. 6. Schrank. I. 323. Roth. I. p. 31. 2. p. 81. Lestib.
216. Hoffm. ed. I. p. 24. Moench. hass. n. 56. Scop. I.
p. 60. Fl. d. Wett. I. 88. Panz. 12. 282. Oestr. fl. I. 55.
Delarb. 8.

Differt ab Agrost. spica venti:

Culmo fere filiformi, 6 pollices — 3 pedes alto;
Foliis vix lineam latis; *Panicula* minore, contra-
etiore; *semiverticillis* remotioribus, *pedunculisque*
minoribus vix pollicem longis, patentioribus, (inde-
que rhachis non ubique tecta est, sed internodia
superne visibilia sunt). *Panicula*, imo fructifera,
contracta; *spiculis* paucioribus; *Glumis* corollaceis
apicibus integris; *arista* apici vicinore, inarmato

oculo, fere terminali — minime autem (certe plerumque) arista spicae venti breviore.

Flor. et naturat uti spica venti.

Habit. in ilicetis, ericetis, arenosis, agris,
Gall. — prope Lutet. Paris. et in Dep. de l'Hérault etc.
 — *Germ* in Holsat. Giess. Hass. Bavar. Wetterau.
 Carniol. Darmstadt. — (prope Dietenbergen in ter-
 ritor. darmstadt. inveni). —

7. *Agrostis compressa.* *Agrostis comprimé.*
*Zusammengedrucktes Strausgras ***.*

Agrostis compressa, panicula contracta, calycibus
 inaequalibus, corollis infra
 apicem mucronatis. Willden.
 obs. bot. in Bot. mag. T. 4.
 St. II. p. 39. Fl. d. Wetter. I. p.
 90. Roth. 3. p. 565. Hoffm. 35.
dubia, calycibus aequalibus laevibus, co-
 rollis infra apicem mucrona-
 tis, foliis setaceis. Leers,
 herb. p. 21. t. 4. f. 4. Roth. I.
 p. 32. 2. p. 84.

Radix perennis, repens. *Culmi* plures pedales,
 curvato-adscendentes, superne erecti, subfoliati,
 binodes. *Folia* convoluta, indeque setacea, angu-
 stissima, *radicalia* apice scabra, *culmea* brevia, sca-
 bra. *Vaginae* laeves. *Ligula* obtusa. *Panicula* 2-3
 pollices longa, angusta, valde contracta, fere sub-
 spicata. *Pedunculi* breves, solitarii, *inferiores* terni.
Gluma calycina spadiceo-virens, laevis, *valvula*
exteriore majore, in dorso hispida, *utraque* gluma
corollacea longiore. *Gluma corollacea* dorso scabra,
valvula exteriore acuta, infra apicem bifidum mu-
 crone brevi, exstante, praedita; *interiore* duplo
 breviore, retusa.

Flor. Praer. — *Therm.* *Matur.* *Mess.* — *Fruct.*
β. Maj. — *β. Aug.* *β. Jun.* — *β. Sept.*

Habit. in pratis humidis, ad vias, in montosis
apricis. *Germ.* prope Herborn. Berol. Darmstadt.

8. Agrostis canina. *Agrostis genouillé.* *Hunds-*
Strausgras *

Agrostis canina calycibus elongatis, petalorum arista
dorsali recurva, culmis prostratis,
subramosis. Linn. ed. Reich. 1.
p. 173. ed. Gil. 3. 78. s. veg. ed.
Pers. 113. Fl. suec. 1138. b. 8.

geniculata. Lamarck. 1171. 10.

Avena monantha, panicula diffusa, multiflora, ad-
scendente, gluma calycina, exasper-
rata. Hall. helv. n. 1479.

Graminis primi Dioscoridis species minima. Thal.
Harcyn. 50.

Gramen rubrum monspeliense. Magnol. bot. 122.
caninum supinum, paniculatum, folio va-
rians. C. Bauh. pīn. p. 1. theatr. 12.
paniculatum supinum, ad infima culmorum
genicula foliorum capillarium fasci-
culis donatum. Scheuchz. agr. p.
141. t. 3. f. 9. c.

Goian. hort. 40. flor. 118. Weig. pom. n. 49.
Poll. 1. p. 66. Hoffm. 34. et ic. 7. Roth. 1. 31. 2. 81.
Gmelin sib. 1. p. 92. n. 21. Leyss. hal. n. 66. Fl. d.
Wetter. 1. 89. Lestib. 216. Moench. hass. n. 58.
Nekker gallob. p. 38. Moench. meth. 178 Schreb.
spic. p. 47. Oeder. t. 161. Dietr. 1. 93. Wigg. prim.
p. 7. Reyg. gedan. 2. p. 36. Willden pr. n. 132. Leers.
19. t. 4. f. 2. Wilke gryph. n. 40. Wibel. werth. p.
123. Delarbre. 8. Krock 1. 109.

Radix perennis, subrepens, fibrosa. *Culmi*
supra radicem saepe radicantes, geniculato - procum-

bentes et ramosi, ramis floriferis, dein erecti, tenues, pedales — 3 pedales, foliati, 4 — quinquenodes. *Folia brevia*, 3 pollices vix longa, angustissima, nervo-dorsali basi albido; *radicalia fasciculata*, vix lineam lata, *culmea paululum latiora*, omnia deorsum scabriuscula, mucronata, *sicca convoluta*. *Vaginae laeves*, glabrae, striatae, *suprema scabra*, longissima. *Ligula oblonga*, obtusa, fissa, prominens. *Panicula coarctata*, angusta, 2 — 3 pollices longa, *florens divaricata*, violaceo-purpurea et splendens, *fructifera divaricata pallescens*. *Pedunculi* in semiverticilos alternos collecti, *inferiores* seni aut plures, capillares, spadicei, semi-verticaliter erecti. *Spiculae exiguae*. *Gluma calycina valvulis subaequalibus*, *exteriore superne hispidula*. *Gluma corollacea calycina minor*, *valvula exteriore*, apice trifido, dorso hispidulo, e medio *aristam* albam, tortilem, hispidam, geniculato-recurvam, geniculo fusco donatam, *spicula duplo longiorem producente*; *interiore minima*, retusa, vel nulla, vel tantum ejus rudimentum. *Squamulae 2 basi gibba*, triangularia. *Antherae purpureae*. *Stigmata alba*.

Var. 1. Spiculis duplo majoribus.

2. foliis glabris, laevibus.

Flor. Praer. — Therm. *Matur.* Therm. — *Vend.*

β. Maj. — β. Aug. β. Jul. — β. Oct.

Habit. in pascuis udis, humidis, pomariis, tot. fere *Gall.* et *Germ.* (in nostro Depart. prope Lautern: am Altrhein etc.)

9. *Agrostis vinealis*. Agrostis des vignes.
Weinbergs-Strausgras ***.

Agrostis vinealis, calycibus coloratis, petalorum arista dorsali longitudine fere

calycis, culmis adscendentibus.

Schreber. spic. p. 47.

montana. Krock. sil. I. 110.

Gramen caninum vineale. Scheuchz. agr. p. 143.

Roth. I. p. 31. 2. p. 82. Hoffm. 35.

Radix perennis, fibrosa. Culmi adscendentibus, pedales — sesquipedales, nodis copiosis, praecipue inferne donati, geniculati, tenues, non raro ramosi, 6 — 12 pollices longi. Folia 1½ — 2 pollices longa, angusta, fere setacea, acuminata, striata, glabra. Ligula perbrevis, obtusa, integra. Panicula 2 — 3 pollices longa, pedunculis in semiverticillo alternos dispositis, semiverticaliter erectis. Spiculae fere lineam longae. Gluma calycina valvulis aquilibus, mucronatis, e viridi-purpurascenscentibus corollaceis duplo fere longioribus. Gluma corollacea valvula exteriore e medio dorsi aristam emittente, spiculae plerumque longitudinis, tenuissimam, in anthesi vero valvulae suae ita adpressam, ut armatis tantum oculis visibilis sit.

Var. 1. Aristis lineae longitudine supra spiculas exsertis.

2. spiculis plerisque non aristatis.

3. foliis latioribus.

Flor. Praer. — Therm.

β. Maj. — β. Aug.

Habit. in siccioribus subalpinis; Germ. prope Lips. et ad Theras Carol. in Bohem. Siles.

10. Agrostis gigantea. Agrostis gigantesque. Riesen-Strausgras *.**

Agrostis gigantea, panicula parte superiore prius florente, patentiissima, calycibus hispidis, petalo exteriore glabro, dorso superne subari-

stato, culmo erecto. Roth. I.

31. 2. 83. Hoffm. 35.

flava, panicula patente, calycibus subulatis, aequalibus, hispidulis, non coloratis, flosculis muticis.

Flor. dan. t. 751. 2.

Radix perennis, repens, stolonifera, crassitie fere pennae corvinae. *Culmus* solitarius erectus, tri-quinquepedalis, glaber, nodis 5-6 purpureis. *Folia* scaberrima, plana, pulcherrime striata, in apicem tercetum sphacelatum duriusculum terminata, *infima* et *suprema* minora. *Vaginae* striatae, glaberrimae, margine nonnunquam villis longis, tortilibus donatae. *Ligula* obtusa lacera. *Panicula* palmaris - semipedalis et longior, ramosissima, ad quamvis ramificationem nodo purpureo circulari praedita, apice prius florens, et patens. *Pedunculi* 10-12 in semiverticilos alternos collecti, capillares, scaberrimi, ramosissimi; *floriferi* patentes; ante et post florescentiam contracti. *Pedicelli* sub spiculas in-
crassati. *Gluma calycina* bivalvis, lineae longitudinem vix superans, *valvulis* subaequalibus, carinatis, dorso spinulosis, in acutum *mucronem* pellucidum terminatis, e viridi-purpurascentibus. *Gluma corollacea* candida, calyce minor, pellucida, glaberrima, bivalvis, *valvula exteriore* acuminata, apice bifido, laciniis in maturitate conniventibus, et longioribus, dorso infra incisuram *arista* candida stricta, *valvula* sua raro longiore, tempore maturitatis plerumque breviore, praedita: *interiore* duplo minore, obtusa, emarginata. *Filamenta* gluma calycina duplo vel triplo longiora. *Ovarium* minimum ovale. *Stylus* longitudine valvulae minoris corollaceae. *Stigmata* villosa. *Semen* exiguum, flavum, acuminatum.

Var. 1. Aristis spiculis longioribus.

2. Panicula glauca.

Flor. Praer. — *Fruct.*

β. Mai. — *β. Sept.*

Habit. inter arundinem et salices ad ripas fluviiorum. *Germ.* in Brem. Megap. Jever. Hall. Saxon.

11. *Agrostis pallida.* Agrostis pâle. Blasses Strausgras. ***

Agrostis pallida, calycis valvulis subaequalibus, divaricatis, corollae valvula majore supra medium aristata, aristâ brevi. With. 2. t. 22? Hoffm. D. fl. 34.

Panicula pallide virescens, livida. *Arista perbrevis*, saepe vix ulla.

Flor. Flor. — *Mess.* β. April. — β. Jul.

Habit. in sylvaticis, ericetis. *Germ.* in Baruth.

12. *Agrostis alpina.* Agrostis des Alpes. Alpen-Strausgras. ***

Agrostis alpina, foliis setaceis, panicula coarctata, calycibus hispidiusculis, coloratis, petalo exteriore arista dorsali geniculata. Leyss. hall. n. 67. Abh. d. Hall. naturf. Gesellsch. T. I. p. 364. Oed. dan. t. 161. Oestr. fl. 1. 55.

rupestris, Blottner. (Hoffm.)

Avena monantha, paniculata, gluma calycina exasperata, arista florali aequali, Hall. helv. n. 1477.

Gramen parvum paniculatum alpinum, panicula spadicea, aristatum. Scheuchz. agr. 140. prodr. 22. t. 4. f. 1.

Radix fibrosa. *Culmus* inferne parum reclinatus, dein erectus, 3 - 8 pollices longus, rigidus, striatus, nodis 2 nigricantibus, altero ad radicem, altero infra medium. *Folia* vix lineam dimidiam

lata, linearia, fere setacea, striata, glabra; radicula caespitosa. Ligula brevissima, obtusa. Panicula ante anthesin contracta, pollicaris — sesquipollucaris, pedunculis 3-5 alternatim semiverticillatis, aut simplicibus unifloris, aut ramosis; florentibus patulis. Gluma corollacea valvulis inaequalibus, aut viridibus, aut ex viridi-spadiceis, aut violaceis, aetate patulis; exteriore dorso versus apicem hispida. Gluma calycina valvula exteriore calycinis minore, obtusiuscula (bifida Scop.) glabra, arista tenuissima versus apicem recurva, spiculam aequante, in maturitate autem eam multo superante, dorso ad basin inserta, praedita; interiore minutissima, vix manifesta, aut nulla.

Flor. Mess. — Fruct. &. Jun. — &. Sept.

Habit. Germ. in montosis Saxon. Hall. Sudet. Siles. Salisb. Bavar. in alpib. Vochinens.

13. Agrostis capillaris. Agrostis chevelu. Haarstrausgras. *

Agrostis capillaris, panicula capillari patente, calycibus subulatis aequalibus hispidiusculis, coloratis, flosculis muticis. Linn. ed. Reich. I. p. 174. ed. Gil. 3.78. s. v. ed. Pers. 113.

hispida. Fl. d. Wetter. I. p. 91.

vulgaris. Hoffm. 35.

panicula tenuissima. Fl. lapp. 45.

Alopecurus panicula capillari etc. Scopoli. ed. I. p. 184.

Poa monantha, caule erecto, panicula diffusa, calycibus dorso exasperatis. Hall. helv. 1475.

Gramen montanum panicula spadicea delicatiore — et majus. Tourn. 524. C. Bauh.

pin. p. 3. prodr. p. 12. Schleuchz.
agr. p. 129. t. 3. f. 5. Mapp. 136.

Hall. goett. p. 46.

panicula miliacea, locustis minimis. Rupp.

miliaceum minus, panicula rubente. Monti.

52. ic. 64.

Lamarch. 1171. 15. Dalib. par. 23. Gotian. hort.
p. 40. fl. 118. Weig. pom. n. 50. Poll. 1. p. 69. Lestib.
216. Gmel. tub. p. 18. Roy. lugdb. n. 59. Leyss. hall.
n. 69. Zinn. goett. p. 62. Reich. frc. 15. Moench.
hass. n. 69. Meth. p. 179. Gort. ingr. 10. Murr prodr.
p. 41. Nekker gallob. p. 40. Roth. 1. p. 32. 2. p. 85.
Doerr. nass. p. 1. Scholl. barb. n. 57. Sauv. 34. Panz.
12. 244. Schreber. spic. p. 48. Matuschk. 1. 48. Wigg.
prim. p. 7. Kraschenennik. ingr. p. 11. Plan. erf. 53.
Wilke gryph. n. 51. Jacq. vind. p. 13. Hoffm. 36. et
icon. Grimm. isen. p. 262. Schrank. 1. p. 326. Will-
den. prodr. p. 135. Scopol. 1. p. 61. Berg. frc. 320.
Stillingfleet. misc. t. 3. Oeder. t. 163. ? Leers. 22.
t. 4. f. 3. Dietr. 1. 93. Delarbre. 9. Krock. 1. 113. t.
21. Wibel. w. 123.

Radix annua repens aut subrepens, fibrosa, alba.
Culmus teres, laevis, glaber, junior obliquus, flo-
rens erectus, interdum basi paululum incurvus,
laete viridis, simplicissimus, nodiis 3 plerumque
autem 4 purpureis instructus, gracilis, foliatus,
pedalis-bipedalis. *Folia* plana, lineam — $1\frac{1}{2}$ lata,
utrinque et margine scabra, glabra, mucronata, 2-4
pollices longa, nervo dorsali intermedio albo. *Va-
ginae* glabrae, striatae, interdum purpurascentes. *Li-
gula* alba, truncata, $1\frac{1}{2}$ lineam longa. *Panicula*
erecta 2-5 pollices longa, in anthesi quidem pa-
tens, antea et postea autem contracta, angusta, lan-
ceolata, plerumque e spadiceo-purpurea. *Pedunculi* 1-15 in semiverticillos alternos collecti, per-

lentem piloso-hispidi (uno latere hispidiore) capillares, virides aut spadicei, ramosissimi, inaequales, ante et post florescentiam semiverticaliter erecti, aut *rhachi* (per lentem obtuso-angulata) adpressi. *Pedicelli* tenuissimi, quoque piloso-hispidi (nunquam, imo armato oculo, glabri), versus apicem paululum incrassati. *Spiculae* numerosae, vix lineam longae. *Gluma calycina* mucronata, violaceo-purpurea, marginibus pellucidis argenteis, splendentibus, nervis viridibus donata, *valvula* aequalibus in et post anthesin patentissimis, exterior marginē serrata, in toto dorso, interior autem versus apicem modo piloso-hispido-ciliata: interdum vero in eadem quidem planta utraque *valvula* armato oculo glabra apparet. *Gluma corollacea* calycina minor, glabra, argentea, *valvula* exterior apice trifido (apice bifido rudimento minutissimo *aristae* intermediae): interior exigua, vix manifesta. *Antherae* flavae aut purpureae. *Stigmata* alba.

Var. 1. Culmo 3-4 pedali, panicula fere pedali (prope Moguntiam in arenosis).

2. Culmo filiformi pedunculis flexuosis, patuis, spiculis raris, panicula patentiore, imo post anthesin Smith. (in Monte Rochusberg prope Bingen inveni).

3. Valvulis calycinis laevibus.

4. Valvula calycina modo interior laevi.

5. Spiculis viviparis. Leers.

6. Spiculis pallide virentibus (in arenosis prope Moguntiacum passim).

7. Pedicellis glabris. Hoffm.

Flor. Praer. — Fruct. Matur. Thér. — Vend. β. Mai. — β. Sept. β. Jun. — β. Oct.

Habit. in pratis, pascuis, agris, versuris, sylvis montosis, nemorosis, sterilibus, arenosis, muris, ad vias tot. fere *Gall.* et *Germ.* — in nostro. Depart. prope Moguntiam, Lautern, Oppenheim, Werstadt, Bingen. —

Anno praegresso, mens. therm. (β. Jul. — β. Aug.) in sylva beim Jaegerhause plantam legi *capillari* similem, *culmo* erecto, pedali filiformi, *panicula* contractissima, *spiculis* viridibus, *valvulis* *calycinis* inaequalibus, *gluma* *corollacea* univalvi; *spinulis* *calycinis*, praecipue versus apicem, in pilos tenuissimos, quadrantem lineae longos, per lentem expitatos prolongatis. An varietas *capillaris*?

14. *Agrostis sylvatica*. Agrostis des forêts.

Wald-Strausgras. ***

Agrostis sylvatica, coarctata, mutica, calycibus aequalibus, virgineis corolla brevioribus, foecundatis duplo longioribus. Linn. ed. Reich. 174. ed. Gil. 3. 79. s. v. ed. Pers.

114.

Gramen miliaceum sylvestre, *glumis oblongis*. Raj. angl. 404.

Roth. I. 32. 2. 86. Poll. I. 69. Schrank. I. 325. Plan. erf. p. 86. Hudson. angl. 28. Wigg. prim. p. 7. Fl. d. Wetter. I. 92. Panz. 12. 295. Hoff. ed. I. p. 26.

Differet: a capillari:

Panicula spiculis aliis junioribus, vix lineam longis, quarum *valvulae calycinæ* *corollaceas* superant; *aliis vero*, maturis nempe, *glumis corollaceis calycinis longiores*.

Flor. et *Mat.* cum priore.

Habit. in sylvis siccioribus, et humidioribus.

Gall. — in Dep. Montis Jovis, prope Lautern. —

Germ. in Holsat. Wetterau. Bavar. Saxon. —

15. Agrostis pumila. Agrostis naine. Zwerg-Strausgras. **

Agrostis pumila, panicula secunda, culmis fasciculatis erectis. Linn. ed. Reich. I. p. 175. ed. Gil. 3. p. 79. s. v. ed. Pers. II. 4. Mant. I. p. 31.

Poa monantha foliis setaceis, calycibus dorso exasperatis. Hall. helv. n. 1474.

Gramen minimum, palustre, panicula spadicea, delicata, tenuifolium, semine exiguo, rotundo. Scheuchz. agr. p. 131.

Roth. I. p. 33. 2. p. 86. Pollich I. p. 70. Wigg. prim. p. 7. Hoffm. 37. Light. Scot. 2. Leyss. hal. n. 71. Fl. d. Wett. I. 93. Krock. sil. I. II. 4.

Radix perennis, fibrosa, alba. *Culmi* plures, interdum ramosi, ramis floriferis, basi paululum incurvi, laete virides, laeves, 1 - 6 pollices longi, nodis 3 - 4 purpurascens. *Folia* plana rigidissima, mucronata, 1 - 2 pollices longa, lineam 1 lata, scabra, punctis rubris interdum adspersa. *Vaginae* striatae, *suprema* longissima, ventricosa. *Ligula* brevis obtusa, incisa. *Panicula* subsecunda, densa, elliptica, semiuncialis - uncialis, raro longior. *Penduculi* omnibus in temporibus divaricati, minime autem flexuosi, seni aut septeni in semiverticillis inferioribus, ramosi, cum pedicellis glabri. *Spiculae* fasciculatae, exiguae, ovatae, splendentes, e viridi et albido purpurascentes, acuminatae, lineam dimidiam longae. *Glumarum calycinuarum valvulae* aequales, dorso vix spinulosae. *Semina* subrotunda, acuminata. *Styli* persistentes.

Var. panicula viridi.

Flor. Praer. — *Therm.* *Matur.* *Therm.* — *Vend.*

β. Maj. — β. Aug. β. Jul. — β. Oct.

Habit. in pratis et pascuis, cultis humidiusculis, arenosis. *Gall.* — in Dep. montis Jovis; prope

Lautern. — *Germ.* in Saxon. Hols. Brem. Oldenb. Wetterau.

16. Agrostis minima. Agrostis mineur. Kleinestes Strausgras. *

Agrostis minima panicula filiformi. Linn. ed. Reich. 1. p. 175. ed. Gil. 3. p. 80. s. veg. ed. Pers. p. 114.

Chamagrostis minima (Borckh.) Wibel. w. p. 126. *Poa panicula* lanceolata, vix ramosa, floribus alternis antrorsum versis. Sauvag. 37.

Nardus panicula spicata, floribus solitariis alternis. Guett. stamp. 155. Dalib. par. 155.

Gramen minimum. J. Bauh. hist. 2. p. 465. Dalech. Lugd. 425.

panicula elegantissima. C. Bauh. pin. p. 2. Moris. h. 3. p. 200. s. 8. t. 2. f. 10. Scheuchz. agr. p. 40. t. 1. f. 7. Magn. bot. 114. hort. 91.

spartum capillacco folio minimum. Dill. giefs. app. 173. t. 16. f. 1.

loliaceum minimum elegantissimum. Tourn. 517.

Goian. hort. 40. fl. 118. Roth. 1. p. 33. 2. p. 87.

Lamarck. 1171. 16. Nekker gallob. 41. Hoffm. 37.

Lestib. 216. Wigg. prim. p. 7. Pollich 1. p. 72.

Fl. d. Wetter. 1. 93. Jacq. vind. p. 13. Reich. frc. 14.

Hopp. pl. rar.o.1. Dietr. 1.93. Delarbre. 9. Krocke. sil. 1. 116.

Differt ab antecedente:

Radice annua. Culmis numerosis fasciculatis, capillaris, inferne argenteis pellucidis, superne violaceo-purpurascens, spiraliter tortis (certe in maturis, siccis), 1-4 pollices longis, maxima ex parte nudis, nodo vix ullo, certe non colorato,

aut duro. *Foliis radicalibus*, aut *culmeis inferioribus* vix 2 - 3 lineas longis, parvis, laevibus, glabris, setaceo- et canaliculato-planis, obtusis. *Vaginis* laevibus, *superioribus* arcte culnum includentibus, *radicalibus* squamaceis, pellucidis. *Ligula* minutissima, obtusa, integra. *Rhachi* capillari, interdum flexuosa, simplici, uno tantum latere *pedicellos* brevissimos unifloros gerente. *Spiculis* unilateribus 8 - 12, aut omnibus unum latus spectantibus, aut respectu directionis, alternis. *Valvulis calycinis* oblique truncatis, subaequalibus, perfecte glabris, florentibus patentibus, — (nunquam eas, imo per letem, margine pilosas inveni. Au plures ad-sunt varietates?) *Gluma corollacea* villosa (in maturis certe valvulas 2, alteram angustiorem, vidi). *Semine* parvo, ovato. *Sty-lis* villosis persistentibus coronato.

Var. panicula ramosa; (primo intuitu ^{Panic} Dactylo L. similis.)

Flor. Ventos. — *Flor.* Matur. *Flor.* — Praer. β . Febr. — β . Mai. — β . Apr. — β . Jun.

Habit. in arenosis, pratis, vineis, arvis, sabulosis Gall. — prope Lutet. paris., quoque in Dep. des deux Nethes; de Dyle; Jemappe; de Lys; de la Loire; du Rhone; de l'Aube; des Cotes d'Or; de l'Hérault; de la haute Garonne; du Mont tonnéré ad ripas Rheni. etc. *Germ.* in Palatinatu, Wetterau, Holsat. Austr. Siles. Saxon. Baruth. Bavar. Giefs. Francon.

17. Agrostis alba. Agrostis blanche. Weisses Strausgras. **

Agrostis alba panicula laxa, calycibus muticis, aequalibus, culmo repente. Linn. ed. Reich. I. 175, ed. Gil. 3. 79. s. v. ed. Pers. 114.

stolonifera, var. alb. Goian. fl. 118.
palustris, panicula coarctata mutica; caly-
 cibus aequalibus, hispidiusculis,
 culmo repente. Hudson. angl. 27.

Gramen miliaceum majus, panicula spadicea et vi-
 ridi. Pet. gram. 118. 119. Raj.
 angl. 3. p. 404.

Gmelin. tub. p. 19. Poll. I. p. 70. Leyss. hal. n.
 70. Moench. hass. n. 6. Roy. lugdb. 50. Scholl. barb.
 n. 58. Schrank I. p. 326. Leers 21. t. 4. f. 5. Roth. I.
 p. 32. 2. p. 86. Goian. h. 546. -- Willden prodr. n.
 136. Fl. d. Wett. t. 92. Boehm. lips. n. 612. Dietr.
 I. 93. Jacq. vind. p. 13. Panz. 12. 296. Hoffm. 36.
 Delarbre 9. Krock. I. 115. Wibel. w. 123.

Radix perennis, fibrosa, alba. *Culmi* I - tripe-
 dales, basi articulis pluribus repentibus donati, mo-
 do decumbentes ramosi, modo erectiores, certe vero
 superne erecti. *Folia* plerumque latiora quam in sto-
 lonifera et capillari, et firmiora, scabraque. *Vaginae*
 glabrae, laeves, internodia vix semitegentes. *Ligula*
 oblonga, obtusa. *Panicula* palmaris et paulo longior,
 ex viridi purpurascens, rigidior et crassior, quam
 in stolonifera, ceterum coarctata-patula. *Pedunculi*
 flexuosi, numerosi, in semiverticilos densos, al-
 ternos, dispositi, ramosissimi, itaque suberecto-pa-
 tentes ut internodia rhacheos parte superiore haud-
 tecta sint, post anthesin omnes nutantes. *Pedicelli*
 divaricati, incrassati, hispidi. *Spiculae* numerosae,
 ovatae (minime autem valvulae). *Gluma calycina*
valvulis aequalibus, lanceolatis, marginibus albis,
 membranaceis, in anthesi patentibus, dorso hispido;
exteriore fere margine toto denticulato, *interiore*
versus apicem; matura albidae aut citrinae. *Gluma*
corollacea calycina duplo fere minor, subventricosa,
valvulis inaequalibus, *exteriore* apice, uti in capil-
 lari, trifido. *Antherae* violaceae.

Var.

Var. 1. *panicula purpurea.*

2. *Culmo erecto, geniculis paucioribus.*

Flor. Praer. — Therm. *Matur.* Therm. — Vend.
β. Mai. — β. Aug. — β. Jul. — β. Oct.

Habit. in nemoribus, fossis, pratis uidis, agris
humidis, sepibus *Gall.* — in Dep. des deux Nethes;
de la Dyle; de l'Herault; de Mont-tonnerre etc. —
prope Lautern. — *Germ.* in Hass. Saxon. Austr.
Nassov. Brand. Wetterau. Suev. Barb.

Verisimiliter Var. stoloniferae aut capillaris est.

18. *Agrostis divaricata.* *Agrostis étalé.* *Sper-*
riges-Strausgras. ***

Agrostis divaricata, *panicula divaricata*, *capillari-*
mutica, *calycibus subaequali-*
bis, *valvula exteriore mucro-*
nata, *culmo obliquo*, *radice*
stolonifera. Hoffm. 37.

Radix perennis, repens, stolonifera, fibrosa.

Culmus decumbens, oblique adscendens. *Folia latiuscula*, culmea, longitudine circiter unciali. *Pani-*
cula divaricata. *Spiculae similes* quidem majores
vero spiculis agr. stoloniferae. *Gluma calycina*
valvulis subaequalibus, spadiceis, corollaceis lon-
gioribus, mucronulatis, dorsoque hispidulis. *Se-*
men tumidulum, ustilagine corruptum.

Flor. Praer. — Therm.

β. Mai. — β. Aug.

Habit. in montosis siccis. *Germ.*

Verisimiliter var. stoloniferae.

19. *Agrostis stolonifera.* *Agrostis traçante.* 1522
Wurzelsprossendes Strausgras. *

Agrostis stolonifera *paniculae ramulis patentibus mu-*
ticis, culmo repente, calycibus
æqualibus. Linn. ed. Reich. I. 175.

G

ed. Gil. 3. 78. Fl. suec. 2. n. 66.

Agrostis. v. ed. Pers. 113.

tenella. Hoffm. 36. culmo repente, vagina folii supremi ventri- cosa, Roy. lugdb. 59. Dalib. par. 23. Sauv. 34.

Gramen caninum supinum majus. Scheuchz. agr. p. 128. Vaill. p. 86. radice repente, panicula delicata spadiceo-viridi. Scheuchz. p. 127. t. 3. f. 5. A.

montanum miliaceum radice repente. Raj. syn. 3. p. 402.

Poa monantha stolonifera, calycibus laeviter exasperatis. Hall. helv. n. 1413.

Roth. 1. 32. 2. 84. Lamarck. 1171. 13. Wigg. prim. p. 7. Pollich. 1. 68. Oeder t. 364. Goian hort. 40 et sub nom. triv. *viridis* 546. fl. 118. Plan. erf. p. 53. Moench hass. n. 59. Meth. 179. Boehm. lips. 611. Gort. ingr. p. 10. Dietr. 1. 93. Willden. prodr. n. 134. Schrank. 1. 325. Leyss. hal. 68. Nekker. p. 40. Leers. 20. t. 4. f. 6. Scholl. suppl. 1021. Fl. d. Wetter. 1. 90. Lestib. 216. Gmelin. tub. p. 18. Panz. 12. 293. Delarbre. 9. Krock. sil. 1. 112. Wibel. w. 123.

Radix perennis, repens, fibrosa, alba. *Culmi* interdum basi paululum bulboso-incrassati, inferne valde geniculato-prostrati, ramosi, dein adscendentes, teretes, glabri, tenues, infirmi, nodis 4 - 6 purpureis donati, 1 - 3 pedes longi. *Folia* plana, mucronata, glabra, laete viridia, scabra, 3 - 7 pollices longa, 2 - 3 lineas lata; *culmea* angustiora. *Vaginae* laeves, laxae, glabrae, striatae. *Ligula* brevis, obtusa. *Panicula* plerumque 2 - 6 pollices longa, raro longior, pauciflora, primum contracta, dein maxime diffusa, laxa, aetate divaricata, viridis aut ex viridi-purpurascens. *Pedunculi* 5 - 10 capilla-

res, ramosissimi, in semiverticilos alternos dispositi, pedicellis brevibus divaricatis donati. *Spiculae* vix lineam longae, ante anthesin virides, aut viridi-spadiceae, postea albido-argenteae, lanceolato-mucronatae. *Gluma calycina valvulis* subaequalibus, exterior paululum longiore, et dorso, interior angustiore vero basi aut apice piloso-scabra. *Gluma corollacea calycina* paulo minor, *valvula* exterior basi subpilosa, apice uti in *alba* et *capillari* trifido; interior minore. *Antherae* flavae aut purpureae. *Stigmata* alba.

Var. Culmis inferne radicantibus.

Flor. Praer. — Therm. *Matur.* Therm. — Vend. β . Mai. — β . Aug. β . Jul. — β . Oct.

Habit. in agris, versuris, umbrosis, sylvis, arenosis, fossis, montosis, humidis, et humidiusculis, t. fere *Gall.* — in nostro *Depart.* prope Lautern et Moguntiam in pratis am Hartebach. — et *Germ.* (prope Kassel et Kostheim ad rivulam Kaesbach eam legi.)

20. *Agrostis coarctata*. *Agrostis serré*. Enges. Strausgras. ***

Agrostis coarctata, panicula contracta, calycibus subaequalibus, corollis brevioribus, obtusis, hispidulis, foliis angustis. Ehrh. gram. 133 Hoffm. 37.

Difserit ab antecedenti;

Culmo filiformi basi tantum obliquo. *Foliis* angustis fere setaceis. *Panicula* 2 - 3 unciali, contracta, *pedunculis* erectis praedita, e violaceo-purpurascente. *Gluma corollacea* obtusa hispidula.

Flor. Praer. — Therm. β . Mai. — β . Aug.

Habit. in montosis, siccis *Germ.* in elect. Hannov.

AD TAB. XIV.

XIII. Calamagrostis. *Calamagrostis.*
Rohrgras (*Agrostis*, *Arundo*, et *Gramen* auct.).

Roth. I. 15. et 53. - 2. 87. Fl. d. Wetter. I. 43.
 Moench. meth. 179.

Differt ab *Agrosti*:

Gluma corollacea lanata, aut basi pilis longis cincta, raro calycina crassiore, *valvula exteriore* plerumque aristata, *arista* saepe tenuissima capillari. *Ovario* uti in *agrosti*, raro turbinato. *Stylis* vel uti in *agrosti*, vel villosis, vel unico. *Squamulae* uti in *agrosti*, interdum vero. *Filamenta* uti in *agrosti*, raro tantum 2. *Panicula magna*. *Spiculae* lanceolatae oblongae. *Habitus externus* saepe arundinaceus.

(Ab *Arundine* differt: *Gluma calycina* uniflora.)

1. Calamagrostis arenaria. *Calamagrostis des sables.* Sandrohrgras. ***

Calamagrostis arenaria, panicula spicata, corollis muticis, basi pilosis, foliis involutis, mucronato-pungentibus. Roth. I. p. 34. 2. p. 93. Beitr. I. p. 8. Fl. d. Wetter. p. 95.

Arundo arenaria, calycibus unifloris, foliis involutis, mucronato-pungentibus. Linn. ed. Reich. I. p. 228. ed. Gil. 3. p. 214. s. v. ed. Pers. 128. Gmelin. tub. p. 332. Lamarck. 1183. 3. Kerner. t. 386. Scholl. barb. n. 98. Gort. ingr. p. 18. Timm. prodr. n. 663.

Goüan. hort. 55. R. 120. Weig.
pom. n. 81. Ehrh. gram. 17. Dietr.
1. 124. Mart. fl. rust. t. 31. Dicks.
h. s. 12. 5. Weber. spic. p. 5.
Hoffm. 62. Viborg. Sandgew. t. 1.
Wigg. prim. p. 11. Reyg. ged. I.
p. 38. n. 3. Fl. dan. 917. Engl.
bot. 520.

foliorum lateribus convolutis, acu-
mine pungente; flor. lapp. 43. suec.
102. 108. it. scan. 336.

Spartium spicatum, pungens oceanicum. J. Bauh. h.
2. p. 511.

Gramen sparteum, spicatum, foliis mucronatis, lon-
gioribus, vel spica secalina. C.
Bauh. pin. p. 5. Magn. bot. 119.

foliis junceis convolutis ac pungentibus.
Magn. bot. 120.

spicatum secalinum, maritimum, maxi-
mum, spica longiore. Tourn. 518.
Scheuchz. agr. p. 138. t. 3. f. 8.

Radix pereennis articulata, repens. *Culmus*
erectus, pedalis - bipedalis, et paulo altior, glaber,
striatus, infra spicam scaber. *Folia* pedalia-sesqui-
pedalia, culmum superantia, involuta, indeque te-
retia, mucronato-pungentia, glauco-viridia, gla-
bra, extus nitida, intus aut pagina superiore lineis
eminentioribus notata; *radicalia* fasciculata, erecta.
Vaginæ scabriusculae, longae, striatae, plerumque
purpurascentes. *Ligula* semiuncialis, lanceolata,
acuminata, profunde bifida, et nonnunquam fissa.
Panicula densa, compacta, spiciformis, fere cy-
lindrica, colore stramineo, 3 - 6 pollices longa.
Gluma éalycina valvulis inaequalibus, longis, ob-
tusis, carinatis, nervo dorsali viridi, scabris, *inte-*
riore paulo minore, basi usque ad medium triner-

via. *Gluma corollacea valvulis inaequalibus, obtusis, scabris, basi pilis lineam longis circumdati; exteriore gluma calycina paulo breviore, quinque-nervia, apice laeviter bifido, interiore trinervia, angustiore, paululum exteriore breviore.*

Flor. Praer. — Therm. Matur. Therm. — Vend. 15 Mai. — 15 Aug. 15 Jul. — 15 Oct.

Habit. in arena, praecipue mobili, ad stagna, maritima, *Gall.* — in Dep. de l'Herault; du Var; du Gard; des Bouches du Rhône; des Landes; — *Germ.* in Siles. Suev. Wetter. Luneb. Brem. Old. Hols. Pom. Hass. Westphal.

2. *Calamagrostis arundo. Calamagrostis argenté. Schilfrohrgras. ****

Agrostis calamagrostis panicula incrassata, petalo exteriore toto lanato, apice aristato, culmo ramoso. Linn. ed. Reich. 1. 171. ed. Gil. 3. 77. s. v. ed. Pers. 112. Delarbre. 8.

argentea. Lamarck. 1171. 4.

Arundo Halleri, panicula incrassata, calycibus unifloris, petalo exteriore bifido, apice aristato, arista brevissima. Willd. prodr. n. 187.

Leersii. Koch. Hbch. 49.

locustis unifloris ex summa gluma aristatis. Hall. helv. n. 1521.

Radix perennis, fibrosa. *Culmus* 2 - 4 pedalis, articulatus, basi incrassatus, foliatus, plerumque inferne ramosus. *Folia* longa, 2 - 3 lineas lata, glabra, marginibus retrorsum scabriusculis. *Panicula* contracta, angusta, superne crassior, densa, erecta, 4 - 7 pollices longa. *Spiculae* paululum ultra lineam longae, ex ovali-acuminatae. *Gluma calycina valvulis* basi viridibus, margine et apice argenteis.

splendidis, inaequalibus, in longam *mucronem* aristissimilem terminatis. *Gluma corollacea* conica *valvulis* fugacibus, *exteriore* tota lanata ex apice aristata, *arista* 4 lineas circiter longa.

Var. 1. vivipara.

2. culmo simplici.

Flor. aestate.

Habit. rupestribus alpinis et subalpinis, in arenosis humidis, paludosis, *Gall.* — in Dep. de l'Hérault. — *German.* in Tyrol. Carniol. — *Helvet.* Ital.

3. *Calamagrostis lanceolata*. *Calamagrostis* plumeux. Lanzetförmiges Rohrgras **. 1529.

Calamagrostis lanceolata, *panicula lanceolata* contracta spiciformi, *corollis linearibus*, basi pilosis, *arista dorsali recta brevi*, *culmo ramoso*. *Roth.* I. 34. 2. p. 90. *Fl. d. Wettler.* I. 92. *Oestr. fl.* I. 53.

Arundo Calamagrostis, *calycibus unifloris laevibus*, *corollis lanuginosis*, *culmo ramoso*. *Linn. ed. Reich.* I. 288. (excl. *Syn. Scheuchz.*) *ed. Gil.* 3. 214. *flor. lapp.* 42. *fl. suec.* 100. 107. *s. veg. ed. Pers.* 128. *Oeder. t.* 280. *Lamarck.* 1182. 2. *Boehm. lips.* n. 625. *Poll.* I. p. 129. *Jacq. vind.* p. 19. *Roy. lugdb.* 66. *Wigg. prim.* p. 10. *Couan hort.* p. 55. *H.* 120. *Scholl. barb.* n. 97. *Sauv.* 38. *Schrink.* I. 379. *Grimm. fisen. em.* p. 121. *Dietr.* I. 124. *Hoffm.* 61. *Plan. erf.* p. 61.

Gmelin sib. I. p. 126. Weig.
pom. n. 80. Pallas. it. I. p.
62. Lestib. 216. Willd. prodr.
n. 185. Matuschk. I. 73.
Panz. 12. 504. Engl. bot. 403.
Leyss. hal. n. 123. Nekker
gallob. p. 69. Ehrh. Beitr. 6.
136. Gram. n. 84. Gmelin.
tub. p. 31. Delarbre. 27.

epigejos. Moench. hass. n. 98. (excl. syn.)
canescens. Wiggers. prim. p. 10.

Gramen arundinaceum paniculatum montanum, pa-
nicula spadiceo viridi,
semine papposo. Scheuchz.
agr. p. 124.
ramosum, plumosum, album.
Magn. bot. 117,
calamagrostis dictum; spica
multiplici Magn. hort. 93.
avenaceum, acerosa panicula, locustis mi-
noribus, semine non papposo.
Dill. giess. p. 103. app. p. 50.
paniculatum arundinaceum panicula densa,
spadicea. Tourn. 523.

Radix perennis, crassa, articulata, repens, ex
albido - flavicans, fibrosa. *Culmi* tenues, basi 1 - 2
lineas lati, teretes, erecti, 2 - 4 pedales, articulati,
nодis 4 - 6 purpureis donati, glabri, plerumque ra-
mosi, ramis ex apice vaginarum prodeuntibus, fo-
liati, striati, ante et incipiente anthesi usque ad pa-
niculam vaginis tecti. *Folia* plana mucronata, sca-
bra, 2 - 3 lineas lata, glabra, *inferiora* brevissima,
reliquia 5 - 13 pollices longa, siccata convoluta, ari-
da, nervo dorsali albido. *Vaginae* glabrae, stria-
tae, glauco - virides. *Ligula* obsusa, breviter
fissa. *Panicula* variegata, junior contracta, angusta,

lanceolata, aetate laxior, semipedalis - pedalis. *Pedunculi* 3 - 6 in semiverticilos alternos dispositi. *Spiculae* duas lineas longae, angustissimae, fere setaceae, subulatae, purpurascentes. *Gluma calycina valvulis* aequalibus, junioribus ex viridi et atro-violaceo variegatis, aetate alblicantibus, aut stramineis, angusto-lanceolatis, acuminatis, diaphanis, plerumque pubescentibus. *Gluma corollacea glabra*, calycina duplo fere brevior, *pedicello*, *pappo* plumoso longitudine fere valvularum calycinarum circumdato; *valvula exteriore* lanceolata, inueronata, e dorso aristam tenuissimam, lineam circiter longam, rectam, emitente. *Antherae* pallide flavae. *Stigmata alba*, plumosa.

Var. 1. *Culmo simplici.*

2. *Panicula albicante.*

Flor. Prae. — Therm. *Matur.* Therm. — Vend.

β. Maj. — β. Aug. β. Jul. — β. Oct.

Habit. in paludosis, graminosis, uidis, pratis, sylvis, ad ripas, *Gall.* — in Dep. des deux Nethes; de la Dyle; de l'Herault; de la Roer; du Rhone; de la Loire; de la Saone et Loire; du Monttonnerre. — prope Moguntiam, in Jungenfelder Aue; am Dominikanerhause, et in palude mombacensi; porro am Holzhof, Schoeneberg, Ramstein, Kiebelberg, Oggersheim, Gernsheim, Sandhof. — *Germ.* in Saxon. Hass. Wetter. Siles. Bavar. Suev. —

4. *Calamagrostis stricta*. *Calamagrostis étroite*.

Schmales Röhrgras ***.

Arundo stricta, panicula coarctata, spiciformi, calycibus unifloris, petalis lanceolatis glabris, coloratis, arista dorsali recta, culmo trinodi simplici.

Hoffm. 61. Timm. mekl. Mag. 2.235.
neglecta. Ehrh. Beitr. 6. 137. gram. n. 118.

Calamagrostis neglecta. Fl. der Wetter. I. 94.

Culmi erecti, 3 - 4 nodes, ramosi. *Panicula magna ramosissima*, in florescentia patens, antea posteaque vero contracta, fere lanceolata, et stricte erecta. *Spiculae* minores quam in antecedente. *Gluma calycina valvulis* ex ovali-lanceolatis, pellucidis. *Gluma corollacea glabra*, *valvula exteriore* infra medium e dorso aristata, *arista recta*, et *pappo* longitudine glumae corollaceae aut vix longiore.

Var. Culmo simplici.

Flor. Praer. — *Fruct.* Matur. Therm. — Vend.

β. Maj. — β. Sept.

β. Jul. — β. Oct.

Habit. in sylvis, ad vias, in pratis humidis, *Germ.* in Wetter. Hannov. Meckl.

5. *Calamagrostis pseudophragmitis.* Faux roseau. Unächtes Rohrschilf. ***

Arundo pseudophragmitis panicula ramosa, laxa, calycibus unifloris, valvula exteriore apice fissa, aristata, arista longitudine calycis. Hoffm. 61. I. et Haller in Röm. bot. Arch. 2. II.

Culmus ramosus. *Panicula ramosissima, laxa, diffusa.* *Spiculae linearis - subulatae.* *Gluma corollacea valvulis inaequalibus, calycinis dimidio minoribus, hyalinis, exteriore apice fisso, aristato, arista recta, scabra, filiformi, longitudine glumae calycinae.* *Pappus* glumae calycinae longitudinis.

Flor. Mess. — *Therm.*

β Jun. — β. Aug.

Habit. ad ripas, in paludosis. *Germ.* (Meus. Messid. florēntem prope Gottesthal in Rhenogavia anno praegresso inveni, certe ex apice aristata. *Gluma corollacea glabra.* *Culmis* pluribus ex una radice, supra basin incurvatis, nodis 5, vix infra paniculam

scabris. *Panicula* laxiore quam in lanceolata. *Foliis* scabris, pedalibus, 2 - 3 lineas latis.

6. Calamagrostis Leersii. Calamagrostis roseau. Leersisches Rohrgras *.**

Calamagrostis arundo, paniculo incrassata, petalo exteriore (piloso) dorso aristato, culmo ramoso. Roth.

I. p. 33. 2. p. 88.

Agrostis calamagrostis. Leers. 19. (excl. Syn.)

Radix perennis, densa, fibrosa, arcte implexa. *Culmi* 4 - 5 pedales, simplices, binodes, nodo inferiore supra basin (ubi culmus non raro incurvus est) superiore in medio culmi. *Folia* lineata duruscua, laete viridia, lata, utrinque, praecipue pagina inferiore, scabra: *radicalia*, sesqui-bipedalia, caespitosa, densa, siccata convoluta; *culmea inferiora*, striata, patentissima. *Vaginae* arcta^e, striatae, subscabriuscule. *Ligula* oblonga, acuminata, crenata aut fissa. *Panicula* semipedalis, oblonga, e viridi-glaucā, in florescentia patens, ramosissima, antea et postea contracta. *Pedunculi* in semiverticillo^s alternos dispositi, stricte erecti, cum *Pedicellis*, scabri. *Spiculae* dense confertae, subsecundae, paululum ultra lineam absque arista, longae, ovatae. *Gluma calycina valvulis* aequalibus subulatis, infra medium viridibus, supra medium rufescensibus, dorso hispidulis, margine albis. *Gluma corollacea* alba, basi tantum pilosa, in planta sicca fugacissima; *valvula exteriore* acuminata, apice fiso, calyce duplo minore, nitida, glabra, dorso infra medium aristata, *arista recta*, crassitie aequali, scabra, paululum gluma corollacea longiore, calycina vero breviore: *interiore* duplo minore, apice bifido, dorso pilosissimo. *Squamulae* lanceolatae, basi callosae, *Ovarium* exiguum viride, subrotundum ambientes.

Styli patentes crassiusculi. Stigmata dense plumosa. Semen acuminatum, pilis basi cinctum, aristâ recta, persistente, paulo longiore coronatum.

Flor. Mess. — *Fruct.*

Jun. — Sept.

Hab. in sylvaticis, paludosis. *Germ.* prope Herborn. Bremens.

7. *Calamagrostis arundinacea.* *Calamagrostis brune.* *Braunes Rohrgras **.*

Calamagrostis arundinacea, panicula oblonga, petalo interiore basi piloso, exteriore glabro, arista e basi torta calycé longiore. Roth. I. 33. 2. p. 89. Fl. d. Wett. II. 93. Oestreichs fl. I. 53. Wibel. w. I. 122.

Agrostis arundinacea panicula oblonga, petalo exteriore basi villosa aristaque torta calycé longiore. Linn. ed. Reich. I. 171. (excl. syn. Dill.) ed. Gil. 3. p. 76. s. veg. ed. Pers. p. 112. Grimm. isen. p. 261. Delarbre. 8. Mattuschk. I. p. 46. Moench. Hass. p. 57. Méth. 179. Poll. I. Kröcker. I. 108. 66. Plan. erf. n. 53. Schrank. I. 323. Jacq. vind. p. 13. Hoffm. 34. Timm. prodr. 623. Leyss. lal. n. 63. Ehrh. grám. 123. Schreb. spic. p. 47. Panz. I. 284.

calyp euodi, panicula contracta. fl. lapp. 44.

Arundo agrostis. Scop. I. p. 88. Wigg. prim. p. 10. Willd. pr. n. 186.

locustis unifloris, glumis ex imo dorso aristatis. Hall. helv. 1522.

Gramen miliaceum sylvestre glumis oblongis. Pet. gram. 121. Raj. angl. 3. p. 404.

avenaceum, montanum, panicula angusta, e dilutissimo fusco albente et papposa. Scheuchz. agr. p. 507.

Rupp. jen. p. 314.

Radix perennis, fibrosa. *Culmus* erectus, 3-4 pedalis, glaber, teres, laete viridis. *Folia* 3 pollices - 2 pedes longa, 1½ - 3 lineas lata, mucronata, pubescentia, marginibus scabris, ad vaginas pilosa, nervo dorsali albido. *Ligula* alba, 2 lineas longa. *Vaginae* scabriuscule, striatae. *Panicula* palmaris, et paulo altior, ex viridi flavescentis, magis lanceolata et contracta quam in C. Leersii, parte florente patentiore, ramosissima, non splendens. *Pedunculi* in semiverticillo alternos dispositi, inferiores 3-7ni, filiformes. *Spiculae* ex viridi-fuscescentes, lanceolatae, acuminatae, absque arista 2 lineas longae. *Gluma calycina valvulis* aequalibus, lanceolatis, acuminatis, dorso praecipue scabriusculis. *Gluma corollacea valvulis* aequalibus, calycinis paulo minoribus, apice profunde bisidis, quasi biaristatis, nervis viridibus ornatis: *exteriore* glabra, basi vero pilis nonnullis praedita, supra basin *aristam* tortilem in medio geniculatam, modiceque incurvam, 3 lineas circiter longam, producente; *interiore* basi et supra basin pilis longis candidis vestita. *Antherae* pallide flavae. *Stigmata* plumosa alba.

Flor. Praer. — Therm. *Matur.* Therm. — Vend. *β. Mai.* — *β. Aug.* *β. Jul.* — *β. Oct.*

Habit. in locis humidis, umbrosis, sylvis, ru-

deratis, juniperinis, montosis, glareosis, tot. fere.

Germ. — in Gall. in nostro quidem Depart. prope Beutelsteiner Schloß, Lautern, Steinbach, ad pedem

montis Jovis. — Porro in Dep. du Cantal, de l'Allier, de la Creuze etc.

3. Calamagrostis epigejos. Calamagrostis des collines. Hügel-Rohrgras. ***

Calamagrostis epigejos panicula striata, corollis exiguis basi pilosis, foliis (subtus) glabris. Roth. I. p. 34. 2. p. 91. Fl. d. Wett. I. 91. Moench. meth. 179. oestr. fl. I. 53. Willd. I. 122.

Arundo epigejos calycibus uniflores, panicula erecta, foliis subtus glabris. Linn. ed. Reich. I. p. 218. (nec I syn. Scheuchz.) ed. Gil. 3. 214. s. veg. Pers. 128. Gmelin. tub. p. 332. Schreber. spic. p. 52. Jacq. vind. p. 19. Dietr. I. 124. Plan. erf. p. 61. Weber. spic. p. 5. Reich. frc. p. 169. Scholl. barb. n. 96. Forsk. flor. aegypt. descript. p. 23. n. 82. Scop. I. p. 87. Hoffm. 60. Wilke gryph. n. 66. Ehrh. Beitr. 6. 135. gram. n. 74. Wigg. prim. p. 10. Weig. pom. n. 79. Engl. bot. 404. Willd. prodr. p. 184. Delarbre. 27.

calamagrostis. var. Lamarck. 1183. 2.

panicula coarctata erecta integra, foliis inferne glabris. fl. s. v. 101. 106.

locustis unifloris sericeis muticis, panicula stricta. Hall. helv. n. 1520.

calamagrostis. Moench. hass. n. 99. (excl. syn.)

Gramen paniculatum arundinaceum, panicula densa spadicea. Tourn. 523. Buxb. hal. p. 141. Rupp. jen. p. 314.

plumosum Lobelii, spica candida et serici modo lucens. J. Bauh. h. 2. p. 476.
 arundinaceum montanum, panicula longa angusta. Dill. gies. p. 118.
 app. 52.
 panicula molli spadicea majus.
 C. Bauh. pin. p. 6. Schenckz agr. p. 122. l. 3. f. 3. prodr. p. 21. t. 5.

Radix perennis, repens, fibrosa. *Culmi* simplicissimi, 2—5 pedes alti, praecipue infra paniculam. *Folia* 6 lin. — ultra pollicem lata, ultra pedalia, striata lanceolata, glabra, rigida, subtus et in margine scabra, nervo dorsali eminent. *Vaginae* scabriusculae, striatae. *Ligulae*, praecipue superiores, longae, acuminatae, profunde divisae. *Panicula* semipedalis et longior, ramosissima, stricta, rigida, compacta, utrinque attenuata, medio ventricosa, obscure purpurascens. *Pedunculi* in semi-verticillos alternos dispositi, subflexuosi, scaberimi. *Spiculae* confertae, plerumque secundae, lineares, longius mucronatae, ultra 3 lineas longae. *Gluma calycina valvulis* fere aequalibus, margine coerulescentibus, lanceolato-linearibus, mucronatis, dorso praecipue scabris. *Gluma corollacea calycina minor*, *valvulis* inaequalibus, basi pappo copioso, glumae aequali, aut paulo longiore, setaceo, circumdatis: *exteriore* apice profunde bifido, lacinis angustissimis, non raro etiam bifidis, scabris, dorso scabro aristato, *arista* rufescente, scabra, *valvula* plerumque longiore, longitudine pappi: *interiore* duplo fere minore, bifida.

Var. 1. *gluma* *coroll.* *non* *aristata.*

2. *Valvula calycina unica.* Moench.

3. —— *corollacea unica convoluta, calyce majore.* Scopol.

4. foliis superiore pagina pubescentibus.
5. Pedunculis patentioribus.
6. foliis involutis.

Flor. — Mess. — Fruct. *Matur.* Therm. — Vend.
f. Jun. — f. Sept. — f. Jul. — f. Octobr.

Habit: in collibus aridis, sylvaticis, pratis humidis, ad ripas. *Gall.* et *Germ.*

9. *Calamagrostis Lagurus.* *Calamagrostis-Lagurier.* *Samt-Rohrgras.*

Lagurus cylindricus, spica cylindrica mutica. Linn.
ed. Reich. I. 226. ed. Gil. 3. p. 113. S. v. ed. Pers. 127. Lamark 1173. 2. Gerard. prov. 104. Goian. II. 120. Dietr. I. p. 121. Delarbre. 113.

Imperata arundinacea. Cyrilli. pl. rar. regn. neap. tab. 11. f. 2.

Gramen tomentosum spicatum. Tourn. 518. C. Bauh. pin. p. 4. Magn. bot. 116.
alopecurus Dalech. h. 430.
creticum spicatum, spica purpurea. Schéuchz. agr. 57. t. 11. f. 4.

alopecurus spica longa tomentosa candicante.
J. Bauh. h. 2. p. 474.

alopecuroides major, spica longiore. Magu. bot. 115. hort. II.

pratense alopecurum, sericea panicula. Barr. ic. 11.

Radix perennis, fibrosa. *Culmus* 1—2 *pedalis*, *articulatus*, *foliatus*, *plerumque glaber*. *Folia radicalia longa*, *nervo dorsali eminentia*, *culmea internodiis breviora*. *Panicula spiciformis*, 5—7 *plices longa*, *teres*, *cylindrica*, *acuta*, *lanata*. *Gluma calycina*, *corollacea angustior*, *valvulis linearibus*,

bus, patulis. *Gluma corollacea* mutica, lana densissima obvallata, *valvulis* inaequalibus, exteriore longiore, interiore parva, acuminata. *Filamenta* 2. *Antherae* oblongae. *Ovarium* turbinatum. *Stylus* unicus villosus. *Squamulae* o. *Semen* oblongum.

Habit. ad vias *Gall.* — in Dep. de l'Herault; du Var; du Puy du Dome; des Bouches du Rhône; de la Vaucluse. —

AD TAB. XV.

XIV. Lagurus. Lagurier. Samtgras (Gramen. Tourn.).

Venten. 2. 99. Linn. ed. Gil. 2. 25. Lam. t. 41.
Gaertner. I. 3. t. I. f. 5. Schreb. graes. t. 19. f. 3.
Moench. m. 181.

Gluma calycina uniflora bivalvis, *valvulis* fere aequalibus, longis, lanceolato-linearibus, tenuissimis, patulis; utraque in apicem aristiformem longum, villoso-plumosum desinente. *Gluma corollacea* bivalvis, calycina, crassior, *valvulis* inaequalibus; exteriore longiore, *aristis* duabus terminalibus, parvis, rectis, et *tertia* ex medio dorsi, geniculato-reflexa, torta, instructa; *v. interiore* parva, acuminata. *Squamulae* 2 lanceolatae, obtusae, basi cartilagineae. *Filamenta* tria capillaria. *Antherae* oblongae. *Ovarium* turbinatum. *Styli* duo, setacei, villosi. *Stigmata* simplicia. *Gluma corollacea* rigidior facta semen fovens, ac demittens. *Semen* unicum, oblongum, aristatum.

Spica, s. *Panicula spiciformis* oblonga, albida, mollis, lanata.

Lagurus ovatus. Lagurier oval (vulg. Queue de Lapin). Samtgras. ***

Lagurus ovatus, spica ovata aristata. Linn. ed. Reich. I. 226. ed. Gil. 3. 113. s. v. ed. Pers. 127. Schreb. Gr. p. 143. t. 19. f. 3. Gaertner I. 3. t. 1. f. 5. Lam. 1173. I. Goüan. h. 54. Flor. 119. Sauv. 58. Lestib. 217. Moench. m. 182. Dietr. I. 121. Delarbre. 113.

Alopecurus. Dod. pempt. 541. f. med. Gesn. fasc. p. 120. t. 22. f. alt. Lob. ic. I. p. 45.

Gramen spicatum tomentosum longissimis aristis donatum. Tourn. 517. Scheuchz. agr. 58. Barrel. obs. 1178. ic. 116. f. I. 2. alopecurus alter Lobelii, J. Bauh. h. 2. p. 475. alopecuroides spica rotundiore. G. Bauh. pin. 4. theatr. 56. Mor. h. 3. p. 190. n. I. s. 8. t. 4. f. I. Mont. prodr. 19. f. 87. Magn. bot. 115. hort. 92.

Tota Planta (excepto plerumque internodio supremo) pubescens, aut villosa, ex viridi glaucescens, villis per lentem planis. *Radix* annua, fibrosa, albida. *Culmi* 4 pollices — sesquipedem longi, graciles, striati, erecti, inferne non raro geniculato-incurvi, laeves, vix infra paniculam, scabriusculi, *internodio supremo* longissimo, inferne plerumque ramosi, ramis brevibus. *Folia* 1-4 lineas lata, plana, 3-8 pollices longa, mollia, nervoso-striata, acuta, nervo intermedio dorsali sicuti in vaginis albedo. *Vaginae* cylindraceae, nervoso-striatae, *suprema* paululum inflato-ventricosa. *Ligula* obtusa. *Panicula* spiciformis, densa, aut albida aut ex albedo rufescens, pollicaris-sesquipollucaris, teres, vel ovata, vel ex ovato-oblongo-cylindracea, pilosissima, *aristis* pilos superantiibus donata. *Pedunculi*

perbreves, nonnulli vix manifesti. *Spiculae* oblongae, compressiusculae. *Gluma calycina* valvulis planis, membranaceis, extus villosis, nervis 2 viridibus praeditis, utraque aristæ capillari, plumosa-villosa, apice nuda, altera paulo brevior, armata. *Gluma corollacea* calycina brevior; *valvula* exteriore ventricosa, pallide viridi, glabra, dorso plano, lateribus nervosis, nervis viridibus, acuta, triariata, aristis nudis; *intermedia* paululum supra medium dorso inserta, longissima, geniculata, laterilibus terminalibus, ex nervis lateralibus prodeuntibus, intermedia brevioribus: *Valvula* interiore membranacea, plana, marginibus replicatis, apice inciso, valvula exteriore angustiore. *Antheræ* prismaticæ, pallide flavæ. *Semen* hinc convexum, inde sulcatum, glabrum, et nervo medio elevato notatum, spadiceum.

Flor. Therm. — *Fruct.* *Matur.* *Fruct.* — *Vend.*

β. Jul. — β. Sept. β. Aug. — β. Oct.

Habit. in campis arenosis, pratis, depressis, maritimis, et ad stagna, *Gall.* meridionalis, præcipueque maritima.

AD TAB. XVI.

XV. *Andropogum.* Barbon, Bartgras.
(*Ischaemum*, *Phoenix*. Hall, Gramen.
Tourn.)

Linn. ed, Gil, 2, p. 194. Vent, 2, 101. Roy, lugdb.
52. Jacq, fl. aust. 4. t. 384. Moench. meth. 180.

Gluma calycina uniflora, oblonga, obtusa, mutica, bivalvis, basi lata tenuissima bipartita, ad spiculas masculas plerumque carente, cincta; *valvula* inaequalibus, exteriore concaviore, interiorem

angustiorem, tenuiorēm amplectente. *Gluma corollacea* bivalvis interdum univalvis calycina tenuior et minor; *valvulis* inaequalibus, *exteriore* majore. *Arista*, receptaculo inserta, longa, tortilis, capillaris, incurva, spiculis masculinis carens. *Organā utriusque sēxūs in spiculis sessili bus praesentia.* *Filamenta* nempe tria, capillaria, longitudine valvularum corollacearum, *Antheris* oblongis, bifurcatis, *incubentibus*; *Ovarium* oblongum, stylis 2 capillaribus, coalitis, *stigmatibusque* villosis. *In spiculis vero pedicellatis Filamenta* (secund. Scopoli. 2.) et *Antherae* uti in hermaphroditis, *Pistillum* autem carens, aut rudimentum ejus. *Gluma corollacea ac calycina* in hermaphroditis semen includens. *Semen* unicum, oblongum, tectum, aristatum.

Panicula aut spicato-digitata, aut spiciformis laxa simplex, polygamico-monoica.

1. *Andropogum Gryllus.* Barbon paniculé.
Rispen - Bartgras. ***

Andropogon Gryllus, paniculae pedunculis simplissimis trifloris, flosculo hermaphroditio aristato, ciliato, basi barbato. Linn. ed. Reich. 4. p. 299. ed. Gil. 4. p. 567. Amoen. ac. 4. p. 332. s. v. ed. Pers. 944. Gouan. hort. 513. flor. 131. Scopoli. I. p. 273. Delarbre. 26. Oestr. fl. I. 55.

panicntalum. Lamarek. 1194. I.

Aegilops bromoides juba purpurascente. Scheuchz. agr. p. 267. t. 6. f. 3. Bauh. hist. 2. p. 436.

Phoenix spica laxa locustis longe petiolatis, quadri-floris, duobus floribus sessilibus, duobus petiolatis. Hall. helv. n. 1412.

Festuca dumetorum, utriculis lanugine flavescentsibus, *Aegilops* *Dioscoridis*. C. Bauh. theatr. 149. ic. (non vero Ros seorsim pictus secundum Hall.)

Gramen sparteum festucaceum, s. *Aegilops spartea villosa*. Barr. ic. 18. f. 2.
avenaceum locustis purpurascensibus, longissimis, pedicellis donatis. Seg. t. I. p. 355.

*Culm*us articulatus, foliatus, 2-3 pedalis, nodis 4 instructus. *Folia* laeviter villosa, 1-2 lineas lata, 3-5 pollices longa. *Panicula* fere semipedalis, nodis e fusco-rubris circiter 7. donata, plus minusve laxa, rubicunda. *Pedunculi* 1-3 pollices longi, scabri, teneri, flexuosi, apicem versus incrassati, inferiores circiter deni. *Spiculae* aetate violaceo-rubrae, nitidulae, sese contingentes, in pedunculis singulis plerumque tres. *Spicula media hermaprodita*, crassior, sessilis, 3 lineas longa, in oppositis lateribus sulcata, basi villis brevibus circumdata. *Gluma calycina valvulis* inaequalibus, altera mutica, denticulisque lateralibus instructa, et supra medium aspera; altera huic aequali aristam villosam, basi crassiore tortilem, unciam et longiore, infractam, receptaculo ad basin valvulae corollaceae insertam fovente: *Glumae corollaceae valvula altera*, minore: *Filamentis* tribus, *Antheris ferrugineis*, subbifidis, *Ovario* glabro, basi attenuato, truncato, *Stylis* violaceis rectis instructae. *Spiculae masculae laterales*, 3½ lineam longae, basi pilis haud circumdatae, pedicellatae, pedicellis compressiusculis, 2 lineas longis (secundum Scopoli, diandrae): *Gluma calycina valvula exteriore* longa, aristata, interiore tenuiore mutica; *Gluma corollacea rubella*, *valvula exteriore* majore, apice piloso; interiore minore, acuminata.

118 ANDROPÖGUM. (ad Tab. XVI.)

Habit. in pratis Gall. in Dep. de l'Herault. —
Germ. in Caffidol. = Italia. Helvetia.

2. *Andropogum distachyum.* Barbon a double-
epis. Zweifingeriges rauhes Bartgras. ***

Andropogon hirtum, paniculae spicis conjugatis ca-
lytibus hirsutis. Linn. ed. Reich. 4. p. 303. ed. Gil. 4.

568. s. v. ed. Pers. 945.

distachium spicis binis terminalibus,
culmo indiviso. Linn. ed. R. 4.
382. ed. Gil. 4. 569. syst. veg.
ed. Pers. 944.

spicis geminis, locustis bifloris, folli-
culis alterne imiticis. Hall.
helv. n. 1415. (exc. syn.)

Festuca juncea folio, spica gemina. C. Bauh. pin.
9. prod. 19. theatr. 145.

Gramen dactylon spica gemina. Tourn. 521. Scheuchz.
agr. 95.

siculum, multiplice panicula, spicis
ab eodem exortu geminis.
Pluk. alm. 175. t. 92. f. 1.

bicornis s. distachyophoron. Boccon. sicc. 20.
Roy. lugd. 53. Lamarck. 1194. 3. Ger.
prov. 106. t. 3. f. 2. Delarbre. 26.

Radix perennis, fibrosa. *Culmus* circiter 2 pe-
dalis, articulatus, foliatus, non raro simplex, in-
terdum ramosus, ramis floriferis. *Folia* plana, gla-
bra, longa, firma, 2-3 lineas lata. *Panicula* spica-
to-digitata inferne saepe vagina folii tecta, rhathi-
bus 2, aequalibus, instructa, utraque $1\frac{1}{2}$ pollicem
longa, villosa, erectiuscula, paululum inclinata.
Spiculae alternatim geminae, paribus circiter denis,
laxae, rectae; altera inferior sessilis, her-
mafrodita, basi villis sericeis obvallata, aristata;

altera superior pedicellata, mascula. Pedicelli brevissimi, planiusculi, ad apicem latiores, villis tecti. Gluma calycina villosa, ciliata. Gluma corollacea valvula exteriore ciliata, obtusa, interiore glabra. Arista in spiculis hermaphroditis interna, longa, articulato-flexa, basi inserta.

Vår. hirtum L. culmo plerumque ramoso, gluma calycinae hirsutie longiore donatae.

Habit. in Gall. — in Dep. du Var; de Bouthes du Rhône; des Basses-Alpes, et de la Vaucluse.

3. Andropogum Ischaemum. Barbon vélu. (vulg. Pied de poule). Vielfingeriges rauhes Bartgras. **

Andropogon Ischaemum, spicis digitatis plurimis flosculis sessilibus, aristato muticoque, pedicellis lanatis. Linn. ed. Reich. 4. 305. ed. Gil. 4. 568. s.v. ed. Pers. 945. Mont. 500.

villosum. Lamarck. 1194. 4. spicis villosis septenis, locustis bifloris, folliculis alternis sessilibus. Hall. helv. n. 1414.

Ischaemum. Haller. goett. p. 42. spicis villosis. Sauv. 34. secundum. Tabernaem. ic. 222. Krtbch.

534.

panicula digitata, spiculis oppositis distinctisve, florum serie duplci, culmo tereti. Guett. stamp. 187. Dalib. par. 288.

Gramen dactylon villosum, ramosum altissimum gallo-provinciale. Tourn. 523. angustifolium spicis villosis. Tourn. 520. C. Bauh. pin. p. 8. theatr.

116. Magnol. bot. 114. hort.

90. Mapp. 132. Buxb. hall.

p. 149. Rupp. jen. p. 308.

Scheuchz. agr. p. 94. t. 2. f. 11.

spicarum aristis geniculatis. Barrel.

sic. 753. 1753. 1753.

digitatum hirsutum. J. Bauh. h. 2. p. 445.

Raj. h. 2. p. 1273. 1273.

Schreber. spic. p. 46. Graes. 2. p. 66. T. 33.

Gouan. hort. 513. fl. 131. Hoffm. 32. Roth. I. 430. 3.

546. Poli. 2. 651. Hopp. ger. p. 184. Fl. d. Wetter.

I. 82. Reich. frc. 2. 112. Nekker. gallob. 414. Scop.

I. 274. Kniph. cent. 12. n. 9. Leyss. hal. n. 1006.

Schrank. I. 311. Dietr. 3. 237. Jacq. fl. austr. 4. 43.

t. 384. vind. p. 177. Fork. aeg. c. 8. p. 219. Panz. 12.

759. Delarb. 26. oestr. flor. I. 55. Wibel. w.p. 124.

Radix perennis, repens, geniculata, fibrosa.

Culmi plures, erecti, albidi, basi geniculato-incurvi, laevissimi, nitidi, glaberrimi, saepe rubro-punctati, plerumque ramosi, ramis paniculiferis, 1-3 pedales, teretes, uno latere (except. prope Panicul.) plano-sulcato, nodis purpureis 6-9 donati, internodio summo, (*brevissimo* sec. Pollich. verisim. autem laps. scriptorius.) longissimo. *Folia* pubescentia, pilis longioribus intermixtis, carina dorsali et margine scaberrima, ex viridi glauca, raro purpureo-maculata, lineam dimidiam — 2 lata; *inferiora* barbata 12-14 pollices longa; *superiora* sensim minora; *summum* plerumque 1-2 pollices longum; *omnia* striata, basi tūrinque plicato-auriculata. *Vaginae* glabrae, laeves, striatae, superne laxae, ad apicem cartilagineo-flavae. *Ligulam* brevissimam, albam, obtusam, villosam aut ciliatam dictam, nunquam vidi, *pilos* vero breves loco Ligulae, saepe conglutinatos observavi. *Panicula* digitato-spicata, villosa, aristata, rubicundo-albida. *Rhachis* com-

munis (s. culmus inter ramos) compressa, lateribus oppositis plano-sulcatis, angulis oppositis obtusis, nuda, ramis s. pedunculis 3-10, aut alternis, aut inferioribus oppositis, superioribusque alternis, ad basin nudis, inter spiculas bifariam villosis, linearibus, et (uti rhachis communis) compressis, 1-2 $\frac{1}{2}$ pollicem longis, inferne rhachi adpressis, versus apicem patentioribus. *Spiculae* per paria alterna, ramis distiche adfixae, lanceolatae, angustae, compressae, adpressae, in anthesi patentiores, 2-3 linea longae; in quovis pari altera mutica pedicello plano, bifariam piloso, sesquilineari insidente, *mascula*: altera sessilis, aristata, *hermaphrodita*. *Gluma calycina* (2) *valvula* exteriore pubescente aut villosa, ciliata, lanceolata, ex viridi-striata, purpurascente, apice albida paululum incisa, interiore eodem modo se habente, sed minus villosa, angustiore, paulo minore. *Gluma corollacea* aut univalvis, (certe in nostro Depart.: quamvis secundum observationes aliorum quoque bivalvis reperitur.) *valvula* angusta, diaphana, argentea, longitudine fere valvularum calycinorum. *Arista* in spiculis hermaphroditis ad basin ovarii inserta, inferne per lentem torta, in medio geniculata, recurva, spicula multo longior. *Antherae* violaceae. *Ovarium* oblongum. *Styli* glabri, albi. *Stigmata* plu-

(2) *Glumam calycinam bivalvem esse credo, corollaceam vero univalvem.* *Valvulae* 2 oppositae externae quoad structuram et colorem valde similes sunt; interna autem (*corollacea*) non solum tenerrima pellucidaque observatur, sed gibbus exiguus quoque ei oppositus (fortasse rudimentum valvulae alterius corollaceae) saepe invenitur.

mosa violacea. *Squamulae* ovatae. *Semen* glabrum, fuscum, nitidum, obverse lanceolatum, uno latere sulcato, compressisculum.

Flor. Mess. — Vend. *Matur.* Therm. — Frim. β. Jun. — β. Oct. — β. Jul. — β. Dec.

Habit. in apricis, collibus, sterilibus, siccis, ad vias, *Gall.* — prope Lutet. paris. et in Dep. du Var; des Bouches du Rhône; basses Alpes; de la Vaucluse; de l'Herault; de la Dyle; des deux Nethes; du Mont-tonnere — prope Moguntiam, inter Brezenheim et Jägerhaus, quoque circa Hechtsheim, potro circa Wörmat. Oppenh. Kl. Niedeshain, Heuchelheim, Lambsheim, — *Germ.* in Saxon. Wettetrau. Palatin. Bavar. Suec. Francón. Neom. Austr. Carn.

AD TAB. XVII.

XVI. *Sacharum. Sucre ou Canné.*
Zuckerrohr. (Gramen Tourn.)

Veinten. 2. 10. Linn. ed. Gil. 2. p. 19. Lami. tab. 45 Gärtnér. 2. II. t. 82 f. 2. Cavan. hisp. t. 292.

Gluma calycina bivalvis (in nonnullis huius generis, verisimiliter ex pluribus constantibus, speciebus non indigenis, perigynandum tantum unicum bivalve occurrit) uniflora: *valvulis* lanceolatis, ad basin *lanugine* longa cinctis. *Gluma corollacea univalvis*, *calycina* brevior; *valvula* oblonga, lanceolata, obtusa, concava, *arista* dorsali, torta, praedita. *Filamenta* 3, capillaria, longitudine glumae corollaceae. *Antherae* oblongiusculae. *Ovarium* oblongum. *Styli* 2 pennati. *Stigmata* plumosa. *Gluma corollacea* sēmen includens. *Semen* unicūm oblongum, angustum, acuminatum, exsulcum.

Spiculae panículatae.

Differt a *Calamagrosti*, *lanugine* extra *Glumam*

calycinam ab Andropogo verb, spiculis omnibus hermaphroditis et pedicellatis aristaque dorsali.

Sacharum Ravennae. Sucre de Ravenne. Ravennisches Zuckerrohr ***.

Sacharum Ravennae, panicula lata, rhachi lanata, floribus aristatis. Linn. ed. Reich. I. p. 147. Gil. 3. p. 64. s. vög. ed. Pers. 105. Lamarck. 1174. Lestib. 217. Bieberstein. bot. Anh. zur Beschr. der Länder zwischen dem Terek und Kur etc. p. 204.

Andropogon Ravennae. Linn. spec. p. 1481.

Arundo calycibus unifloris, extus lanuginosis. Ger, p. 105.

farcita, Alpium Ravennae. Zannon. hist. I. p. 64. t. 29. Mor. hist. 3. p. 221. s. 8. t. 8. f. 32. Ségular. ver. I. p. 361.

Gramen paniculatum arundinaceum ramosum panicula densa sericea. Touan. 523. arundinaceum ramosum plumosum album. C. Bauh. p. 7. pf. 14. theatr. 95.

Radicis perennis, repenis, fibrosa. Culmi caespitosi 1½ — 4 pedales, teretes, firmi, articulati, foliati, infra paniculam nudiusculi et non iaro rubelli. Folia 3 — 4 lineas lata, fere pedalia, arundinacea, acuminata, striata, marginé scabra, nervo dorsali albido, laete viridia, versus basini pilosa. Panicula elongata, contracta, densiuscula, ramosa, 6 — 8 pollices longa, nitida, sericea, junior fere spiciformis, aetate patentior. Rhachis lanata. Pedunculi alterni, imbricati, subdivisi, lana candida longissima et molli vestiti. Spiculae parvae, lineares, alternae, approximatae, breviter pedicellatae. Glu-

ma calycina uniflora, bivalvis; *valvulis* oblongis, membranaceis, albis, dorso spadiceis, subaequalibus, muticis, totis lana eadem quia paniculae pedunculi et pedicelli obsitis. *Gluma corollacea* univalvis, *valvula* minima, albo-membranacea, submutica, aut dorso aristata, gluma calycina involuta. *Antherae* flavae, admodum fugaces. *Stigmata* purpurea, plumosa,

Flor. Praer. — Mess.

Jun. — Jul.

Habit. ad ripas rivulor. *Gall.* in Depart. du Var. de Bouches du Rhône, Basses Alpes, de la Vaucluse etc. —

AD TAB. XVIII.

XVII. Aira. Canche. Schmiele. (Gramen Tourn.)

Linn. ed. Gil. 2. 22. Venten. 2. 104. Lam. t. 44.
Flor. dan. t. 157. Gärtn. I. 4. t. 1. f. 7. Moench.
meth. 182

Gluma calycina biflora, raro pluriflora, aut uniflora, bivalvis, *valvulis* plerumque membranaceis, ovato-lanceolatis, acutis aut obtusis, plus minusve nitentibus, inaequalibus aut fere aequalibus. *Glumae corollacea* bivalves, *valvulis* calycinis similibus; exterior aristata (raro mutica). *Arista* certe ex basi, aut prope basin, nec manifeste ex dorso, nec ex apice proveniens. *Filamenta* tria capillaria, longitudine glumae corollacea. *Antherae* oblongae, utrinque furcatae. *Ovarium* ovatum. *Styli* duo setacei, patentes. *Stigmata* pubescentia. *Gluma corollacea* semini adnascitur. *Semen* subovatum tectum, hinc sulcatum.

Panicula laxa aut contracta. (*Differt ab Avena*, praeceps a speciebus bifloris, *Arista* ex basi, nec

ex dorso proveniente: et a *Poa spiculis* manifeste aristatis.)

1. *Aira caespitosa*. Canche élevée. Rasen-schmiele. *

1566.

Aira caespitosa, foliis planis, panicula patente, petalis basi villosis aristatisque, arista recta brevi. Linn. ed. Reich. I. 178. ed. Gil. 3. 81. s. v. ed. Pers. 115. fl. s. v. 60. 70.

altissima. Lamarck. 1167. Lestib. 219. Moench. meth. 582.

panicula patentissima, flosculis subaristatis sessilibus, basi villosis, foliis planis. Act. Holm. 1742. p. 30.

longissima tenui. Fl. lapp. 50.

Avena diantha, panicula amplissima, patula breviore. Hall. helv. n. 1487.

Gramen agrorum latiore arundinacea ramosa panicula. Mor. h. 3. s. 8. t. 5. f. 17. miliaceum majus, nutante panicula arundinacea. Barr. ic. 754.

segetum, panicula arundinacea. Scheuchz. agr. p. 244. t. 5. f. 23. Rupp. jen. p. 315. Dill. giefs. p. 111. Hall. goett. p. 49.

pratense paniculatum altissimum, locustis parvis splendentibus, non aristatis. Tourn. 524. Vaill. par. 86. Rupp. jen. p. 318.

Nekker gallob. p. 47. Jacq. vind. p. 14. Gmel. tub. p. 20. Goüan. h. 41. fl. 121. Wigg. prim. p. 7. Schrank. I. 328 Leyfs. hal. n. 76. Sauv. 36. Willden. pr. n. 146. Fl. d. Wetter. I. p. 98. Roth. I. p. 36. 2. p. 97. 3. p. 565. Hoffm. 58. et icon. Zinn. goett. p. 63.

Weig. pom. p. 53. Scop. I. p. 65. Plan. erf. p. 54. Poll. I. 74. Moench. hass. n. 63. Leers. 23. t. 4. f. 8. Oeder. t. 240. Gmelin. sib. I. p. 95. Dietr. I. 95. Wilke gryph. n. 43. Boehm. lips. n. 615. Matuschek I. 50. Murr. prodri. p. 41. Reichl. 15. Grimm. is. p. 263 emend. p. 120. Doerr. nass. p. 2. Reyg. gedan. I. p. 39. Berg. frc. p. 34. Scholl. barb. n. 62. Panz. 12. 307. Delarbre 10. Oestr. fl. I. 56. Vibel. w. 118. Krock. sil. I. 119.

Radix perennis, nigricans, valde fibrosa. Culmi erecti, superne teretes, inferne semiteretes, glabri, laeviter striati, nodis 2-3 purpureis donati, 2-4 pedales, raro humanae longitudinis, stricti. Folia 1-2 lineas lata, 1-6 pollices longa, plana, subtus laevia, superne profunde striata, fere 7 sulcata et scaberrima, siccata subconvoluta, acuminata, crassiuncula, laete viridiata, (radicalia culmeis saepe angustiora). Vaginae striatae, glabrae, laeves. Ligulae oblongae, obtusae, integrae, suprema bisida. Panicula amplissima, speciosa, patens, palmaris, pedalis, raro ultra-pedalis, ex argenteo et viridi-subfuscata, non saepe violacea. Rhachis communis semi-tertes, scabriuscula, ad genicula gibba. Pedunculi 6-8 in semiverticillis alternis, ad basin saepe in nodulum coaliti, apice antrorsum nutantes, cum pedicellis scabri, Spiculae numerosae, splendentes, laeves, lanceolatae, 2 lineas fere longae, lineae quadrantem latae. Gluma calycina valvulis inaequalibus, dorso (armato oculo) versus apicem scabriusculis. Glumae corallaceae 2, valvulis apice inciso dentato. Gluma coroll. inferior basi nuda; superior minor, pedicellata, basi pilosa, pedicello in maturitate elongato, calycem excedente (confer quoad pedicell. Poam airoid.). Valvula corallacea exterior calycinis brevior, 3-5 nervia, apice obtusa 3-5 fida. Arista e basi valvulae exterioris corallacea,

recta, lineam longa, vix extra glumam corollaccam manifesta. *Squamulae* duae, ovatae. *Antherae* purpurascentes. *Stigmata* alba plumosa.

Var. 1. Spiculis trifloris, supremo sterili. (prope Mogunt. in pratis).

2. Arista unius aut alterius glumiae carente.

Flor. Praer. — Therm. *Matur.* Therm. — Vend. ♂ Maj. — ♂ Aug. ♂ Jul. — ♂ Oct.

Habit. in pratis, agris, fossis, depressis, sylvis, umbrosis, alpibus, ad paludes, t. f. *Gall.* et *Germ.* — in Dep. Montis Jovis prope Lautern, Moguntiacum, in sylva circa Jägerhaus, den Bleichwiesen, circa Nakkenheim, und auf der Jungenthaler Aue. — Inveni quoque in sylva Niederwald Rhenogaviae.

2. Aira caryophyllea. Canche oeilletté. Nelkenschmiele. 1568.

Aira caryophyllea foliis setaceis, panicula divaricata, floribus aristatis distantibus. Linn. ed. Reich. I. 180.

ed Gil. 3. §3. s. v. ed. Pers. 115. foliis setaceis, vaginis glabris sulcatis, panicula divaricata, aristis calycem superantibus. Roth.

I. p. 37. 2. 100. foliis subulatis, aristis e basi floscularum tortilibus, floreulo altero, pedunculato. Roy. lugdb. 62. Sauv. 36. Dalib. par. 26.

Avena caryophyllea, panicula divaricata, calycibus billoris, aristis subulatis. Wigg. prim. p. 10.

diantha, foliis setaceis, panicula divaricata. Hall. helv. n. 1482.

Caryophyllus arvensis, glaber, minimus. C. Bauli.
pin. p. 210. prodr. p. 105. Magnol. bot. 54.

Gramen paniculatum minimum molle. Tourn. 522.

Scheuchz. agr. p. 215. t. 4. f. 15.

Buxb. hal. p. 144. Magnol. bot.

296. hort. 91. Rupp. jen. p. 312.

Hall. goett. p. 47.

locustis purpureo-argenteis, annuum. Roy. angl. 3. p. 407. Mor. hist. 3. p. 200. s. 8. t. 5. f. 11.

avenaceum glabrum, panicula purpureo-argentea splendente minus, et annuum. Dill. giess. p. 70.

phalaroides sparsa panicula, minimum angustifolium. Barr. rar. 1218. t. 44. f. 1.

Lamarck. 1176. 7. Nekker. p. 42. Hoffm. 39.

Plan. erf. p. 54. Poll. 1. 77. Moench. m. 183. Oeder.

t. 382. Curt. Lond. 6. n. 65. Reyg. gedan. 1. p. 40. n.

4. Willden. prodr. n. 149. Goiani. hort. 42. Flor. 121.

Weber. spil. p. 3. Flor. d. Wett. 1. 101. Reich. frc. 2.

167. Schreb. spic. p. 50. Scholl. barb. suppl. n. 1023.

Schrank. 1. 333. Leyss. hal. n. 80. Stillingfl. misc. t.

5. Lestib. 219. Gmelin. tub. p. 20. Leers. 24. t. 5.

f. 1. Dietr. 1. 95. Panz. lin. 12. 315. Dicks. h. s. 4. 5.

Delarbre. 11. Oestr. fl. 1. 57. Wibel. w. 119. Krock.

1. 125. t. 22.

Tota planta ex glauco, et viridi-argentea.

Radix annua, fibrosa, alba. *Culmus* plerumque digitalis-palmaris, raro pedalis, erectus, glaber, scabriusculus, filiformis, aut setaceus, nodis purpureis 2-3. *Folia* semiteretia, canaliculata, lineas 6 — 2 pollices longa, glauco-viridia aut rubella, saepe emarginata, scabriuscula, *inferiora* caespitosa et culmeis breviora. *Vaginae* glabrae, ex striato-sulcatae, summa

summa subventricosa, longissima. *Ligulae* ultra lineam longae, tenuissime incisae, acuminatae. *Panicula* respectu plantae magna, maxima divaricata, ramosissima, junior contracta. *Pedunculi* spadicei, capillares, plerumque 2 — 3 in semiverticillis alternis, inferiores raro solitarii, saepe (non semper) trichotomi. *Spiculae* ovatae, mucronatae, ad basin purpurascentes, versus apicem ex viridi-candicantes, splendentes, vix lineam longae, lineae quadrantem latae. *Gluma calycina* corollaceis major. *Glumae corollaceae* 2, exiguae, fere aequales, paullulum divergentes, sessiles, basi pubescentes: *valvula* exteriore basi *arista* incurva, gluma corollacea duplo longiore, praedita. *Antherae* exiguae, flavae. *Stigmata* alba.

Flor. Flor. — *Mess.* Matur. *Mess.* — *Fruct.*

β. Apr. — β. Jun. — β. Jun. — β. Sept.

Habit. in campis arenosis, siccis, ad margines agrorum et sylvarum tot. fere *Gall.* et *Germ.* — in nostr. Depart. circa Lautern, Rotenbach, Schopp, Spiram, Oggersheim, Moguntiacum im Sänd.

4. *Aira flexuosa*. Canche flexueuse. Ge- schlängelte Schmiele. *

Aira flexuosa, foliis setaceis, culmis subnudis panicula divaricata, pedunculis flexuosis. Linn. ed. Reich. 1. 179. ed. Gil. 3. 81. s. v. ed. Pers. 115. fl. suec. 64. 71. *montana*. var. Lamarck. 1176. 6. *panicula* rara, calycibus albis. *Flor.* lapp. 28. Sauv. 36.

Avena montana. var. β adultior. Wigg. prim. p. 9. *diantha*. etc. (qua variet. Air. mont. L. hab.) Hall. helv. 1486.

Gramen avenaceum, capillaceo folio, panicula am-

pliore, locustis splendentibus.
 Tourn. 525. ^{l. 1. 1. 1. 1. 1. 1.}
nemorosum, paniculis albis, capillaceo folio.
 C. Benth. p. 7. prod. p. 14.
 Moris. h. 3. p. 300. s. 8. t. 7. f. 9.
alpinum nemorosum, pani ulatum, foliis
 angustissimis, locustis splen-
 dentibus. Scheuchz. agr. p. 248.
 t. 4. f. 16. prod. t. 6.
 Roth. I. 35. 2. 96. Dalib. par. 26. Hoffm. 39.
 Schreber. spic. p. 50. Gräss. 2. 57. t. 30. Gmelin.
 tub. p. 20. Poll. I. 74. Leers. 24. t. 5. f. 1. Grimm.
 isen. p. 263. Reyg. gedan. 2. p. 39. Dietr. I. 95.
 Weig. pom. n. 54. Goian. h. 42. flor. 121. Scholl.
 barb. n. 63. Fl. d. Welt. I. 99. Reich. fr. 2. 167.
 Leyss. hal. n. 77. Nekker. gallob. p. 47. Schrank.
 I. 336. Oeder. t. 157. Matuschk. L. 50. Panz. 12.
 309. Moench. hass. n. 64. meth. 182. Delarbre. II.
 Oestr. fl. I. 57. Wibel. w. 118. Krock. sil. I. 120.

Radix perennis, fibrosa, alba, interdum stolo-
 nifera. *Culmus* 1 — 3 pedalis, nodis plerumque
 2, raro 3 purpureis praeditus, tenuis, debilis, ad
 magnam partem nudus, saepe rubellus, et inferne
 incurvus. *Folia* setacea, pauca, glabra, scabra, an-
 gulata, rigidiuscula, saepe emarginata, in superiore
 pagina canaliculata (sec. Linn. in prael. in ord. nat.
 pl. p. 147, et Schrank. l. c. *convoluta*? An diver-
 sare species aut varietates?) ex glauco- aut rubello-
 viridia, 3—8 pollices longa. *Vaginae* rufescentes,
 subscabrate, glabrae, striatae, in dorso paululum
 carinatae. *Ligulae* 2 lineas fere longae, ovatae, ob-
 tuseae, bifidae. *Panicula* laxissima, valde divaricata,
 lata, subrotunda, pauciflora, digitalis, palmaris,
 junior contracta. *Rhachis* tenuis. *Pedunculi* et *Pe-
 dicelli* capillares, longi, flexuosi. *Spiculae* argen-
 teae, splendentes, basi non raro purpurascentes aut

subfuscae, ovato-lanceolatae, 2 — fere 3 lineas longae, lineam dimidiam latae. *Gluma calycina valvulis* inaequalibus, altera glumis corollaceis plurumque longiore. *Glumae corollaceae* 2, albidae, basi pilosae; superior brevissime pedicellata: *valvulis* subaequalibus, exteriore paulo supra basin aristata, recta, in medio geniculata, reflexa, tortili, spicula longiore, praedita. *Antherae* purpurascentes, aetate fuscae. *Stigmata* alba plumosa.

Flor. Flor. — Therm. Matur. Mess. — Fruct.

β. Apr. — β. Aug. β. Jun. — β. Sept.

Habit. in montosis, sylvaticis, ericetis, rupibus: tot. fere Gall. et Germ. — in Depart. nostro prope Lautern; in monte Jovis; prope Bingen in sylva montana über der Nahe. — plantam quoque in sylva Niederwald in Rhenogavia, et in montibus Feldberg et Altkoenig, prope Koenigstein, inveni.

4. *Aira montana*. Canche des montagnes.
Berg-Schmiele. **

Aira montana foliis setaceis, panicula angustata, flosculis, basi pilosis, aristatis, arista tortili longiore. Linn. ed. Reich. I. 179. ed. Gil. 3. 81. Flor. suec. 68. 72. s. v. ed. Pers. 115.

paniculata rara, calycibus fuscis. Flor. lapp. 49.
Sauv. 36.

Avena nro. 2. Reyg. ged. I. p. 46. 2. p. 38.

montana. Wigg. prim. p. 9.

diantha, paniculis flexuosis, floribus basi villosis, locustis ovatis. Hall. helv. 1486.

Gramen avenaceum capillaceum, minoribus Glumis,

C. Bauh. p. p. 10. Tourn. 524.

Mapp. 138. Hall. goett. p. 47.

Rupp. jen. p. 317. Raj. p. 1288.
paniculatum alpinum foliis ca-

pillaceis brevibus, locustis
purpureo-argenteis, et aristatis. Scheuchz. agr. p. 216.
t. 4. f. 16. app. t. 4. Mont. prodr. ic. 74.

Lamarck. 1176. 6. Murr. prodr. p. 41. Zinn.
goett. p. 63. Weig. pom. n. 35. Huds. angl. 30.
Roth. I. 36. 2. 98. Goüan. h. 41. fl. 121. Stilling.
fl. gram. t. 4. Schrank. I. 329. Jacq. vind. p. 14.
Matuschk. I. 51. Moench. hass. n. 65. Krock. I. 122.
Hoffm. 38. Lestib. 219. Delarbre. 10. Oestr. fl. I. 57.

Diffr. a *flexuosa*, (cujus verisimiliter varietas
aut planta junior est):

Panicula magis contracta, longiore et pluriflora.
Pedunculis rectis aut subflexuosis, semiverticaliter
erectis, (post anthesin vero pedunculi patentiores,
minime vero perfecte patentes sunt) longioribus.
Spiculis longioribus, (?) magis coloratis, fuscori-
bus, *glumis corollaceis* basi pilosioribus, *arista* lon-
giore, interdum nigrescente.

Flor. Praer. — *Therm.* Matur. Therm. — Fruct.
β Mai. — β Aug. — β Jul. — β Sept.

Habit. in pratis udis, montosis, sylvaticis,
subalpinis. *Gall.* — in Dep. du haut et du bas-
Rhin; de l'Hérault; du Puy du Dome; des Bouches
du Rhône; du Var; Basses-Alpes; de la Vaucluse.
— *Germ.* in Harcyn. Hass. Siles. Austr. Bavar. Wett-
terau, in Monte Feldberg.

5. Aira praecox. Canche précocé. Frühe Schmiele. *

Aira praecox foliis setaceis, vaginis angulatis, flori-
bus paniculato - spicatis, flosculis
basi aristatis. Linn. ed. Reich. I
180. ed. Gil. 3. 82. s. veg. ed. Pers
115. it. Scan. 226. fl. s. v. 2. 75.

*foliis setaceis, vaginis glabris, sulcato-
angulatis, floribus paniculato-spica-
tis, aristis calycem superantibus.*
Roth. I. 30. 2. 99. Beitr. 2. p. 154.
n. 39.

Avena pusilla, panicula contracta, calycibus biflo-
ris, aristis subulatis. Wigg. prim. p. 9.
Gramen minimum spica brevi habitore nostrum.
Scheuchz. agr. p. 219. Rupp. jen.
p. 306.

parvum praecox spica laxa canescente. Raj.
syn. 3. p. 407. t. 22. f. 2. Pluk.
alm. 177. t. 32. f. 9.

Lamarck. 1176. 10. Curt. Lond. 2. n. 25. Dicks.
h. s. 4. 4. Oeder. t. 383. Schrank. I. 382. Gmelin.
tub. p. 20. Dietr. I. 96. Timm. prodr. n. 630. Fl.
d. Wett. I. 101. Leyss. hal. n. 79. Poll. I. 76.
Hoffm. 39. Willden. n. 148. Nekker gallob. p. 42.
Moench. m. 183. Panz. 12. 314. Weber. spic. p. 3.
Krocker. sil. I. 126. Delarbre. II. Oestr. fl. I. 57.
Wibel. w. 119.

*Radix annua, fibrosa, alba. Culmi erecti, fili-
formes, debiles, caespitosi, 2 — 6 pollices longi,
nodis 2 — 3 purpurascens instructi, supra me-
dium aphylli, inferne non raro ramosi. Folia 3 — 8
lineas longa, glabra, ex glauco-viridia, interdum
rubella, striata, scabriuscula, erecta, setacea, su-
perne canaliculata, acuminata. Vaginae glabrae,
striatae, sulcato-angulatae, superior paululum in-
flato-ventricosa. Ligulae parvae, ovatae, incisae.
Panicula fere cylindrica, spiciformis, 6 — 12 lineas
longa, ante et post florescentiam contracta, florens
laxior; pauciflora ex viridi-albida, interdum pur-
purascens, aetate canescens. — Pedunculi 2 — 3 in
semiverticillis alternis, fere adpressi. Spiculae li-
neam longae, dimidiam latae, ovato-obtusae, splen-*

dentes. *Gluma calycina valvulis lanceolatis, glumis corollaceis longioribus. Glumae corollaceae 2, exiguæ, basi pubescentes, valvula exteriore, aristata, e basi veniente, spicula duplo fere longiore, capillari, tereti, paululum incurva praedita. Antherae flavae. Stigmata alba plumosa.*

Flor. Flor. — Mess. Matur. Mess. — Fruct.

β Apr. — β Jul. β Juni — β Sept.

Habit. in depressis et elatis, campis arenosis, arvis, pascuis, siccis et humidis. t. fere Gall. et Germ. — in nostr. Dep. circa Lautern, Reichenbach et Weilerbach.

6. *Aira canescens. Canche blanchâtre. Graue Schmiele.* *

Aira canescens, foliis setaceis, summo spathaceo, paniculam inferne obvolvente. Linn. ed. Reich. I. 180. Ed. Gil. 3. 82. s. veg. ed. Pers. 115. fl. s. v. 73. 74.

foliis setaceis, vaginis scabris, floribus paniculatis, aristis calycem non excedentibus. Roth. I. p. 36. 2. 99. Beitr. 2. p. 153. n. 38.

foliis setaceis, arista a basi glumarum calycem aequante. Hort. cl. 495. n. 111.

Avena canescens, panicula stricta, calycibus bifloris, aristis clavatis. Wigg. prim. p. 9.

diantha, foliis setaceis, panicula stricta, aristis clavatis. Häll. helv. 1483.

Gramen sparteum variegatum. C. Bauh. pin. p. 5.

foliis oblongis, radice alba. C. B. l. c. Scheuchz. agr. p. 242. Moris hist.

3. s. 8. t. 3. f. 10.

junceis radice jubata. C. B. l. c.

Scheuchz. l. c. p. 243.

Flor. dan. t. 1023. Lamarck. 1176. 9. Dalib. pár. 35. Leyss. hal. n. 78. Pollich. I. 75. Schk. t. 12. Dick. dr. pl. 1-4. Panz. 12. 313. Wilcke gryph. n. 44. Goiani. h. 41. fl. 121. Schrank. I. 331. Willden. pr. n. 44. Gaertn. I. 4. t. I. f. 7. Sauv. 36. Moench. m. 182. Hoffm. 39. Scholl. barb. n. 64. Raj. lugdb. 60. Oestr. fl. I. 57. Weig. pom. n. 56. Reyg. ged. I. p. 39. n. 3. Reich. 2. 167. Dietr. I. 95. Krock. I. 124. Lestib. 219. Timm. prodr. n. 631. Willich. in N. E. N. C. 4. p. 105. Weber. spic. p. 3. Matuschk. I. 52. Delarbre. 10.

Radix perennis, fibrosa, alba. *Culmi* caespitosi, filiformes, erecti, raro decumbentes, plerumque inferne paululum incurvi, palmares-pedales, ex glauco-virides, interdum rubelli, foliis usque ad paniculam plerumque tecti, aut parum nudi (própe Moguntiam), nodis 3-4 purpurascens. *Folia* caespitosa, setacea, glabra, mucronata, scabriuscula, rigidiuscula, 5-18 lineas longa, superne canaliculata, ex glauco-viridia, interdum rubella. *Vaginae* scabrae, glabrae, superiores valde inflato-ventricosae, marginibus subfuscis. *Ligulae* parvae obtusiusculae. *Panicula* 1-2 pollices longa, ante et post anthesin contracta, lanceolata, florens patenior, viridis aut ex albido-rubella, initio florescentiae saepe inferne vagina supra tecta. *Spiculae* compressae vix ultra lineam longae, lineam dimidiata latae, lanceolatae, acutae, glauco-virides, aut paululum rubellae. *Rhachis* paululum saepe flexuosa. *Pedunculi* 2-3 in semiverticillis alternis, ramosi, interdum ad basin globulo pellucido nitente praediti. *Gluma calycina* valvulis subaequalibus, lanceolatis, obtusiusculis, corollaceis longioribus. *Glumae* corollaceae 2, glabrae, aut basi vix pubescentes, *valvula* exteriore basi *arista* infra medium setacea, in medio globulo albo, per lentem pubescente, prae-

dita, supra medium candida, tenuiore, et armato oculo setaceo-clavata, spicula non longiore, donata. *Antherae nigrescentes. Stigmata alba plumosa.*

Var. Culmo superne nudo, vagina summa vix subinflata (prope Moguntiacum in arenosis siccis).

Flor. Praer. — Fruct. *Matur.* Fruct. — Brum. β. Maj. — β. Sept. β Aug. — β. Nov.

Habit. in arvis, arenosis, ericetis, sterilibus tot. fere *Gall.* et *German.* — in Depart. Montis Iovis, circa Lautern, Durckheim, prope Moguntiacum circa paludem Bruch im Sande.

AD TAB. XIX.

XVIII. Melica. Melique. Perlgras. (Gramen Tourn.)

Linn. ed. Gil. 2. 22. Venten. 2. 104. 4. t. 3. f. 3.
Lam. t. 44. Cavan. hisp. t. 175. Gaertn. 2. 5. t. 80.
f. 4. Moench. meth. 172.

Gluma calycina biflora, interdum uniflora, bivalvis: *valvulis* membranaceis, aridis, saepe coloratis, ovatis, concavis, interdum acutis, aut subaequalibus, aut inaequalibus. *Glumae corollaceae hermaphroditae* plerumque 2, interdum unica, bivalves; *valvulis* inaequalibus, ovatis, ventricosis, exteriore concava, interiore plana, minore. *Rudimentum* *glumae corollaceae* sterilis, neutrius, semicicum, raro et alterum, *valvulis* pellucidis, in corpusculum conico-truncatum pedicellatumque convolutis. Interdum *squamula* orbicularis, horizontalis, carnosa, ovarium ambiens, aut *squamulæ* 2 subrotundæ, obtusæ, minimæ observantur. *Filamenta* 3, capillaria, basi latiora et inter se coalita, longitudine *glumae corollaceae*. *Antheræ oblongæ* utrin-

que bifurcatae, aut ovales. *Ovarium* ovato-turbinate. *Styli* 2, basi nudi, setacei, patentes. *Stigmata* oblonga plumosa. *Gluma corollacea* semen includens et demittens. *Semen* incrustatum, ovatum, nitidum, hinc sulcatum.

Panicula plus minusve spiciformis, aut *racemus*.

1. *Melica ciliata*. Melique ciliée. Gewimpertes Perlgras. **

Melica ciliata, flosculi inferiores petalo exteriore ciliato. Linn. ed. Reich. I. 181. ed.

Gil. 3. 83. s. v. ed. Pers. 115. fl. sv.

56. 77.

floribus horizontaliter patentibus. Roy. lugdb. 57.

Arundo locustis bifloris spicatis, gluma florali exteriore ciliato. Hall. helv. n. 1517.

Gramen avenaceum. Tabern. ic. 207. Krb. 519.

lanuginosum, spicis rarioribus. C. Bauh. pin. 157. prodr.

72. Magn. bot. 122. hort. 93.

spica simplici, locustis densissimis candicantibus et lanuginosis. Scheuchz. agr. p. 174.

t. 3. f. 16. Tourn. 524. Mapp. 138.

montanum lanuginosum. C. Bauh. pin. p. 10. prodr. p. 20. Magnol.

bot. p. 122. Mapp. 137. Buxb. hal. p. 142. Rupp. jen. p. 316.

Hall. goett. 45.

montanum, avenae semine. Clus. pann. 717.

718. hist. p. 215.

Lamarck. 1177. I. Schrank. I. 333. Grimm. isen.

p. 263. Goiian. hort. 43. fl. 121. Roth. I. 37. 2. 101.

Boehm. lips. n. 613. Sauv. 35. Hoffm. 40. Leyss.

hal. n. 81. Jacq. vind. p. 15. Moench. 173. Gmelin. sib. I. p. 99. t. 19. f. 1. Dietr. I. 96. Gmelin. tub. p. 21. Scop. I. 67. Berg. frc. p. 319. Panz. lin. 12. 316. Nonne erf. p. 276. Plan. erf. p. 54. Delarbre. 131. Krock. sil. I. 128. t. 23. Wibel. w. 117. Oestr. fl. I. 57.

Radix perennis, fibrosa, alba. *Culmi* teretes, aut uno altero ve angulo obsoleto vixque manifesto, 1-3 pedales, erecti, stricti, glabri, striati, tenues, ad magnam partem nudi, laeves, iufra paniculam vero scabriusculi, nodis 2-4 purpureis inferioribusque et 2-3 vix manifestis, obliquis, viridibus superioribus, aut melius vestigiis insertionum foliorum donati. *Folia* pauca, 1-3 lineas lata, 1-12 pollices longa, plana, striata, siccata vero convoluta, mucronata, pagina superiore pubescentia et, uti *Vagini* striata, sursum scabra. *Ligulae* oblongae, obtusae, integerrimae. *Panicula* aut straminea, aut ex albido-grisea, raro rubella, contracta, spiciformis fere cylindrica, erecta, 1-4 pollices longa, 4 lineas lata, aetate villosa, inferne interdum interrupta. *Spiculae* ex ovato-lanceolatae, acutae, brevissime pedicellatae, paululum splendentes, solitariae aut ita approximatae, ut fere fasciculatae sint, lineas 2- $2\frac{1}{2}$ longae, lineam vix latae, striatae, lateribus dor salibus compressiusculae. *Pedunculi* in semiverticillis alternes collecti, inaequales, majores 6-8 lineas vix longi, racemosi, adpressi. *Gluma calycina* valvulis acutis inaequalibus glabris, unifloris, interiori gluma corollacea longiore, exteriore basi latiore, gluma corollacea minore. *Gluma corollacea* fertilis unica, sessilis, valvulae calyc. interioris fere longitudine; *valvula* exteriore latiore, concava, dorso scabra, margine ciliato-pilosa, pilis sericeis albis, 2 lineas fere longis; *interiore* angustiore, glabra, plana, margine laeviter reflexo.

Rudimentum glumae corollaceae, ad latus planum glumae fertilis positum, pedicellatum, clavatum, obtusum, *valvula exteriore* amiculiformi, *corpusculum* involvens fere globosum quoque pedicellatum, quod *valvulis* 2 concavis, iterum aliud *corpusculum* exiguum, fere sphaericum, sessile includit. (In planta siccata hocce facilius videri potest.) *In fertili gluma Antherae albidae* aut subflavae, et *Stigmata* candida sunt. *Semen* nitidum, ferrugineum, ad apicem subsulcatum. *Squamulae* 2, rotundae.

- Var. 1.* Spiculis alternis, solitariis (Mogunt).
2. Biflora absque rudimento tertiae glumae.

Flor. Praer. — Therm. *Matur.* Messid. — Vend.
β. Mai. — *β. Aug.* *β. Jun.* — *β. Oct.*

Habit. in muris, rupibus, montosis glareosis, ad margines sylvarum. *Gall.* — in Dep. de l'Herault; du Rhône; Haut et Bas-Rhin, de la Loire; Bouches du Rhône; Mont-tonnerre etc. (prope Moguntiam in muris munimentorum inter portam Münster et Gauthor; ad parietes viae cavae prope Niederingelheim versus Moguntiam; circa Bingen, in monte S. Rochi; circa Lautern; Oppenheim; Dürckheim; Steinbach; Hartenburg; et in monte Jovis). — *Germ.* in Saxon. Thuring. Frcon. Wittenb. Siles. Austr. Bavar. Carniol. Brandenb. Nassau.

*2. Melica uniflora. Melique uniflore. Einblütiges-Perlgras. ****

Melica uniflora, panicula rara, calycibus bifloris, flosculo alterio hermaphrodito, altero neutro. Retz. obs. bot. f. I. p. 10. n. 9.

Poa panicula laxa, locustis nutantibus, dianthis,
altero flore imperfecto. Hall. helv.
 n. 1472. (excl. synon.)

Melica nutans. Goüan. h. 42. (ligulas indicat 3 li-
 neas longas coloratas, *nutanti ca-*
rentes).

Gramen avenaceum tenui spicataque panicula albis
utriculis. Barrel. var. 1231. ic. 96.
 f. 2. Schrank. (?)

Fl. Dan. t. 1499. Hoffm. 40. Timm. pr. p. 33.
 Schrank. 1. 334. Fl. d. Witt. I. 113. Curt. lond. 5. n.
 51. Roth. 2. 102. Moench. m. 173. Ellw. baruth.
 p. 7. s. veg. ed. Pers. sub *ciliata*. Wibel. w. 116.
 Oestr. fl. I. 58.

Radix perennis, fibrosa. Culmus simplex, fili-
formis, laevis, triquierter. Folia uti in nutante, sed
glabra. Ligula ovato-acuminata, erecta, colorata,
decurrens. Vaginae striatae, marginibus pilosis.
Racemus rarus, pauciflorus, nutans. Pedunculi se-
cundi, inferiores racemosi, pedicello altero longiore,
superiores solitarii. Gluma calycina uniflora,
bivalvis, purpurea, marginibus albis, trinervia;
valvula exteriore magna, ovata, concava: interiore
minore lanceolata. Gluma corollacea fertilis, unica:
valvula exteriore magna, ventricosa, marginibus
glabris interiorem planiusculum, marginibus mem-
branaceis, ad basin praecipue reflexis, donatam am-
plexante. Rudimentum alterius Glumae corollaceae
uti in antecedente. Antherae flavescentes. Ovari-
um bicone.

Flor. Flor. — Therm. Matur. Mess — Vend.
 β. Apr. — β. Aug. β. Jun. — β. Oct.

Habit. in nemorosis, montosis, Germ. in Fran-
 conia. Saxon. Hanov. Isenburg. Bavar. Wetterau.
 Austr. Siles. Sudet. Hass. Westphal. Brunsv.
 Hannov. — *Gal.* in Dep. de l'Herault?

3. Melica nutans. Melique penchée. Ueber-haengendes Perlgras. * 1539

Melica nutans, panicula nutante simplici. Linn. ed.

Reich. I. 182. ed. Gil. 3. 84. s. veg.
ed. Pers. 115.

flosculis glabris, summo inaequaliter curva-to. Boehm. Lips. n. 1614. Gmelin.
sib. I. p. 97.

petalis imberibus. Berg. fr. p. 319. Fl. suec.
57. 76. Dalib. pag. 23.

floribus sub culmo pendulis. Fl. lapp. 36.
Roy. prodr. 57.

Aira nutans panicula laxissima nutante simplici.

Wigg. prim. p. 7. Willden. pr. n. 143.

Gramen montanum avenaceum, locustis rubris.

Tournef. 524. C. Bauh. pin. p. 10.

prod. p. 20. theatr. 154. 155. Scheuchz.

agr. p. 171. t. 3. f. 16. Raj. angl. 3. p.

403. 4. p. 45. hist. 1289. Magnol.

bot. 122. h. 92. Dill. giess. p. 50.

Mapp. 137. Rupp. jen. p. 317. Moris.

h. 3. p. 215. s. 8. t. 7. f. 48. Monti.

prodr. p. 54. f. 73. Hall. goett. p. 45.

spicatum. Clus. h. 258.

avenaceum spicatum. C. Bauh.

pin. p. 16.

avenaceum locustis rarioribus. C. Bauh. pin.

p. 10. theatr. 155. Moris. l. c. f.

49. Scheuchz. l. c. p. 173.

rariore grano nemorensse, dani-cum. Lob. adv. 466

senui spicataque panicula, albis utriculis. Barrel. rar. 1231. t. 96.

senui erectaque panicula, violacea. ib. 1230.

nemorosum, glumis rarioribus
ex fusco xerampelinis, nostras,
Raj. hist. 1289. Tourn. 524.

Lamarck. 1177.5. Nekker. gallob. p. 51. Schrank.
1. 334. Wilke. gryph. n. 45. Goüan. h. 42. ? flor. 121. ?
Gmelin. tub. p. 21. Sauv. 35. ?. Curt. Lond. 6. n. 70.
Weig pom. n. 57. Scop. 1. 67. Scholt. barb. n. 65.
Reyg. gedan. 1. p. 41. Murr. prodr. p. 4. Fl. d. Wett.
1. 102. Roth. 1. 37. 2. 102. Poll. 1. 79. Gaertn. 2. 5. t.
80. f. 4. Doerr. nass. n. 24. Matuschk. 1. 53. Lestib.
219. Leers. 25. t. 3. f. 4. Zinn. goett. p. 64. Jacq.
vind. p. 15. Hoffm. 40. Moench. fl. n. 66. meth. 173.
Reichl. frc. 16. Leyss. hal. n. 82. Oestr. fl. 1. 57.
Krock. 1. 129. Schreber. graes. 62. t. 6. f. 2. Panz. 12.
318. Nonne. erf. p. 277. Plan. erf. p. 54. Wibel. w.
117. Dietr. 1. 96. Delarbre. 131.

Radix perennis, fibrosa, albida aut fusca, saepe
stolonifera. *Culmus* erectus, tenuis ex compresso-
tetragonus, angulis 2 obtusioribus scabris, striatus,
saepe ramosus, laete viridis, 1-2 pedes altus, ad
basim squamis fuscis aphyllis tectus, nodis 7-8,
purpureis, superioribus nonnunquam obsoletis. *Folia*
paucia, plana, 1-2 lineas lata, superiore pagina
pubescentia et sicuti in marginibus et nervo dorsali
albido, retrorsum scabra, 3-6 pollices longa, supe-
riores longiores inferioribus. *Vaginae* tetragonae,
angulis lateralibus obsoletis, scabrae. *Ligula* bre-
vissima, cartilaginea, aut melius margo fuscus.
Racemos 5-6 polices longus, nutans, simplex, pau-
ciflorus, laxus. *Rhachis* compresso-tetragona, sca-
bra. *Pedunculi* compressi, alterni, superiores soli-
tarii, inferiores plerumque gemini et inaequales,
non raro ramosi, omnes secundi, curvato-nutan-
tes. *Spiculae* pendulae, 2-3 lineas longae, 1-1½
lineam latae, ovatae, ventricosae, obtusae. *Gluma*
calycina biflora, *valvulis* ovalibus, concavis, lae-

vibus, striatis, obtusis, subaequalibus, purpureis aut atro-violaceis, marginibus argenteis; *exteriorē trinervia*, latiore, *interiore quinquenervia* paululum longiore, parum glumas corollaceas superante. *Glumae corollaceae fertiles* 2, virides, *valvula exteriore concava*, ovali, laevi, striata, *versus apicem obtusum nonnunquam rubella*, marginibus argenteis; *interiore ovali*, laevi, marginibus reflexis scabris, apice membranaceo obtuso, paululum exteriorē breviore. *Rudimentum tertiale* glumae corollaceae clavatum, truncatum, pedicellatum, ceterū uti in prioribus, interdū *valvulis involutis*, diaphanis 4 - 5. *Squamula orbicularis*, *ovarium ambiens*. *Antherae ovales, flavae*. *Semen hinc planiusculum et sulcatum, fusco-ferrugineum, punctis obscurioribus pictum, nitidum*.

Var. Rudimento quartae corollae.

Flor. Flor. — Vend. *Matur.* Mess. — Brum.
β. Apr. — β. Oct. β. Jun. — β. Nov.

Habit. in nemorosis, montosis, dumet: sylvat: rupibus, pascuis, t. f. *Galliae et Germ.* — In nostro Depart. circa Lautern, ad molem imperialem, et in montibus Jovis, et Plattenberg.

4. *Melica pyramidalis.* Melique pyramidale. Pyramidenförmiges Perlgras. ***

Melica pyramidalis. Lamarek. 1777. 4.

minuta, culmo ramoso, foliis setaceis, petalis imberbibus. Linn. ed. Reich. I. p. 182. ed. Gil. 3. p. 84. s. veg. ed. Pers. p. 116. Mant. 32.

Gramen avenaceum, angustifolium, panicula pyramidali. Scheuchz. agr. 173.

Culmus 7-8 pollices altus, filiformis, erectus, inferne ramosissimus, vaginis foliorum tectus. Folia basi patula, involuto-setacea, brevia, glabra,

glaucō-viridia. *Racemus pauciflorus*, rectus, laxisimus, pyramidalis. *Pedunculi capillares* 3-4, alterni, remoti, patentēs, versus apicem sensim minores, simplices. *Gluma calycina biflora*, *vulvulis magnis*, inaequalibus, laevibus, bruneis, aut ferrugineis, marginibus albīs, glumis corollaceis minoribus. *Glumae corollaceae fertiles* 2, oblongae; *Rudimentum tertiae intermedium*, truncatum, pedicellatum.

Habit. in Gall. Dep. de l'Isere, et de la Drome.

5. *Melica hirsuta*. Melique vélue. Haariges Perlgras. ***

Melica gmelini panicula coarctata foliis linearibus hirsutis ciliatis, calycibus sessilibus subtrifloris, floribus muticis. Roth. 2. p. 104.

Aira. Gmel. tub. p. 20.

Culmus gracillimus, glaber, semipedalis. *Folia angustissima*, interdum longa, hirsutissima. *Vaginæ hirsutæ*. *Panicula spiciformis brevis*, ex flavo et argenteo viridis.

Hab. prope Tubing. in monte anatolico.

AD TAB. XX.

XIX. Molinia. Molinie. Molinie.

Schrink. I. 100. et 334. Moench. meth. 183. Fl. d. Wett. I. 45.

Gluma calycina valvulis inaequalibus, ex ovato-lanceolatis, exteriore minore, acutiore, interiore longiore, mox acutam, mox obtusiusculam basi amplectente. *Glumae corollaceae fertiles*, plerumque 2, raro aut unica aut plures quam 2, hermaphroditae, gluma calycina multo longiores, conicæ, latere interiore sulcato, altera superior pedicellata ante anthesin

anthesin alteri inferiori sessili tota adpressa, aetate vero apicibus divergentibus. — *Valvula exterior glumae corollaceae inferioris lanceolata*, oblonga, dorso convexo, interiorem minorem amplectens: *inferior* lateribus ita reflexis, ut dorsus concavus aut profunde sulcatus sit. *Glumae corollaceae superioris valvula interior minor*, angustissima, in juventute una cum parte valvulae exterioris in sulcum valvulae iinterioris *glumae corollaceae inferioris* recepta est. *Rudimentum glumae corollaceae tertiae nullum*, (aut si adest, uti in melica). *Gluma corollacea* semini adnascitur. *Semen ovale*, nitidum, glabrum.

Molinia coerulea. Molinie bleue. Blau-gras. *

Molinia coerulea, panicula, culmo basi incrassato, Antheris stigmatibusque purpurascens. Moench. m. 183. culmo inferne incrassato, panicula coarctata, ex purpureo violacea, spiculis cylindricis, antheris stigmatibusque purpureis. Fl. d. Wett. I. 103.

varia (et) arundinacea. Schrank. I. 334. sqq. Oestr. fl. I. 58.

variabilis. Vibel. w. 115.

Melica coerulea, panicula coarctata, floribus cylindricis. Linn. ed. Reich. I. 183. ed. Gil. 3. 84. s. veg. ed. Pers. 116. panicula ampliore ex viridi nigricante. Berg. fr. 320.

Leyss. hall. n. 83. Lamarck. 1177. 6. Curt. Lond. 5. n. 60. Moench. hass. n. 67. Pollich. I. 80. Scholl. barb. n. 66. Reyg. ged. I. p. 4c. n. 6. Roth. I. 38. 2. 103. Lestib. 219. Hoffm. 40. Weber. spic. p. 3.

K

Nekker. gallob. p. 48. Plan. erf. p. 3. Dietr. I. 97.
Oestr. fl. I. 58.

Aira coerulea panicula coarctata, floribus peduncu-
latis muticis, convoluto-subulatis,
foliis planis. Linn. spec. pl. 95.

Jacq. vind. p. 14. et. 207. Gmelin. tub. p. 19. Schre-
ber. spic. p. 48. Doerr. nass. p. 2. Weig. pom. n. 51.
Gmelin. fl. sib. I. p. 94. n. 25. Wigg. prim. p. 7.
Matuschk. I. 49. Wilke. gryph. n. 42. Scopol. I. p.
64. Willden. pr. n. 142. Leers. 22. t. 4. f. 7. Oeder.
t. 239. Reich. 15. Delarb. 10. Krock. sil. I. 117.

Poa spiculis subulatis panicula varia contracta. Fl.
lapp. 29. Roy. lugdb. 61.

Arundo locustis bifloris conicis, petiolis subvillo-
sis. Hall. helv. n. 1518.

Gramen arundinaceum enode minus, sylvaticum.
C. Bauh. p. 7. theatr. 97.

Scheuchz. agr. p. 209.

enode majus sylvaticum.
Scheuchz. l. c. p. 207. t. 4.

f. 11. 12. Goian. illustr. 3.

enode majus montanum. C.
Bauh. p. 7. theatr. 66. Buxb.
hal. p. 143.

enode montanum, panicula
longissima, locustis an-
gustissimis. Scheuchz. l.
c. p. 208.

paniculatum autumnale, panicula angustiore
e viridi-nigricante. Tourn.
521. Mapp. 135. Buxb. hal.
n. 143. Rupp. jen. p. 310.

autumnale, panicula ampliore
e viridi nigricante. Scheuchz.
agr. p. 207. Tourn. 521. Mapp.
135. Rupp. jen. p. 309.

pratense serotinum, panicula longa purpurascente. Moris. hist. 3. p. 201.
s. 8. t. 5. f. 22. Dill. giess. p. 171.

Habitus arundinaceus. *Radix* perennes, ramosa, fibrosa, alba (Matuschk. radicem tomentosam indicat, quod quidem nunquam observavi). *Culmī* plerumque uninodes (nodos 2-3 ad basi valde approximatos vidi, praecipue in varietate minore), nodo purpurascente aut viridi, glabro, tecto, erecti, stricti, infra nodum angustati, supra cum incrassati, teretes, glabri, laeves, ad magnam partem nudi, ad basin squamulis aphyllis tecti, infra paniculam circulo aut semicirculo (nodo obsoleto) notati, 2-4 pedes alti. *Folia* plana, utrinque attenuata, versus apicem convoluta, firma, rigida glabra, striata, laetitia, margine vero scabriuscule, 1-3 lineas in medio lata, 3-15 pollices longa, nervo dorsali, tenui, albido, praedita. *Vaginae* laeves, striatae. *Ligula* pilosa. *Panicula* spiciformis, contracta, 4-12 pollices longa, 8 lineas circiter lata. *Rhachis* teres, laevis. *Pedunculi* scabri, ramosi, inaequales, plures in semiverticillis alternis, raro solitarii, adpressi. *Spiculas* minime cylindricas inveni, sed compres-siusculas, adultiores rostriformes, apicibus divergentibus, 2-3 lineas longas, $\frac{1}{3}$ aut paulo magis latas, aut profunde virides, aut violaceas. *Gluma calycina* parva, vix basin spiculae cingens, plerumque biflora, *valvulis* inaequalibus, spicula triplo aut quadruplo minoribus. *Glumae corollaceae* oblongae, lanceolatae, obtusiusculae, latere dorsali convexae, interiore vero profunde sulcatae, clausae, *inferior* sessilis, *superior* pedicellata. *Rudimentum tertiae* glumae corollaceae, pedicellatum, obtusum. *Antherae* et *Stigmata* profunde coeruleae.

Var. I. Culmo inferne uno latere plano palmari-pedali, panicula vix di-

- gitalii (prope Moguntiam et Verstadt).
2. Glumis calycinis unifloris, trifloris, 4-5 floris.
 3. Rudimento et pedicello nullo (prope Nakkenheim et Budenheim).
 4. Pedicello nudo absque rudimento (in locis indic.).
 5. Valvulis omnibus viridibus aut glaucis (ibid.).
 6. Cum rudimento 4tae glum. corol.
 7. Nodo aut nodis pilosis (Bavar.).
 8. Nodis plurimis approximatis (prope Mombach in pratis).
 9. Panicula bracteata, bractea foliiformi (absque vagina) basi paniculae adpressa, pollicis longitudinis (prope Mombach).

Flor. Mess. — Vend. *Matur.* Vend. — Brum.
β. Jun. — β. Oct. — β. Sept. — β. Nōv.

Habit. in turfosis, pascuis et pratis sylvisque undis, raro in montosis; tot. fere *Gall.* et *Germ.* — In Depart. Montis Jovis circa Moguntiacum, in pratis Mombacencibus, Budenhemensibus, prope Nakkenheim, Laubenheim; Niederolm; Kleinwinterheim; Verstadt; Lautern.

AD TAB. XXI.

XX. Briza. Amourette. Zittergras. (Gramen Tourn.)

Linn. ed. Gil. 2. 23. Venten. 2. 109. Lam. t.

45. Flor. dan. t. 258. Gärtn. I. 4. t. 1. f. 6. Moench.
m. 184.

Gluma calycina pluriflora, basin spiculae plus minusve cordatam repraesentans, *valvulis* quoque basi cordatis, patentibus quidem, sed arcte glumiſ corollaceis adpressis, concavis, dorso convexis, ventricosis, obtusis, fere aequalibus. *Glumae corollaceae* 5-29, distiche posita, *superiores* interdum, non raro et *inferiores*, steriles, (indeque *gluma calycina* primo intuitu saepe plurivalvis,) *valvulis* obtusis inaequalibus; *exteriore* figura valvularum calycinarum; *interiore* multo minore, a latere dorsali concava, subrotunda, ventrem alterius claudente. *Squamulae* 2, lanceolatae, aut ovales, acuminatae. *Filamenta* 3, capillaria. *Antherae* oblongae. *Ovarium* subrotundum. *Styli* 2, capillares, recurvi. *Stigmata* plumosa. *Gluma corollacea* immutata, semen tegens, demittens. *Semen* unicum rotundatum aut ovatum compressum, glabrum, exsulcum, parvum.

Panicula laxissima.

1. *Briza tremula*. Amourette tremblante.
Gemeines Zittergras. *

Briza tremula, Lamarek. 1178. 3. Lestib. 220.

media spiculis ovatis, calyce flosculis breviori. Linn. ed. Reich. I. p. 194. ed Gil. 3. p. 91. s.v. ed. Pers. 118. hort. cliff. 23. Fl. suec. 80. 86.

Wilke grÿph. n. 57: Poll. I. 95. Oeder. t. 28. Roy. lugdb. 63. Engl. bot. 340. Moench. fl. n. 68. meth. 184. Göttan. h. 46. fl. 123. Scholl. barb. n. 67. Matuschk. I. 58. Berg. fr. p. 323. Sauv. 37. Leers. 26. t. 7. f. 2. Nohne erf. p. 285. Plan. erf. p. 56. Röth. I. 40. 2. 110. Reyg. gedan. I. p. 44. Murr. prodr. p. 41. Fl. d. Wett. I. p. 113. Boehm.

lips. n. 647. Schrank. I. 348. Jacq. vind. p. 15.
 Hoffm. 47. Gmelin. tub. p. 24. Zinn. goett. p. 65.
 Grimm. isen. 264. Scop. I. 75. Willd. pr. n. 158.
 Panz. 12. 361. Leyss. hal. n. 86. Nekker gallob.
 p. 56. Wigg. prim. p. 8. Doerr. nass. p. 6 Reich.
 16. Weig. pom. n. 64. Delarb. 37. Wibel w.
 III. Krock. I. 147. Oestr. fl. I. 58.

Briza minor, spiculis triangulis calyce flosculis longiore. Linn. ed. Reich. I. 193. ed.
 Gil. 2. 91. s. v. ed. Pers. 118. hort.
 cliff. 23.

Gouan. hort. 46. flor. 123. Roth. I. p. 40. 2. 109.
 3. 565. Sauv. 37. Kerner. t. 213. Dick. h. sicc. 5.
 n. 3. Gmelin. tub. p. 24. Kniph. orig. cent. 8. n. 16.
 Leyss. hal. n. 85. Roy. lugdb. 63. Dietr. I. 99.
 Nonn. erf. p. 285. Plan. erf. p. 56. Delarb. 37.
 Oestr. fl. I. 58.

Poa petiolis tenuissimis locustis ovatis. Hall. helv.
 n. 1448. *tenerrimis locustis triangularibus*. ib.
 n. 1449.

Gramen tremulum. J. Bauh. hist. 2. p. 469. Tabern.
 231. Dill. giess p. 79.
majus. C. Bauh. pin. p. 2. Scheuchz.
 agr. n. 204. Magn. bot. 113.
 hort. 91. Hall. goett. p. 44.
minus *panicula parva*. C. Bauh.
 pin. p. 2. prodr. p. 4.
 Scheuchz. agr. p. 205.
 t. 4. f. 9. Magn. bot.
 114. hist hort. 91. Volck.
 norimb. p. 198.
locustis deltoidibus albi-
cantibus. Rupp. jen.
 p. 315.

vulgare minus locustis rotundioribus. Mer. hist. 3. p. 205.
t. 6. f. 45.

tremulum s. phalaroides minus lata sparsa
paniculata. Barr. ic. 16.
Mont. gram. ic. 39.

paniculatum majus, locustis magnis phoeniceis (et canticibus) tremulis. Tourn.
523. Mapp. 136.

minus, locustis parvis tremulis. Tourn. 523. Mapp.
136. Rupp. jen. p. 315.

leporinum. Tabern. Krtb. 541.

Radix perennis, fibrosa, albida, aut fuscescens.

Culmus 6 pollices — 2 pedes altus, laevis, erectus,
gracilis, superne saepe rubellus, teres, glaber, nodis 2 — 3 purpurascentibus, internodiis duobus superioribus longissimis. *Folia* 1 — 2 lineas lata,
2 — 4 pollices longa, glabra, erecta, plana, mucrone obtuso. donata, laete viridia, scabriuscula,
nervo dorsali albido versus apicem evanescente,
summum basi paniculae junioris adpresso. *Vaginae* glabrae, laeves, striatae, summa subventricosa.
Ligulae breves, obliquae, truncatae. *Panicula* pulcherrima, 3 — 8 pollices longa, laxa, florens patentissima, et rhomboideo-triangularis, junior partim
vagina suprema involuta. *Rhachis* teres, laevis, ad basin ramificationum subgibbosa. *Pedunculi* ramosi,
scabri, virides aut violacei, erecto-divaricati, plerumque gemini, inferne interdum quaterni, aut gemini statim a basi divisi, ad basin ramificationum subincrassati et purpurascentes, in semiverticilllos alternos dispositi. *Pedicelli* capillares flexuosi. *Spiculae* 2 lineas, aut paulo longiores, 2 lineas latae,
plerumque nutantes, tremulae, plerumque 5 — 7

florae, ante anthesin vix aut plane non cordatae, in florescentia, in qua valvulae calycinae magis reflexae sunt, ex cordato et rhomboideo-paululum triangulares aut subrotundae, apice obtusissimo compressae, splendentes, glabrae, plurimum ex viridi, albido, violaceo aut purpureo variegatae, aetate ex viridi-albidae. *Gluma calycina valvulis* longitudine vix lineae, aut paulo longiores, cum corollaceis externe coloratis, dorso nempe plurimum violaceo, aut viridi, margine argenteo aut pallide viridi, carinatis, obscure trinerviis, inaequalibus, superiore longiore et latiore, utraque obtusa. *Glumae corollaceae alternae*, sensim versus apicem spiculae minores, superiores saepe abortientes; *valvula exteriore* figura valvularum calycinarum, inferiorum, eademque longitudine, interiore multo minore, apice obtuso subcrenato. *Squamulae* truncatae, apice crenulato, margine exteriore inciso, et quasi unidentato. *Antherae* purpureae. *Stigmata* alba plumosa. *Semen* uno latere excavatum.

Var. 1. Spiculis viridibus, albidisque.

2. Spiculis 9 — 11 floris.

3. *Briza minor* L. radice annua, (?) *Culmo* et *panicula* minore, spiculis minoribus, vix 5 floris, magis triquetribus: *Valvulis* autem *calycinis*, secundum Lamarck. characterem specificum hanc praebentibus. *Hab.* passim cum vulgari, in *Gall.* — Depart. de l'Hérault; du Puy du Dome; de la Loire; et du Rhône, etc. — in *Germ.* Saxon. Thuring. Norimbr. etc.

Flor. Flor. — Mess. Matur. Mess. — Fructid.

β. Apr. — β. Jul. — β. Jun. — β. Sept.

Habit. in pratis siccioribus, aggeribus, poma-

riis, ad margines sylvarum. Tot. fere *Gall.* et *Germ.*
— In nostro Depart. circa Moguntiam, Oppenheim,
Nierstein, Bingen, Ingelheim, Verstadt, Lautern.

2. *Briza maxima*. Amourette majeure. Gros-
ähriges Zittergras. ***

Briza maxima, spiculis cordatis, flosculis septen-
decim. Linn. ed. Reich. I. p. 194.
ed. Gil. 3. p. 92. s. v. ed. Pers. 118.
hort. cliff. 20.

spiculis racemosis. Jacq. obs. 3. p. 10. t. 60.
mons pessulana. Goüan hort. 45. flor. 123.

*Gramen paniculatum majus locustis maximis can-
dicantibus tremulis.*
Tourn. 523.

minus locustis magnis tremu-
lis. Tourn. 523.

phalaroides tremulum. Barrel. ic. 23. n. 1-2.
tremulum maximum. C. Bauh. p. 2. prodr. 5.
Schenchz. agr. 202.

minus panicula magn. Magn. bot.
113. hort. 45.

*panicula longiore et laxiore, co-
lore candicante.* Clus. cur.
post. p. 28.

Lamarck. 1178. I. Gärtn. I. 4. t. 1. f. 6. Roy.
Jugdb. 63. Goüan hort. p. 46. fl. p. 123. Sauv. 37.
Kniph. orig. cent. 8. n. 15. Moench. meth. 184.
Dietr. 2. 99. Lestib. 210. Delatbre. 37. Oestr. fl.
I. 58.

*Radix annua, fibrosa, albida. Culmus debilis,
fere filiformis, laevis, glaber, aut totus vaginis
tectus, aut in florescentia superne ex parva parte
nudus, nodis 2-3 purpureis, vix longitudinem
pedis excedens. Folia pauca, 1-2 lineas lata; 1-3
pollices longa, glabra, vix scabriuscula. Vaginae*

plerumque pubescentes, *summa* paniculam juniores involvens. *Ligulae* oblongae, obtusae. *Panicula* (aut *Racemus*) pauciflora, *pedunculis* pollicaribus, alternis, raro pluribus, in semiverticillis alternos dispositis, plurimum simplicibus, non saepe bifidis, sicuti *Rhachis* scabris, unicam tantum spiculam gerentibus. *Spiculae* 2 — 7, magnae, ovato-obtusae, basi cordatae, splendentes, compressae, laeves, ex viridi et albido aut purpureo, rufo et ferrugineo variegatae, plerumque 15 — 17 florae, 8 — 10 lineas longae, 3 — 4 lineas latae, saepe nutantes, tremulae, aetate scariosae, albidae. *Glumae corollaceae* superiores abortientes. *Semen* hinc excavatum.

Var. 1. *Monspessulana* Goüan: spiculis minoribus 5 — 7 floris, culmo vix spithameo, pedunculis vix 3 — 4 lineas longis, folio summo paniculam saepe superante.

2. Spiculis vigintifloris.

Flor. cum antecedente.

Habit. in pratis siccoribus, montosis, ad vias *Germ.* in Austr. — *Gall.* in Dep. de l'Herault; de l'Aude, du Gard, Haut Geronne, du Rhône, du Var, des Bouches du Rhône, de la Vaucluse, du Puy du Dome etc.

AD TAB. XXII.

XXI. Poa. Paturin. Rispengras. (Gramen. T.).

Linn. ed. Gil. 2. 23. Vent. 2. 108. Lam. t. 45. Fl. dan. t. 750. Moench. meth. 185.

Gluma calycina pluriflora, bivalvis: *valvulis* plus minusve compressiusculis, carinatis, inaequilibus ex ovato-acutis, raro ex ovato-lanceolatis aut

oblongis, apice interdum truncato; *exteriore* longiore, raro breviore. *Glumae corollaceae* 2-25, bivalves, *valvula exteriore* ex *ovato acuta* aut *acuminata*, mutica, aut rarissime mucrone perbrevi, vix visibili, aucta, apice integro, interdum truncato, plus minusve compressiuscula, carinata, margine plurimum scarioso. *Squamulae* 2, lanceolato-acutae, interdum sissae, et basi gibbae, raro truncatae, rarius unica semiorbicularis. *Filamenta* tria, capillaria. *Antherae* bifurcatae. *Ovarium* subrotundum. *Styli* 2, reflexi, plerumque villosi. *Stigmata* villosa. *Gluma corollacea* semini adnata, nec dehiscentia, raro demittens. *Semen* unicum, oblongum, acuminatum, utrinque compressum, non saepe uno latere convexum, altero sulcatum, tectum, raro rotundum et nudum.

Panicula vel *divaricata* vel *patens*, aut *secunda* aut *spiciformis*; *spiculis* muticis, plus minusve *compressis*, rarius teretibus.

Obs. Plures sic dictae Poae, Bromi et Festucae species, certe nihil aliud quam varietates aut progenies classificae sunt.

**1. Poa palustris. Paturin des marais. Sumpf-
rispengras. ****

Poa palustris, panicula diffusa, spiculis subtrifloris pubescentibus, foliis subtus scabris.

Linn. ed. Reich. 1. p. 188 ed. Gil. 3.
p. 87. s. veg. ed. Pers. 116.

pratensis. Leers. 27. t. 6. f. 4. (quoad descriptionem et iconem.) Willdenow. prodr. n. 152.

panicula stricta, locustis trifloris, calycibus aristatis, folliculis villosis. Hall. helv. n. 1467.

polymorpha. Wibel. w. 113.

Gramen paniculatum aquaticum, angustifolium, panicula speciosa, locustis parvis.

Scheuchz. agr. p. 184.

palustre, panicula speciosa. C. Bauh. pin. p. 3. prodr. 7. theatr. 39. Moris.

hist. 3. p. 201. s. 8. t. 6. f. 27.

Lamarck. 1179. 12. Flor. dan. 750. Schreber. spic. p. 55. Hoffm. 43. Roth. I. 43. 2. 117. Flor. d. Wett. I. p. 109. Moench. m. 188?. Dietr. I. 98. Gmelin. tab. 22.? Lestib. 221. Séguier. ver. I. p. 351. Krock. sil. I. 135.

Radix perennis, repens, stolonifera. Culmi erecti, plerumque basi incurvati, interdum inferne decumbentes, et ad nodos insimos, radicantes, glabri, laeves, infra paniculam autem plerumque scabriusculi, teretes, nitidi, non raro ramosi, 2 - 4 pedes alti, inferne crassitie pennae corvinæ aut paulo crassiores, nodis angustatis purpureis 4 - 6, internodiis 2 superioribus longissimis, summo ex maxima parte nudo. Folia glabra, inaequalia; radicalia plerumque emarcido-plana; culmea vaginis minora, radicalibus latiora, et breviora, $1\frac{1}{2}$ - 2 lineas lata, 3 - 7 pollices longa, lanceolato-acuminata, plana, arida, scabriuscula, praecipue versus apicem, et inferiore pagina, nonnunquam nervo dorsali valde scabro donata. Vaginae glabrae, perfecte laeves, striatae. Ligulae longitudine lineae, aut paulo longiores, obtusae, integrae. Panicula pyramidalis, patens, acuta, matura apice saepe nutante, 3 - 10 pollices longa. Rhachis laevis, teres. Pedunculi terni-seni in semiverticillis alternis, paululum erecti et patentes, capillares, ramosi, longi, scabri, raro laeves. Spiculae breviter pedicellatae, vix lineam longae, et lineam dimidiam latae, compressae, ovato-acutae, juniores lacte virides, marginibus flavescentibus, aetate ex viridi et lutescente variegatae.

tae, maturaे fuscētes. *Glumae calycinae valvulis inaequalibus*, ex ovato-lanceolatis, acutis, dorso carinato, scabro, obscure trinerviis, exteriore longiore, interiore acutiore. *Glumae corollaceae* 2-8, plerumque vero 2-3, versus apicem minores, ultima plurimum abortiens, in florescentia distaniores, basi villosae certe inferiores; *valvula exteriore* dorso carinato (per lentem), scabritie et interdum pilis brevissimis donata, ovato-lanceolata, et obtusiuscula, apice et margine membranaceo, inarmato oculo acutissima; interiore minore, margine utrinque nervo ciliato praedita. *Squamulae* apice bifidae. *Antherae* violaceae, aetate ferrugineae. *Stigmata* alba.

Flor. Praer. — Therm. *Matur.* Therm. — Vend. β . Maj. — β . Aug. — β . Jul. — β . Oct.

Habit. in fossis hyeme inundatis, pratis et paucis udis, ad rivulos, et piscinas, raro in siccis: Tot. fere *Gall.* — in nostro Depart. circa Moguntiacum, ad fossas munimentorum, praecipue ad fossem primariam prope et inter portam Münster et Raimundi; ad Jungenfelder Aue; in pratis udis circa paludem. — *Germ.* in Brem. Saxon. Tubing. Darmstadt. Hanov. Herborn. Werth. Siles.

2. Poa trivialis. Paturin trivial. Gemeines Rispengras. **

Poa trivialis panicula subdiffusa, spiculis trifloris, basi pubescentibus, culmo erecto tereti.

Linn. ed. Reich. I. 185. ed. Gil. 3. 87.

Syst. veg. ed. Pers. 116. fl. sv. 78. 80.

angustifolia. Var. Lamarck. 1179. 13. Lestib. 221.

Haller. 1466. ubi cum annua conj.

Gramen pratense paniculatum medium. C. Bauh. p.

p. 2. Tourn. 521. Buxb. hal. 143.

Scheuchz. agr. p. 180. Mapp. 134.

Dill. giefs. p. 70. Rupp. jen. p. 311. Hall. goett. p. 45.

paniculatum minus rubrum. Tourn. 522. C. Bauh. p. 3. Mapp. 134. Scheuchz. prodr. 20. t. 3. Rupp. p. 311. Tabern. ic. 207. J. B. hist. 2. 465. (Hocce et praecedens synon. huc pertinent. Secundum vero Hallerium ad Annam. Hallerus autem trivialem et annuum non separavit.)

alpinum paniculatum minus, *panicula spadiceo-viridi elegans*. Scheuchz. agr. 163, prodr. t. 4.?

Curtis Fl. lond. t. 90. Nonne erf. p. 281. Plan. erf. p. 55. Jacq. vind. p. 16. Dalib. par. 28. Roth. I. 41. 2. 112. Nekker gallob. p. 55. Doerr. nass. p. 27. Geijan. hort. 43? fl. 122? Gmelin. tub. 120. Pollich. I. 84. Sauv. 37. Boehm. lips. n. 630. Matuschka. I. 55. Willden. pr. n. 151. Fl. d. Wett. I. p. 105. Zinn. goett. p. 64. Leyss. hal. n. 89. Gmelin. sib. I. p. 103. n. 35. Weig. pom. n. 59. Wigg. prim. p. 7. Dietr. I. 98. Moench. hass. n. 70. Meth. 187. Scop. 2. 69. (cum angust. conj.) Berg. frc. p. 322. n. 6. Schrank. I. 341. Scholl. barb. n. 69. Leers. 26. t. 6. f. 2. (quoad descript. minime ad ic. panicula palustris ad basin multo latior est.) Murr. prodr. p. 41. Reich. 16. Wilke. gryph. n. 47. Panz. 12. 328. Delarbre. 153. Krock. I. 137.

Planta ab *angustifolia* diversissima, *alpinae* autem valde similis, et minime tam *trivialis*, quam nomen *triviale* indicat.

Radix pereanis, fibrosissima, densa, fusca, interdum stolonifera. *Culmi* geniculato-erecti, internodio supremo longissimo, fere siliformes, ad basin lineam lati, laevissimi, nitidi, ex dimidia parte

nudi, albidi et subviolacei aut pallide virides, glaberrimi, primo intuitu teretes, certe vero (obscure quidem) compressiunculi, aut simplices, aut ex basi ramosi, nodis 2-3 purpureis donati, semipedales — pedales, et paulo longiores. *Folia radicalia* densos caespites formantia, raro ultra pollicem longa: *culmea* pauca, sensim minora, supremum vix 3 lineas longum, adpressum: *omnia* pagina inferiore laevia, superiore autem pagina et marginibus albidis plerumque scabriuscula, nervo dorsali eminentia ad apicem carinante praedita, plerumque laete viridia, fere glauca, raro subviolacea, lanceolata, siccata nunquam conduplicata, sed torta, semper vero plana, apice magis obtuso quam mucronato, duriuscula, laeviter striata, ad summum 2 lineas lata. *Vaginas* nunquam in dorso argute carinatas, sed nervo dorsali eminentiore observavvi: *omnes* glabrae, laeves, striatae, interdum obscure compressae, colore foliorum. *Ligula* pellucida, interdum paululum albido-subviolacea, unam lineam longa, obtusa, saepe autem tridentata, dente nempe perfecte intermedio, et 2 lateralibus. *Panicula* pulchra, densa, coarctata, fere ovata, 9 lineas ad summum 2 pollices longa, lineas 6-10 lata, obtusa, planiuscula, erecta, aut paululum cum culmo inclinata, in anthesi patentiuscula, duriuscula. *Rhachis* laevis, internodiis alternis semiteretibus, latere uno piano. *Pedunculi* inferiores cum spiculis 4-6 lineas longi, scabriusculi, alternatim semiverticillati, inferiores non raro solitarii, aut bini, raro terni, omnes ramosi, nonnulli vix 2-3 lineas ad basin nudi, capillares, semiverticaliter erecti, nonnunquam subflexuosi. *Spiculae* ovatae, acutae, compressae, ex violaceo-viridi et albido variegatae, aetate fuscescentes et albidae, subsplendentes, 2-3 $\frac{1}{2}$ lineas longae paulo ultra lineam latae, aut breviter pedicellatae,

aut sessiles et quasi fasciculatae, erectae. *Gluma calycina valvulis* ovatis, acutis, obscure trinerviis, carinatis, carina versus apicem scabra, inaequalibus; *exteriore* majore, paulo ultra lineam longa. *Glumae corollaceae* plerumque (certe circa Moguntiacum) 5, interdum autem 3, 4, 6, raro 7 in spicula, *valvulis* inaequalibus; *exteriore* figura valvularum calycinorum, per lentem obtusiuscula, dorso (certe prope basin) et margine infra medium villosa, *interiore* acutiore, angustiore, diaphana, apice bifido, utrinque nervo viridi scabriusculo praedita (dorso scabro eam non vidi). *Antherae* pallide flavae. *Stylus* nudus. *Stigmata* alba villosa.

Flor. Flor. — *Mess.* Mess. — *Vend.*

β. Apr. — β. Jul. — β. Jun. — β. Oct.

Habit. in aridis, siccis, moatosis, collibus, pratis elatis, ad vias, in muris, *Gall.* — in Dep. du Puy du Dome, Rheni superioris et inferioris; montis Jovis etc. prope Nieder Ingelheim, Heidesheim, Algesheim, Gavelsheim, Budenheim, in sylva prope Moguntiacum, ad radices pin. sylvestr. porro in gramineis haud procul portam Münster, rarius in pratis. — *Germ.* in Brem. Bavar. Hass. Wetterau. Siles.

3. Poa rubens. Paturin rougeâtre. Röthli- ges Rispengras. ***

Poa rubens panicula patula, spiculis ovatis 3-5 floris, acutis, glabris, culmo quadripedali, basi incurviusculo compresso. Moench. meth. 187.

sudetica, panicula erecto-patente, spiculis subtrifloris, glaberrimis macronatis, culmo erecto compresso, vaginis foliorum laxis anticipitibus. Hoffm. 43. quadripedalis. Ehrh. gram. 135.

(Ha-

(*Habitus sylvaticae.*) *Radix perennis. Culmus compressus, basi incurvatus, erectus, 3 - 4 pedalis. Folia lata, brevia. Vaginae laxae ancipites. Panicula erecto-patens, flaccida, post anthesin rubescens. Spiculae ovatae 3 - 5 florae, acutae, glaberrimae. Valvulae calycinae et corollaceae laete virides, acutae.*

Flor. Mess. — Fruct.

β. Jun. — β. Sept.

Habit. in pratis, paludosis, montosis, Germ. in Hass. infer. Hanov. Siles. Megap. Francon.

4. Poa Gmelini. Paturin de Souabe. Schwäbischес Rispengras. ***

Poa panicula diffusa, spiculis trifloris, glabris, compressis, culmo adscendente, foliis glabris, angustis, nervosis et molibus. Gmelin. tub. p. 332. Roth. 2. p. 124.

Culmus inferne decumbens, dein adscendens, teres, glaber, gracilis. Folia plana, interdum canaliculata, glabra, angusta, nervosa, mollia. Vaginae glabrae. Panicula ex viridi, argenteo et spadiceo nitens, diffusa. Spiculae compressae, glabrae, triflorae.

Hab. Haud procul Tubing.

5. Poa scabra. Paturin rude. Rauhes Rispengras. ***

Poa dubia, panicula diffusa, spiculis ovatis, obtusis, subtrifloris, basi pubescentibus, vaginis foliisque scabris. Leers. 28. t. 6. f. 5. (exc. cit. Hall.)

scabra. Ehrh. gram. 72. Hoffm. 41. et ic. 10. Fl. d. Wett. 1. 107.

trivialis. Curt. Lond. 2. n. 15.

Radix perennis, stolonifera, fibrosa. Culmus erectus, teres, striatus, 2 - 4 pedalis, infra pa-

L

1601.

niculam scaber, ad basin interdum radicans, superne ex magna parte nudus, et interdum purpureis, nodis scabriusculis purpureis 3 — 4. Folia plana, latiuscula, glabra, pagina inferiore marginibusque scaberrima, superiore subscabra, radicalia emarcida. Vaginae subcompressae, striatae, scabrae praecipue in nervo dorsali carinante. Ligulae prominentes, longae, obtusae, interdum fissaee. Panicula diffusa, 4 — 6 pollices longa, pyramidalis. Rhachis teres subscabra. Pedunculi quini-deni, alternatim semiverticillati, inferiores longi, angulati, flexuosi, ramosi, patentes, florentes horizontales. basi incrassato-callosi. Spiculae inaequaliter pedicellatae, subnutantes, ovato-obtusae, vix ultra lineam longae, lineam dimidiata latae, virides, aut violaceo-aut purpureo tinctae. Gluma calycina valvulis ovato-acutis, dorso scabro, exteriore majore. Glumae corollaceae 2 — 3, dorso aut pubescente aut fere glabro, basi villosae, valvula exteriore nervosa, interiore nervo marginali praedita. Squamulae 2 lanceolato-acutae. Antherae violaceae, aetate pallidae.

Flor. Praer. — Therm. *Matur.* Therm. — *Vend.*
β. Jul. — *β. Aug.* *β. Jul..* — *β. Oct.*

Hab. in pratis humidis, ad paludes, fossas, raro in graminosis-siccioribus. *Germ.* Herb. Hass. *Wetter.* Hannover.

6. Poa setacea. Paturin sétacé. Borsten-Rispengras. **

Poa panicula erecta, spiculis trisloris glabris, corollis acuminatis, calyce duplo longioribus. Gerard. prov. p. 9 n. II. t. 2. f. 1. culmo recto, locustis trisloris, glaberrimis, calycibus aristatis. Haller helv. n. 1463. Scheuchz. app. II. n. 49.

triflora, Moench. meth. 187.

Gerardi. *Allion. pedem. II. n. 2201.*
setacea. Hoffm. 44. Dick. h. s. 144.

Radix perennis, fibrosa. *Culmus erectus*, *teres*, 3 — 4 *pedalis*, laevis. *Folia angusta*, *omnia si siccata sunt involuto-setacea*, *radicalia longissima*. *Ligulae truncatae*. *Panicula diffusa*. *Spiculae semper virides*, *glaberrimae*, *ovato-acutissimae*. *Glumae corollaceae plerumque 3*, *raro 2 aut 4*, *dorso glabro*.

Flor. Flor. — *Mess.*

β. Apr. — *β. Jul.*

Habit. in sylvaticis, graminosis. Gall. in Dep.
du Var, des Bouches du Rhône, des basses Alpes,
de la Vaucluse. — Germ. in Hass. infer. Nassau.
Hannov. —

7. *Poa strigosa*. Paturin maigre. Mageres Rispengras. **.

Poa strigosa, *panicula coarctata diffusa*, *spiculis ovatis subtrifloris*, *culmo erecto laevi*, *foliis angustis, caespitosis*. Hoffm. 44.

Radix annua, (?) *fibrosa*, *fusca*. *Culmi interdum inferne curvati*, *erecti*, *laeves*, *teretes*, *saepe ad basin ramosi*, 1 — 2 *pedes alti*, *solitarii et caespitosi*, *tenues*, *fere filiformes*, *inferne paululum incrassati*, *nodis 2 — 3 parvis*, *purpureis*, *internodioque supremo longissimo ad dimidiam partem nudo denati*. *Folia radicalia caespitosa*, *virentia*, *erecta*, *omnia angusta*, *glabra*, *convoluto-setacea*, *saepe recurva*, *rigidiuscula*, 1 — 6 *pollices longa*. *Vaginae glabrae*, *laeves*, *ramorum autem juniorum sursum scabriuscule et compressae*. *Ligulae breves obtusae*. *Panicula 1 — 2 uncialis*, *rigidiuscula subcoarctata*, *diffusa*, *ante et post anthesin contracta*. *Pedunculi ramosi*, *scabri*, *raro laeves*, *terni*,

quaterni semiverticaliter erecti, semiverticillatim alterni. *Spiculae* ovatae, juniores laete virides, aetate ex viridi-sordide purpurascentes. *Glumæ calycina valvulis nervosis*, versus apicem scabriusculis. *Glumæ corollaceæ 2-3*, *valvulis nervosis*, basi subvillosis.

An varietas angustifoliae?

Flor. — *Mess.*

& Apr. — *& Jul.*

Habit. in siccioribus, arenosis agris, depressis et elatis. *Germ.* — *Gall.* — in nostro Departem. prope Moguntiacum in Arenosis (dem Sande) et agris arenosis.

8. *Poa angustifolia*. Paturin à feuilles étroites. Schmal-blätteriges Rispengras. *

Poa angustifolia; panicula diffusa, spiculis quadri-floris pubescentibus, culmo erecto, tereti. Linn. ed. Reich. 1186. ed. Gil. 3: p. 86. s. v. ed. Pers. 116. *Flor. suec.* 77. 81.

panicula diffusa, spiculis quadri-floris pubescentibus, foliis radicalibus convolutis filiformibus, vaginis glabris; ligula brevi truncata. Roth. I. 41. 2. 112.

spiculis ovato-oblongis, foliis subulatis. Fl. lapp. 52.

foliis duris convolventibus, locustis quadri-floris villosis. Hall. helv. 1460.

trivialis. Scopoli. I. 69. conf. supra triv.

Gramen pratense paniculatum majus, angustiore folio. C. Bauh. pin. p. 2. pr. 5. Tourn. 522. Scheuchz. agr. p. 178.

t. 3. Buxb. hal. p. 144. Moris. hist. 3. s. 8. t. 5. f. 19. Dill. giess. p. 178. Mapp. 133. Rupp. jen. p. 311. Hall. goett. p. 45. *paniculatum medium*, angustiore folio. Scheuchz. agr. 181. *paniculatum majus*, foliis praeter culmum angustioribus, in culmo latioribus. Scheuchz. agr. 193. Lamarck. 1179. 13. Wiggers. prim. p. 8. Lestib. 221. Scholl. barb. n. 70. Pollich. I. 85. Zinn. goett. p. 64. Dalib. par. 28. Boehm. lips. n. 631. Gmelin. sib. I. p. 104. n. 37. Murr. prodr. p. 41. Goetian. h. 43. fl. 341. Nonne erf. p. 281. Plan. erf. p. 55. Dietr. I. p. 97. Berg. frt. 322. Nekker. gallob. p. 54. Gmelin. tub. p. 22. Fl. d' Wett. I. 106. Reich. frt. 16. Moench fl. n. 71. Meth. 187. Hoffm. 43. Leyss. hal. n. 90. Matuschka. I. 55. Panz. 12 329. Grimm. isen. p. 264. Delarbre. 153. Oestr. fl. 1. 59. Wibel. w. 112. Krock. sil. I. 140.

Radix perennis, subrepens, fibrosa, fusca. *Culmi* 8 pollices — 3 pedes longi, glabri, tenues, graciles, foliati, teretes, aut compressiusculi, laeves, basi saepe incurvati, dein erecti, stricti, firmi, nitidi, nodis 4 - 5 purpureis parvis praediti. *Folia* plerumque glabra, raro vero superiore pagina laevi pubescentia, obtuse mucronata, nervo albido dorsali carinata, laete viridia; *radicalia* 2 pollices — $1\frac{1}{2}$ pedem longa, aetate involuto-siliformia, scabriuscula, explanata 1 - raro $1\frac{1}{2}$ lineam lata; *culmea* breviora, 2 - 3 pollices longa, 1 raro 2 lineas lata, striata, erecta, non raro undulata. *Vaginae* laeves, respectu foliorum longae, striatae, glabrae, *ramorum* planae, scabrae. *Ligulae* albae, breves, obtusae. *Panicula* 3 - 6 pollices longa, erecta, angusto-pyramidalis; laxa, ante anthesin contracta, postea

autem patentissima. *Rhachis* inferne laevis. *Pedunculi* plerumque quini aut seni, raro 2 - 4 alternatim semiverticillati, non raro subflexuosi, ramosi, longi, scabri, rarissime laeves, in maturitate deorsum flexi. *Spiculae* pallide virides, marginibus valvularum argenteis, raro ex violaceo tinctae, ova-to-lanceolatae, compressae, dense congestae, lineam dimidiata latae, lineam unam longae. *Gluma calycina* valvulis ovatis, acutis, carinatis, dorso scabris, marginibus argenteis. *Glumae corollaceae* plerumque 4 — nonnunquam 3 aut 5, *valvula exteriore* ovato-acuta, margine argenteo, dorso basique villosa (3). *Squamulae* basi connatae, acutae. *Antherae* purpureae, aetate flavescentes. *Stigmata* alba, plumosa.

Flor. Flor. — *Mess.* Mess. — *Fruct.*

β Apr. — β Jul. — β Jun. — β Sept.

Habit. in pratis, pomariis, pascuis, versuris, dumetis, tot. fere *Germ.* et *Gall.* in nostro Depart. prope Lautern; Werstadt; Oppenheim; Alzey; Maguntiacum, in locis graminosis prope portam Münster; Weissenau; Zahlbach; dem Sande. —

9. *Poa divaricata*. Paturin étalé. Sperriges Rispengras. ***

Poa divaricata, panicula, patula ramis geminatis, divaricatis, spiculis 3 - 4 floris. Goiani, illustr. p. 4. t. 2. f. 1. Moench.meth. 188. Hoffm. 47.

(3) Villi, pubes et lanugo glumarum corollacearum signa dubia praebent. In plurimis speciebus ita praeditis tamen in una eademque panicula, imo spicula, non raro nec villos, nec pubem, nec lanuginem baseos vidi. —

Radix annua, fibrosa. Culmi erecti, laeves, glabri, 6 - 10 pollices alti, nodis 4 - 5 fuscis. Vaginae glabrae. Ligulae oblongae, lanceolatae, fissae. Folia convoluta, saepe incurva, inferiora angustissima. Panicula patula, pedunculis, et pedicellis capillaribus geminatis, divaricatis. Pedicelli versus apicem incrassati. Spiculae oblongae, virides. Gluma calycina valvulis obtusis minimis. Glumae eorollaceae 3 aut 4. Antherae fusco-purpureae.

Flor. Praer. — Therm.

β. Maj. — β. Aug.

Habit. in apricis, siccis, Gall. meridionalis; Germ. in Hass. prope Marburg.

10. *Poa pratensis*. Paturin des prés. Wiesen-Rispengras. *

Poa pratensis panicula diffusa, spiculis quinquefloris, glabris, culmo erecto tereti.

Linn. ed. Reich. I. 186. ed. Gil. 3.

86. s. v. ed. Pers. 116. fl. suec. 76. 82.

panicula diffusa, spiculis subquinquefloris, foliis planis, vaginis scabris, ligula oblonga acuta. Roth. I. p. 42.

2. 113.

panicula diffusa, spiculis trifloris, glabris, culmo erecto. Sauv. p. 36.

Berg. frc. 322. Boehm. lips. n. 632.

Zinn. goett. p. 65. Nonne erf. p. 282.

panicula diffusa, locustis trifloris, glabris. Hall. helv. n. 1465.

spiculis ovatis, compressis muticis.

Fl. lapp. 51. hort. cl. 27. Roy.

Iugdb. 61.

Gramen pratense paniculatum majus latiore folio —

Poa Theophrasti. — C. Bauh. p.

p. 2. Tourn. 521. Buxb. hal.

p. 143. Scheuchz. agr. p. 177.
t. 3. f. 17. A. Mapp. 133. Volck.
norimb. p. 197. Rupp. jen. p.
311. Hall. goett. p. 45.
paniculatum maximum, Dill. giess.
p. 70.

vulgatius. Magn. bot. 113. hort. 90.

Wilke gryph. n. 48. Lamarck. 1179. 7. Dalib.
par. 27. Gmelin. tub. p. 22. Nekker. gallo. p. 55.
Curt. Lond. 2. n. 14. Plan. erf. p. 55. Goian. hort.
44. fl. 122. Wigg. prim. p. 8. Fl. d. Wett. I. 106.
Schrink. I. 342. Murr. prodr. p. 41. Scopol. I. 70.
Jacq. vind. p. 16. Hoffm. 42. Leyss. hal. n. 91. Poll.
I. 87. Reich. frc. 17. Grimm. is. p. 264. Matusch. k.
I. 50. Hoffm. 42. Willden. pr. n. 152. Panz. 12.
330. Moench. hass. n. 72. Dietr. I. 97. Oestr. flor.
I. 59. Wibel. w. 112. Krock. I. 141. Weig. pom.
n. 60. Moench. m. 188. Doerr. nass. p. 27. Lestib.
121. Scholl. barb. n. 91. Delarbre. 153. (Plures
autem sub nomine triviali *pratensis*, *scabram* de-
scripterunt.).

Radix perennis, subrepens, fibrosa. *Culmi*
striati, erecti aut basi incurvi, teretes, laeves, gla-
bri, foliati, nodis 5-7, purpureis, infimis valde
approximatis praediti, 1-4 pedes alti. *Folia* plana,
lineam $1\frac{1}{2}$ -3 lata, 2-7 pollices longa, mucronata,
scabriuscula, laete viridia. *Vaginae* striatae, sca-
briusculae, glabrae. *Ligulae* obtusae, saepe fissae.
Panicula pyramidalis, 3-10 pollices longa, laxa,
primum contracta, florens patens, aetate divarica-
tissima. *Rhachis* ad semiverticillos pedunculorum
plerumque gibboso-curvata. *Pedunculi* 6-9 et plu-
res, alternatim semiverticillati, inaequales, angula-
ti, scabri, basi incrassato-callosi. *Spiculae* lineam
 $1\frac{1}{2}$ longae, dimidiam latae, ovato-obtusiusculae,
compressae, ex pallido viridi et albo variegatae.

Gluma calycina valvulis ex ovato-lanceolatis, acutis, dorso carinato, scabro, superiore minore, angustiore. Glumaè corollaceae plerumque 3, interdum 2, 4, 5; valvula exteriore ovato-lanceolata, carinata, dorso plerumque glabro aut vix pubescente, basi autem lana plus minusve manifesta cohaerente vestita, 5 nervia, nervo nempe dorsali, 2 marginalibus, et in utroque latere inter dorsalem et marginalem unus. Antheræ violaceæ, aetate pallidae. Stigmata alba plumosa.

Flor. Praer. — *Therm.* Matur. Messid. — Vend. β. Mai. — β. Aug. — β. Jun. — β. Oct.

Habit. in pratis, tam siccis, quam humidis, pascuis, agris, ad fossas, vias, in pomariis t. f. *Gall.* et *Germ.* — secundum Pollich prope Lautern, planta vero a Pollich descripta, *scabram esse* videtur.

11. *Poa annua*. Paturin annuel. Immerblühendes - Rispengras. *

Poa annua, panicula diffusa, angulis rectis, spiculis obtusis; culmo obliquo compresso.

Linn. ed. R. 1. 187. ed Gil. 2. 87. s. veg. ed. Pers. 116. Fl. suec. 75. 83.

panicula diffusa patentissima, spiculis subquinquefloris, foliis planis, vaginis glabris, ligula brevi acuminata. Roth. I. p. 42. 2. 115.

culmo infracto, panicula triangulari, locustis trifloris glabris. Hall. helv. 1466.

muralis Wibel. w. 114.

Gramen pratense paniculatum minus (album). C.

Banh. pin. p 2. theatr. 31. Tourn. 521.

Scheuchz. agr. p. 189. t. 3. f. 17. E. Mag-

nol. bot. 133. h. 90. Mapp. 134. Dill.

giess. p. 53. Rupp. jen. p. 311. Volck.

nor. p. 197. Haller. goett. p. 45.

minus vulgatissimum. Raj. hist. 1285.

caninum supinum minus. C. Bauh. pin. p. 13.

Lamarck. 1179. 8. Dalib. par. 28. Wilke gryph. n. 49. Poll. I. 88. Zinn. goet. p. 65. Curt. lond. I. n. 2. Dicks. h. s. 14. 5. Wigg. prim. p. 8. Gmelin. sib. I. p. 102. n. 34. et 36. Gmelin. tub. p. 22. Nekker. gallob. p. 53. Weig. pom. n. 61. Goitian. h. 44. fl. 122. Boehm. lips n. 629. Scholl. barb. n. 72. Reyg. ged. I. p. 43. n. 5. Leyss. hal. n. 92. Stillingfl. misc. t. 7. Schrank. I. 343. Grimm. is. p. 264. Sauv. 36. 37. n. 58. Berg. frc. p. 322. Huds. angl. 34. Reich. 17. Moench. fl. n. 73. Meth. 188. Scop. I. 71. — Willden. prodr. p. 41. Matuschk. I. 56. Hoffm. 45. Jacq. vind. p. 16. Panz. 12. 332. Doerr. nass. p. 26. Leers. 29. t. 6. f. 1. Delarbre. 153. Oestr. fl. I. 59. Wibel. w. I. 114. Krock. I. 142.

Radix perennis, fibrosa. *Culmi* digitales, pedales, et ultra pedales, geniculato-declinati; et oblique adscendentes, raro erecti, laeves, glabri, compressi, teneri, foliati, inferne saepe ramosi, nodis 3-4 purpurascens. *Folia* carinata, plana, interdum ad basin undulata, margine et nervo dorsali paululum carinante scabriuscula, praecipue versus apicem glabra, mollia, obtuse mucronata, lineam $1\frac{1}{2}$ lata, 2-5 pollices longa, *radicalia* caespitosa. *Vaginae* compressae, glabrae, carinatae, striatae, margine argenteo. *Ligulae* oblongae, obtusiusculae aut acutae. *Panicula* subunilateralis, subpyramidalis, patentissima *Rhachis* laevis, uno latere canaliculata. *Pedunculi* ramosi, laeves, plerumque gemini subalterni, raro solitarii aut terni, angulati, glabri, horizontales, angulum rectum cum rhachi facientes, post anthesin, paululum deorsum reflexi. *Spiculae* ovato-lanceolatae, compressae, obtusae, 2 lineas longae, vix dimidiatae, e viride et albo-variegatae, apice purpurascentes. *Gluma calycina*

valvulis ovatis, dorso vix scabris, inaequalibus. *Glumae corollaceae* 3-7, plerumque vero 3-5, *valvula* exteriore dorso et basi per lensem pubescente, margine versus apicem obtusum lacero. *Squamulae* ovato-acutae, interdum fissae. *Antherae* flavae, demum pallidae. *Stigmata* alba, plumosa.

Var. Prope portas Gauthor et Neuthor inque munitis varietatem observavi, fere bipedalem *culmo* angustiore, *filiformi* (compresso), *panicula* pauciflora.

Flor. et *Matur.* per totum annum, imo hyeme non nimis duro.

Habit. in plateis, cultis et incultis, hortis, ad vias, margines agrorum et sylvarum, tot. fere *Gall.* et *Germ.* — circa Moguntiacum, sicuti in nostro Depart. frequentissimum fere Gramen.

12. *Poa humilis.* Paturin nain. Kleinstes Rispengras. **

Poa humilis, panicula contracta angulis acutis, spiculis coloratis, culmo compresso, ligula brevi truncata. Ehrh. gram. 115. Hoffm. 45.

Differt ab *annua*:

Culmo foliisque brevioribus, rigidioribusque; *Ligula* breviore truncata; *panicula* contracta, angulis acutis; *spiculis* magis coloratis paululum majoribus.

Flor. et *Habit.* passim cum priore. Minus frequens.

13. *Poa sylvatica.* Paturin des bois. Wald-Rispengras. **

Poa sylvatica diffusa, spiculis subquinquefloris, glumis acutissimis. Poll. I. p. 83.

Roth 1. 43. 2. 117. Oestr. fl. 1. 59.

Krock. sili. 1. 135.

trinervata. Hoffm. 42. Ehrh. gram. 36. Flor. dan. t. 1145.

Radix perennis, fibrosa. *Culmi* caespitosi, erecti, 2-3 pedales et altiores, glabri, laeves, glauco-virides, nodis 4 purpureis. *Folia* plana, mucronata, laete viridia, aut rubella, 1 pollicem-sesquipedem longa, ad basin 2-9 lineas lata, sursum laevia, deorsum scabriuscula, nervo dorsali albicante praedita. *Vaginae* glabrae, striatae, retrorsum scabriusculae. *Ligulae* lanceolatae, duas lineas longae (4). *Panicula* primum contracta, densa, in anthesi quam maximie divergens. *Pedunculi* gemini, alternatim positi, raro plures, versus apicem ramosi, *pedicellis* approximatis. *Spiculae* ex viridi et albo variegatae, interdum versus apicem purpurascentes, ovato-oblongae, compressae, acutae, 3 lineas circiter longae, 1-fere 2 lineas latae. *Gluma calycina* *valvulis* angustis, ex ovato-lanceolatis, carinatis, acutis; *exteriore* majore, parum ultra lineam longa; *interiore* parum minore. *Glumae corollaceae* 4-6, *valvulis exterioribus*, glabris, trinerviis, ovato-lanceolatis, acutissimis, 2 lineas longis. *Antherae* flavae.

Flor. Praer. — Therm. — ♂. Maj. — ♂. Aug.

Habit. ad vias sylvarum, in sylvis elatis, dumetis, montibus lapidosis. Gall. in nostro Depart.

(4) Signa a *ligulis* quidem aut laceris, aut fassis sumta, mihi dubia videntur. *Ligulas* ita descripas non raro integerrimas inveni. Organia tam tenerrima quam *ligulae* et *squamulae* in dissectione plantarum saepe laeduntur, praecipue cum partibus vicinis interdum adglutinata sint.

inter Frankenstein et Hochspeier, circa Neustadt et Steinbach. — *Germ.* in Palatinatu, Hanov. Hanover. Goett. Siles. Bavar. Francon. Austr.

14. Poa serotina. Paturin d'automne. Herbst-Rispengras. ***

Poa panicula diffusa, spiculis subquinquefloris glabris coloratis, culmo erecto tereti. Ehrh. gram. 82. Hoffm. 42.

ripariae Wolf. vid. Hoffm. l. c.

Culmus erectus, teres, 3 - 4 pedalis. *Folia latiuscula*. *Panicula diffusa*, semipedalis. *Spiculae glabrae*, coloratae, 3 - 6 florae, defloratae subfuscæ, apicibus nitidis, luteis. *Gluma calycina valvula exteriore* trinervia.

Flor. Mess. — *Fruct.*

β. Jun. — β. Sept.

Habit. in pratis, ad ripas fluv.; *Germ.* Siles. Saxon. Francon.

15. Poa aquatica. Paturin aquatique. Wasser-Rispengras. *

Poa aquatica, paniculata, diffusa, spiculis sexfloris linearibus, Linn. ed. Reich. I. 184. Gil. 3. 85. s. veg. ed. Pers. 116. *Flor. suec.* 73. 78.

altissima. Moench. meth. 185.

foliis latissimis panicula amplissima, locustis distichis multifloris. Hall. helv. n. 1454.

panicula contracta, spicis ovatis teretiusculis. H. cl. 494. Roy. lugdb. 61.

Gramen aquaticum paniculatum latifolium. C. Bauh. pin. p. 3. Tourn. 523. Moris.

hist. 3. p. 201. s. 8. t. 6. f. 25.

Mapp. 134. Rupp. jen. p. 313.

majus aquaticum. J. Bauh. hist. 2. p. 481.

Iob. ic. 4. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

palustre paniculatum, *altissimum*. C. Bauh.

pin. p. 3. Scheuchz. agr. p. 191.

t. 4. f. 1. Buxb. hal. p. 141.

Dill. giefs. p. 114. Rupp. jen. p. 313.

Volck. norimb. p. 197. Hall.

goett. p. 44.

phalaroides palustre, *arundinaceum*, *radice*

amplissima. Mont. gram. ic. 38.

Lamarck. 1179. 15. Dalib. par. 29. Wilke gryphi.

n. 46. Wibel. w. 112. Goian. h. 43. fl. 122. Weig.

pom. n. 58. Leers. 26. t. 5. f. 5. Flor. dan. t. 920.

Roth. 1. 41. 2. p. 111. Schrank. 1. 338. Scholl. barb.

n. 68. Reyg. ged. 1. p. 41. Curt. loud. 5. n. 56. Will-

den. prodr. n. 150. Hoffm. 41. Gmelin. tub. p. 21.

Matuschk. 1. 54. Krock. sil. 1. 131. Murr. prodr. p.

41. Poll. 1. 82. Oestr. flor. 1. 57. Berg. frc. 322.

Gmelin. sib. 1. p. 105. Leyss. hal. n. 88. Nekker.

gallob. p. 72. Doerr. nass. p. 27. Fl. d. Wetter. 1.

104. Reich. 16. Grimm. isen. p. 263. Moench. hass.

n. 69. Zinn. goett. p. 64. Wigg. prim. p. 7. Müll-

ler. fl. Fridrichsth. p. 16. Boehm. lips. n. 633. Scop.

1. 73. Lestib. 221. Jacq. vind. p. 15. Panz. 12. 326.

Plan. erf. p. 55. Dietr. 1. 97. Delarbre. 153.

Radix perennis, *repens*, *fibrosa*. *Culmus erec-*
tus, *4-6 pedalis*, *ex tereti obscure compressus*, *stri-*
atus, *glaber*, *laevis*, *ad inferiores nodos saepe ra-*
dicans, *supra radicem non raro crassitie pollicis*,
nodis 8-12 purpureis praeditus, *foliatus*, *et ex parva*
parte nudus. *Folia plana*, *lanceolata*, *mucronata*,
laevia, *nervo autem dorsali carinante et marginibus*
albidis duris scabra, *laete viridia*, *glabra*, *basi ma-*
cula flava *aut fusca triangulari notata*, *striata*, *4-9*

lineas lata, 10 pollices — 2 pedes longa. *Vaginae* laeves, glabrae, compressiusculae, carinatae, laete virides. *Ligulae* obtusae, dente dorsali intermedio lanceolato. *Panicula* speciosa, palmaris — sesquipedalis, ad basin attenuato-contracta, in florescentia versus apicem sensim latior et laxior, nonnunquam inferne bracteata, *bractea* amplexante lanceolato-acuminata, membranacea, viridi. *Rhachis communis* inferne compressiuscula, superne angulato-sulcata, laevis, glabra. *Pedunculi* inferne laeves, supra medium scabri, ramosi, aut triquetri, aut angulati, glabri, erecti, inferne adpressi, superne magis semi-verticales, imo nutantes, quaterni-seni, articulis alternis *Rhacheos communis* inserti, valde inaequales, unus aut alter lateralis valde crassus, et longissimus. *Pedicelli* breves, non raro flexuosi, apice obliquo, latere dorsali gibboso. *Axis glumarum* flexuosus, ad insertionem glumarum corollacearum nodosus. *Spiculae* 3-4 lineas longae, 1- $1\frac{1}{2}$ lineam latae, ovato-oblongae, obtusae, laeves quidem sed rigidae, aut paululum asperae, compressiusculae, juniores ex viride-flavicantes, aetate spadiceae ac stramineae. *Glumae calycinae valvulis*, ovato-lanceolatis, acutis, carinatis, laevibus, inaequalibus; *inferiore* nempe minore, et angustiore, valvulis corollaceis breviore. *Glumae corollaceae* plerumque 8-10, rarissime plures, ad basin paniculae saepe 6-7, *valvula exteriore* lanceolata, obtusa, nervis plerumque septem elevatis, paululum asperis praedita (denticulos nunquam vidi). *Squamulae* truncatae. *Antherae* purpureae. *Stigmata* alba plumosa.

Flor. Mess. — *Fruct.* *Matur.* *Vend.* — *Brum.*
β. Jun. — *β. Sept.* — *β. Sept.* — *β. Nov.*

Habit. ad salinas et ripas, inque piscinis, fossis, paludibus, fluviis lente fluentibus, pratis uidis, tot fere *Gall.* et. *Germ.* — in Dep. Montis Jovis circa

Moguntiacum in fossa primaria munimentorum, prope portam Munster; haud procul Bingam in paludibus ad semitam versus Drechtingshausen, prope Lautern etc.

16. *Poa alpina*. Paturin des Alpes. Alpen-Rispengras. ***

Poa alpina, panicula diffusa, ramosissima, spiculis 6 floris cordatis. Linn.ed.Reich. I. 185. ed. Gil. 3. p. 85. s. veg. ed. Pers. 116. Fl. sv. 79.

panicula speciosa, spiculis trilloris apice retusis, valvulis corollae exterioribus ovatis, basi et ad oras nitide pilosis, interioribus ciliatis. Braune salisb. 67.

latifolia, culmo debili, locustis quadrifloris, calycis glumis aequalibus, floralium dorso sericeo. Hall. helv. n. 1456.

Gramen alpinum paniculatum majus, panicula speciosa, variegata. Scheuchz. agr. p. 186. app. p. 16. t. 3.

latifolium, panicula laxa foliacea, foliolis in panicula paucioribus et mage crispis. Scheuchz. agr. p. 22. t. 4. f. 14.

paniculatum elegans, paniculis ex spadiceo, viridi et argenteo variegatis. Scheuchz. prodr. t. 3. ? conf. trivial.

montanum spica speciosa, graminea. Scheuchz. it. alp. p. 38. t. 4. f. 2.

Lamarck. 1179. 21. Dalib. par. 28. Schrank. I. 339. Moench. meth. 186. Hoffm. 41. Hopp. pl. rar. cent. I. Flor. dan. t. 807. Panz. 12. 327. Oestr. fl. I. 59. Krock. I. 134.

Radix

Radix perennis, fibrosa. *Culmus* teres, debilis, gracilis, foliatus, ad paniculam fere tectus, 6 pollices-pedem longus, raro ultrapedalis, glaber, laevis. *Folia* pauca, glabra, mollia, 1-1½ pollicem longa, 1-2 lineas lata. *Panicula* nec diffusa nec ramosissima, sed densa coarctata, multiflora, vix ultra pollicem longa, florens 8-10 lineas circiter lata. *Pedunculi* geminati, aut solitarii, semiverticillatim alterni, parum ramosi, in anthesi patentiusculi, cum spiculis 5-10 lineas longi. *Spiculae* quasi imbricatae, breviter pedicellatae, non cordatae, sed ovato-obtuseae, majusculae, pulcherrime ex viridi-violaceo-flavo ac albo variegatae. *Gluma calycina valvulis* subaequalibus ovatis, acutis; *exteriore* paululum majore. *Glumae corollaceae* 4-8, *valvula exteriore* margine ciliato, dorso viloso, nervo dorsali albido praedita; *interiore* margine ciliato.

An varietas Poae trivialis?

Var. Vivipara; spiculis quarum glumae superiores corollaceae in foliola involuta, recurva, uncialia, basi fusco-purpurea excrescunt.

Flor. Praer. — Thern. — B. Maj. — B. Aug.

Habit. in montosis, alpinis, *Gall.* in Dep. de la Drome; des hautes Alpes; de l'Isere; du Var; des basses Alpes; du Rhône; de la Loire. — *Germ.* in Bavar. Austr. Salisb. —

17. Poa distans. Paturin distant. Entferntes Rispengras. **

Poa distans paniculae ramis subdivisis, floribus quinquefloris, flosculis distantibus, obtusis. Linn. ed. Reich. 1. 192. ed. Gil. 3. 90. s. v. ed. Pers. 118. Mont. 32. Golian. illustr. 44. Wirth. 2. t. 25. Fl. d. Wett. 1. 110. Roth. 3. p. 565. Oestr. fl. 1. 60.

M

salina panicula diffusa, spiculis septemfloris, linearibus, culmo basi subrepente, spicularum glumis omnibus obtusissimis. Poll. 1. 89. Hopp. herb. c. 2. 12. Roth. 1. p. 43. 2. p. 119. Leyss. hal. n. 93. et Abh. d. Hall. N. G. 1. p. 366. Moench. m. 185. Schrank. 1. 338. Ehrh. gram. 13. praecipue quoque Hoffm. 44. Oestr. fl. 1. 59. Krock. sil. 1. 138.

maritima panicula subspicata, spiculis secundis, coarctatis, foliis convolutis, sarmentis repentibus. Roth. Beitr. 1. p. 6. Tent. 1. p. 43. 2. p. 121. Fl. dan. 251. Dicks. h. s. 11. 2.

arenaria. Retz. scand. 120.

retroflexa. Curt. lond. n. 61.

Aira aquatica. var. β . *multiflora*. Hudson. fl. angl.

Radix perennis, repens, fibrosa, albida. *Culmus* basi inclinatus, aut decumbens et radicans, ramosusque, dein ad maximam partem plerumque oblique, raro recte, ascendens, 2 — ultra-tripedalis, teres, glaber, laevis, nodis 4 purpureis, et (uti *Folia* et *Vaginae*,) glauco-viridis. *Folia* glabra plana, mucronata, pagina superiore magis striata, inferiore autem scabra, 3-7 pollices longa, 2 - 3 lineas lata. *Vaginae* glabrae, striatae, laeves. *Ligula* brevis, obtusa. *Panicula* speciosa digitalis-pedalis, primum contracta, demum patentior, aetate divaricata. *Pedunculi* plerumque quini, — septeni, raro gemini aut terni, quaterni, alternatim in semiverticilos collecti, horizontalis, post anthesin vero deflexi, laeviter flexuosi, scabriusculi, subdivisi. *Spiculae* subteretes, sublineares, obtusiusculae, 2 - 4 lineas longae, lineam dimidiata — fere unam latae, e viridi, albido et spadiceo variegatae. *Gluma calycina* valvulis inaequalibus; *superiore* majore fere lineam lon-

ga, paululum corollaceis minore, ovato-oblonga, obtusiuscula, carinata; *inferiore* duplo minore, acutiore, angustiore. *Glumae corollaceae* 3-9, raro 2, sessiles, post anthesin autem remotiores et distantes; *valvula exteriore* integerrima (nunquam incisa, aut lacera uti *glumae corollaceae* *Airae* aq. L.) glabra, laevi, ovato-oblonga, obtusissima, marginibus argenteis, versus apicem fuscis; *interiore* planiuscula, pubescente, ciliata, margine colorato subinflexo. *Antherae* pallido flavae, aetate albidae. *Stigmata* alba plumosa.

Flor. Praer. — *Therm.* *Matur.* Mess. — *Fruct.* *β. Maj.* — *β. Aug.* *β. Jun.* — *β. Sept.*

Habit. in fossis, piscinis, paludibus, agris et pratis humidis, ad littora maris et salinas. *Gall.* — in Depart. montis Jovis prope Creuznach, Dürckheim, Worms, Lambsheim. — *Germ.* in Saxon. Brem. Austr. Wetter. Hannover. Siles. Megap. Bavar. Hass. Thuring. Ratisb.

18. Poa eragrostis. Paturin élégant. Schönstes-Rispengras. ***

Poa eragrostis, panicula patente, pedicellis flexuosis, spiculis serratis decemfloris, glumis trinerviis. Linn. ed. Reich. I. 188. ed. Gil. 3. 88. s. veg. ed. Pers. 117.

panicula ramosa spiculis multifloris. Sauv. 37. (exc. Synon.)

locustis distichis, decemfloris, calycibus acutis. Haller. helv. n. 1450.

Gramen paniculis elegantissimis minimum. Scheuchzer. agr. p. 197. t. 4. f. 2. Tourn. 522.

elegantissimis majus, locustis pureo-spadiceis minoribus.

Scheuchz. agr. 193. t. 4. f. 13.

M 2

1599.

amoris alterum, paniculis minoribus, et angustioribus, magisque sparsis.
Raj. syll. pl. eur. p. 136. hist. 2.
p. 1275.

phalaroides sparsa Brizae panicula, minus.
Barrel. obs. 1217. t. 44. f. 2. Mont.
pr. p. 45. Tourn. 522.

Lamarck. 1179. 22. Schreb. graes. 2. p. 81. t. 38.
Jacq. vind. p. 16. Goian. hort. 44. flor. 122. Hopp.
herb. c. 2. 11. Roth. 2. 118. Gmelin. sib. I. p. 106. n.
40. Ellwert. baruth. p. 7. Dietr. 1. 99. Hoffm. 45.
Cavanill. pl. hisp. t. 92. Oestr. flor. 1. 59.

Radix annua, fibrosa, alba. *Culmi* aut inferne decumbentes, et geniculato-adscendentes, aut fere toti prostrati, raro a basi erecti, ad dimidiam partem circiter nudi, striati, debiles, laeves, nodis 2-4 purpureis, internodio summo longiore donati, inferne saepe ramosi, digitales — ultra pedales. *Folia* vix 1-1½ lineam lata, pollicaria-sesquipollicaria, plana, nervosa, pagina superiore villosa, et in marginibus scabra, inferiore glabra, laevia. *Vaginae* pilosae, laeves, teretes. *Ligulae* breves, fissae. *Panicula* pulchra, 2-5 pollices longa, ramosissima, laxa, ovalis, oblonga, densiuscula. *Pedunculi* filiformes, plerumque solitarii, alterni, a basi ramosi, saepe flexuosi. *Pedicelli* breves, capillares. *Spiculae* 1-3 lineas longae, unam circiter lineam latae, juniores ovales, dein lanceolatae, fere lineares, compressae, acutae, ex viridi et purpureo aut violaceo variegatae. *Gluma calycina vulvulis* inaequalibus, acutiusculis, corollaceis brevioribus. *Glumae corollaceae* 5-15, *valvula exteriore* ovata, laevi, carinata, trinervia, nervis viridibus, acuta, per lentem vero obtusa, marginibus nec scariosis; *interiore* ovali, per lentem truncata, crenata. *Squamulae* ovales. *Antherae* albidae.

Flor. Mess. — *Fruct.* *Matur.* *Therm.* — *Vend.*
β. Jun. — *β. Sept.* *β. Jul.* — *β. Oct.*
Habit. in cultis et incultis, sterilibus, lapidosis,
arenosis, muris, ruderatis, hortis : *Gall.* meridion.
et prope Lutet. paris. *Germ.* in Austr. Bavar. Ra-
tisb. Baruth.

19. *Poa megastachya.* Paturin-Amourette.
Großsähriges-Rispengras. ***

Briza eragrostis spiculis lanceolatis, flosculis viginti.

Linn. ed. Reich. I. p. 195. (excl. syn.
Hall.) ed. Gil. 3. p. 92. s. v. ed. Pers.
I¹⁹.

oblonga. Moench. meth. 185.

panicula spicata, spiculis lanceolatis. Guett.
obs. I. p. 163.

An *Poa brizoides*, Wohl. suppl. fl. hal. n. 3. var.
huius aut rhenana?

Uniola calycibus diphyllis, spiculis ovato-lanceo-
latis. Gron. virg. 136.

Gramen siliceum paniculis integrum. Mor. hist. 3.
p. 204. s. 8. t. 6. f. 53. Boccon.
pl. rar. sic. 63.

paniculis elegantissimis, sive *Eragrostis*,
majus. C. Bauh. pin. p. 2. theatr. 25.
Tourn. 522. Scheuchz. agr. p. 194.
t. 4. f. 4. Moris. hist. 3. p. 204.
s. 8. t. 6. f. 22. Sauv. 310. Dill.
giess. p. 130. Mapp. 133. Rupp.
Jen. p. 312.

paniculatum sativum. Buxbaum. hall. p. 142.
Heragrostis. Tabern.
ic. 204. Krb. 522. C.
philaroides. Magn. bot. 114.
hort. 91.
elegans. Raj. hist. 2. p. 1274.

1538

amoris dictum. J. Bauh. hist. 2. p. 470.

amourettes. Clus. hist. 2. p. 218.

Eranthemum seu *Eragrostis phalaroides* pa-
niculatum, multiplici tenui
Brizae panicula. Barrel. obs.
1215. ic. 743. Mont. prodr.
p. 45. Seguier. ver. 3. p. 150.
palustre tenui et sparsa Brizae
panicula. Barrel. obs. 1216.
ic. 743.
supinum, congesta Brizae pani-
cula. Barrel. obs. 1214.
ic. 744.

Schreber. graes. 2. p. 83. t. 39. Goian. hort. 46.
fl. 123. Lamarck. 1178. 4. Hopp. pl. var. c. 2. 13.
Roty. I. 40. 2. 110. Dietr. I. 100. Leyss. hal. n. 87.
Hoffm. 47. Krock. I. 148. t. 27. Lestib. 220. De-
larbre. 27. Oestr. fl. 58.

Radix annua, fibrosa. *Culmi* prostrati, dein
geniculato - adscendentibus, raro erecti, striati, ad
basim saepe ramosi, foliati, laeves, glabri, nodis 4-5
purpureis, internodio supremo longissimo, 5 polli-
ces - sesquipedem longi. *Folia* plana, striata, ner-
vosa, margine et praecipue ad basin plerumque vil-
lis longis candidis obsita, in superiore pagina scabra.
Vaginae striatae, laeves, marginibus, ciliatis. *Li-
gulae* loco margo fuscus ciliatus. *Panicula* 1-6 pol-
lices longa, ovata, fere multiflora, rigida, patens.
Rhachis angulata, flexuosa. *Pedunculi* alterni, ge-
minati, aut solitarii, raro plures, ramosi, flexuosi,
ad basim et ad ramifications pilis brevibus instructi.
Spiculae 2-6 lineas longae, parum ultra lineam
latae, ex ovato-lanceolatae, compressae, obtusae,
glabrae, profunde aut glauco-virides, aetate fuscae
vel nigricantes (habitu, uti Scopoli monet, spicu-
larum *Cyperi* *flavescentis*). *Gluma calycina* deci-

dua, membranacea, *valvulis* inaequalibus, acutis, carinatis, dorso scabris, altera saepe valvula corollacea vicina longiore, altera breviore, latiore. *Glumae corollaceae* 7-20, plerumque vero 12-18, inferiores haud raro abortientes, *valvula exteriore* cordato-subventricosa, trinervia, apice obtuso, vix repando, per lentem mucrone brevissimo interdum praedita; *interiore* ovali, apice crenato. *Squamulae* ovales, minimae. *Antherae* crassae, breves, albidæ. *Semen* flavum, rotundum, reticulato-rugosum, ferrugineum.

Var. 1. Spiculis teretiusculis.

2. — brevioribus.

3. foliis glabris.

4. panicula contractiore.

Flor. Praer. — Fruct. *Matur.* Mess. — Vend.

β. Maj. — β. Sept. — β. Jun. — β. Oct.

Habit. in agris, arenosis, muris, ad vias *Gall.* — in Dep. du Puy du Dome, de l'Herault; du Bas- et du Haut-Rhin. — *Germ.* in Saxon. Baruth. Wetter. Thuring. Austr. Carniol. Siles. Ratisb. prope Wiesbaden.

20. *Poa rigida*. Paturin duret. Straffes
Rispengras. **

1623

Poa rigida panicula lanceolata, subramosa, secunda, ramulis alternis, secundis. Linn. ed. Reich. II. 190. ed. Gil. 3. 88. s. v. ed. Pers. 117.

panicula lanceolata, subramosa, floribus alternis secundis. Amoen. ac. 4. p. 165.

spiculis sexfloris linearibus, alternis, rigidis. Ger. prov. 30.

Gramen panicula multiplici. C. Bauh. pin. p. 3. prodr. p. 6. Scheuchz. agr. p. 271. t. 6. f. 2. 3. Magn. bot. 112. hort. 90.

paniculatum minus, radice repente, pani-
 cula duriore. Tourn. 521. Mapp. 136.
 Rupp. jen. p. 310.
 minus vulgare, panicula rigida. Tourn. 522,
 Mapp. 134.
 murorum radice repente. Bauh. pin. 2.
 prodr. 2. Dill. giess. p. 140.
 exile duriusculum in muris et aridis prove-
 niens. Raj. angl. 3. p. 410.
Loliaceum murorum duriusculum, spica
 erecta rigida. Moris. hist. 3. p. 182.
 s. 8. t. 2. f. 9.
 arvense silicina duriore panicula. Barr. ic. 49.
 aliud monspeliense. Magn. bot. 122.

Lamarck. 1179. 18. Roy lugdb. 62. Curt. Lond.
 2. n. 24. Nekker. gallob. p. 54. Goiani. fl. 122.
 Roth. 1. 43. 2. p. 120. Vaill. t. 18. f. 4. Guett.
 stamp. 62. Moench. meth. 187. Gmelin. tub. p. 23.
 Hoffm. 46. Plan. erf. 56. Krock. 1. 144. Lestib.
 222. Oestr. fl. 1. 60.

Radix annua, fibrosa. Culmi erecti, 3 - 6 pol-
lices alti, foliati, rigidi, erecti, interdum vero in-
ferne geniculato-inflexi, dein autem verticaliter
adscendentibus, striatae, teretes, subangulosi, basi ra-
mosi. Folia glauco-viridia, striata, glabra, supra
scabra, $\frac{1}{2}$ - 1 lineam lata, radicalia culmeis angu-
stiora. Vaginae laeves, glabrae, glauco-virides.
Ligulae breves, obtusiusculae, incisae. Panicula
viridis, secunda, rigida, 1 - 2 pollices longa, utrin-
que attenuata. Pedunculi breves, alterni, dichotomi,
flexuosi, striati, angulosi, scabri. Spiculae fere
lineares, alternae, breviter pedicellatae, compressae.
Glumia calycina valvulis subaequalibus, rigidis,
ovato-lanceolatis, acutis, carinatis. Glumae corol-
laceae plerumque 6 - 8, interdum 4 - 12, valvula
sexteriore obtusiuscula, apice membranaceo.

Flor. Praer. — Therm. *Matur.* Therm. — Vend. β. Maj. — β. Aug. β. Jul. — β. Oct. *Habit.* in locis aridis, siccis, sabulosis, montosis, muris; t. fere. *Gall.* rarius in *Germ.* in Siles. Thuring. Wirtemb.

21. Poa compressa. Paturin comprimé. Plates Rispengras. *

Poa compressa, panicula coarctata, secunda, culmo obliquo, coimpressa. Linn. ed. Reich. I. 190. ed. Gil. 3. 89. s. v. Pers. 118. Fl. suec. 74. 84. it. goett. 178.

culmo compresso, declinato, locustis distichis, sexfloris. Hall. helv. n. 1465.

: spiculis ovatis compressis, muticis, panicula secunda coarctata. Act. Holm. 1741. p. 184.

Gramen paniculatum radice repente, culmo compresso. Vaill. par. 91. t. 18. f. 5.

radice repente, culmo compresso, locustis distichis pulchellis. Scheuchz. agrost. p. 198. Hall. goett. p. 44.

loliaceum procumbens, caulis compressis, paniculis rigidiusculis. Mont. ic. 10.

caninum vineale. C. Bauh. p. 11.

Pollich. I. 90. (5) Nonne erf. p. 282. Plan. erf. p. 56. Oestr. Flor. I. 60. Flor. dan. t. 742. Lamarck 1179. 19. Schrank. I. 343. Gmel. tub. p. 23.

(5) *Pollich revera compressam nec rigidam descriptis.* —

Dalib. par. 28. Sow. engl. bot. 365. Jacq. vind. p.
 16. Goian. h. 44. fl. 122. Moench. fl. n. 74. meth.
 187. Scop. 1. 72. Wigg. prim. p. 8. Gmel. sib. 1.
 p. 103. n. 26. Wilke gryph. n. 50. Dicks. h. s. 6.
 1. Roth. 1. 44. 2. 122. Sauv. p. 311. Delarbre 154.
 Grimm. isen. p. 264. Fl. d. Wett. 1.-III. Reich. 17.
 Scholl. barb. n. 73. Nekker gallob. p. 53. Boehm.
 lips. n. 635. Gunn. nor. n. 1004. Leyss. hal. n.
 94. Hudson angl. p. 34. Dietr. 1. 98. Weig. pom.
 n. 62. Zinn. goett. p. 65. Doerr. nass. p. 28. Leers.
 29. t. 5. f. 4. Murr. prodr. p. 41. Vibel. w. 115.
 Krock. 1. 144. Hoffm. 45. Berg. frc. 322. Panz.
 lin. 12. 346. Willd. pr. 157. Lestib. 222.

Radix perennis, subrepens, fibrosa. *Culmi*; 10
 pollices — sesquipedem longi, inferne fere decum-
 bentes, geniculato- et oblique adscendentibus, laeves,
 foliati, glauco-virides, glabri, ad basin non raro ra-
 dicantes et ramosi, compresso-plani, angulis 2 oppo-
 sitis, nodis 4-9 purpureis, inferioribus valde appro-
 ximatis. *Folia* plana, superiora saepe complicata,
 glabra, carinata, glauco-viridia, erecta aut patentiora,
 pagina superiore et marginibus scabriuscula, $1\frac{1}{2}$ li-
 neam lata; 1 - 3 pollices longa, obtuse mucronata.
Vaginae coloris foliorum, glabrae, ancipites, striatae,
 laeves. *Ligulae* breves, obtusae. *Panicula* 2 - 3 pol-
 lices longa, secunda, interdum fere aequalis, an-
 gustia, primum contracta, florens parum patentior,
 matura iterum contracta, rigidiuscula, erecta. *Rha-
 chis* gradibus valde manifestis. *Pedunculi* breves et
 breviter ramosi, plerumque gemini, non raro solita-
 rii, aut terni-quinii in semiverticillis subalternis.
Spiculae breviter pedicellatae, subsessiles, solitariae
 et approximatae, ex viridi alboque coloratae, apici-
 bus rubellis, 2 - 3 lineas longae, unam latae, ovato-
 lanceolatae, fere lineares, acutae. *Gluma calycina*
valvulis subaequalibus, ovato-lanceolatis, carinatis.

Glumae corollaceae 6-9, raro 3-5, aut 10, ovato-lanceolatae, obtusiusculae, *valvula exteriore calycinis* vix majore, carinata, basi dorsali subvillosa. *Antherae flavae. Stigmata alba, plumosa* (6).

Flor. Praer. — *Therm. Matur. Fruct.* — *Vend.*
β Mai. — *β Aug.* — *β Aug.* — *β Oct.*

Habit. in siccis, agris, plateis, muris, rupibus, maritimis, tot. fere *Gall.* et *Germ.* — in nostro Depart. circa Lautern, in monte Rochusberg prope Bingen, in fossis graminosis circa Moguntiam, in sylva am Jaegerhause. — *America sept.*

22. Poa bulbosa. Paturin bulbeaux. Zwiebelches Rispengras. *

Poa bulbosa, panicula secunda, patentiuscula, spiculis quadrifloris. Linn. ed. Reich. I.

191. ed. Gil. 3. 89. s. v. ed. Pers. 118.

foliis bulbosis, panicula diffusa, locustis quadrifloris subvillosis. Hall. helv.n. 1461. culmorum basi tuberosa. Guett. stamp. I. p. 168.

Dalib. par. 29.

Gramen Xerampelinum, miliaceum, pertenui ramo-saque sparsa panicula. S.

(6) Mense Praereali Poam inveni, in locis gramineis haud procul portam Münsterhor crescentem, *culmo*, *foliis*, *vaginis*, *ligulis*, *radicibus*, crassitie longitudineque *compressae* similem, diversam autem quoad paniculam. *Panicula* nempe coarctata, brevis quidem, minime autem secunda est, *pedunculis* 5-6 brevibus, capillari-bus, laevissimis, alternatim semiverticillatis. *Spiculae* triflorae, *glumis corollaceis* dorso villosis, viridibus, marginibus albis, *valvulis calycinis* scabris. An Varietas?

Xerampelino congener arvense, aestivum gramen, minutissimo semine. Lob. illustr. 14. Magn. bot. 113. hort. 90. Scheuchz. agr. p. 185. Rupp. jen. p. 311.

arvense, panicula crispa. C. Bauh. p. p. 3. pr. p. 6. Magn. bot. 113. hort. 90. Barrel. ic. 703.

angustifolium, panicula densa foliacea, foliolis in panicula angustissimis. Scheuchz. agr. p. 211. t. 4. f. 13. A. B. C.

vernus radice Ascalonitis. Vaill. par. 91. t. 17. f. 8.

paniculatum proliferum. Tourn. 523. Buxb. hal. p. 144. Rupp. jen. p. 311. Mapp. 134.

cum panicula molli rubente. J. Bauh. h. 2. p. 464.

montanum panicula foliacea, crispa breviore. Moris hist. 200. t. 5. f. 14.

Roth. 1. 44. 2. 122. Lainarck. 1179. 2. Pollich. 1. 93. Schranck 1. 346. Leyss. hal. n. 96. Goian. hort. 45. flor. 122. Lestib. 220. Willden. prodr. n. 156. Fl. d. Wett. 1. 112. Reich. 2. p. 168. Scopol. 1. 71. Scholl. barb. n. 75. J. Hoffm. 46. Panz. 12. 350. Dietr. 1. 98. Nonne. erf. p. 282. Plan. erf. p. 56. Delarbre. 154. Oestr. fl. 1. 60. Krock. sil. 1. 138. t. 25.

Radix perennis, fibrosa, flavicans. *Culmi* caespitosi, glabri, ad dimidiā partem nudi, teretes, basi bulbosa, 6 pollices — pedem longi, plerumque inferne geniculati, dein erecti, et paululum inclinati, nodis 2 - 3 purpureis. *Folia* plana, nervo albido dorsali, carinante, $\frac{1}{2}$ - 1 lineam lata, 1 - 3 pollices longa, erecta, scabriuscula, laete viridia,

aut rubella, glabra, siccata convoluta, *radicalia caespitosa*. *Vaginae* coloris foliorum, striatae, glabrae. *Ligulae* 2 lineas longae, acutae. *Panicula densa*, patentiuscula, secunda, 1 - 2 pollices longa. *Pedunculi* breves et breviter ramosi, gemini, non-nunquam terni. *Spiculae* ovato-lanceolatae, compressae, virides, aut rubellae. *Gluma calycina valvulis* fere aequalibus, acutis. *Glumae corollaceae* 3 - 5, *valvula exteriore* dorso scabro, interdum et pubescente.

Var. Vivipara. *Panicula crispa* foliosa, *Glumis nempe corollaceis*, imo *calycinis* in foliola curvata, 6 lineas-pollicem longa, mutata, *ovarium* vero in bulbum, superne foliaceum. (prope Moguntiam in arenosis.)

Flor. Flor. — *Mess. Matur. Mess.* — *Fruct.*

β. Apr. — β. Jul. β. Jun. — β. Sept.

Habit. in sterilibus, arenosis, sylvaticis, montosis, collibus, pascuis, vineis, rupibus, muris, ad vias: t. fere *Gall.* et *Germ.* In nostro Depart. prope Moguntiacum, Lauterecken, Steinbach, Umstein, Dürckheim, Calstadt, Herxheim, Oppenheim, Nierstein, Bingen. —

23. *Poa dura*. Paturin rude. Kamm - Ris-pengras. **

Poa dura, *panicula secunda*, *spiculis alternis*, *sessilibus obtusis*, *adpressis*. Roth. I. 43. 2. p. 121. Fl. d. Wett. I. 113. Scop. I. 70. Dietr. I. 99. Oestr. flor. I. 60.

Cynosurus durus, *spiculis secundis alternis*, *sessilibus*, *rigidis*, *obtusis*, *adpressis*. Linn. ed. Reich. I. 199. ed. Gil. 3. 94. S. v. ed. Pers. 120.

Leyss. hal. n. 131. Lamarck. 1185.
 7. Poll. 1. 98. t. 1. f. 1. Krock. I.
 152. t. 28. Schranck. I. 351.
 Plan. erf. p. 57. Hoffm. 48. De-
 larbre. 72.

Lolium procumbens, spica disticha, locustis tereti-
 bus trifloris. Hall. helv. n. 1419.

Germen loliaceum minus supinum multiplici spica.
 C. Bäuh. p. p. 9. pr. p. 19. Buxb.
 hal. p. 147. Rupp. jen. p. 306.
arvense polipodii panicula crassiore. Barrel.
 1213. ic. 50.

Radix annua, fibrosa, ex flavicanti-albida. Cul-
ni caespitosi, plures ex uno centro provenientes et
decumbentes, aut suberecti, rigidiusculi, glabri,
compressi, foliati, saepe ramosi, laete virides, no-
dis 3 - 4 purpureis instructi. Folia 1½ - 2 lineas
Iata, 6 lineas — 1½ pollicem longa, plana carinata,
nervo albido dorsali evanescente praedita, laete viridia,
obtuse mucronata, mollia, glabra. Vaginae foliis
breviores, laxae, striatae, glabrae. Ligulae lineam
longae obtusiusculae. Panicula spiciformis, uni-
lateralis, ex ovato lanceolata, fere spathulata, densa,
compressa, 6 lineas — 1 pollicem longa, circiter 6
lineas lata. Pedunculi brevissimi, plerumque sim-
plices, interdum subramosi, rigidi, alterni, soli-
tarii. Spiculae ex lanceolato-lineares, compressae,
obtusae, rigidae, approximatae, e viridi-albidae,
aetate (sicuti tota planta) spadiceo colore. Gluma
calycina valvulis inaequalibus, ovatis, obtusis,
striatis, carinatis, marginibus apiceque scariosis.
Glumae corollaceae 3 — 5, calycina maiores, val-
vula exteriore calycinis simili. Semen ferrugi-
neum, hinc angulatum.

Var. *Stylis tribus.* Scop.

Flor. — *Mess.* — *Matur.* — *Fruct.*
β. Apr. — *β. Jun.* — *β. Jun.* — *β. Sept.*
Habit. in glareosis, apricis, sterilibus, rupibus,
 ad vias. *Gall.* — in Dep. de la Drome; des hautes-
 Alpes; de l'Isere; du Mont-tonnerre, (prope Wver-
 stadt, Spiesheim, Albrich, Alzey, Berstadt, Stau-
 dernheim, Gauodernheim, Standebühl). — *Germ.*
 in Saxon. Thuring. Darmstadt. Wetter. Bavar.
 Austr. Francon. Siles.

24. *Poa nemoralis*. Paturin des hayes.
 Hain-Rispengras. *

Poa nemoralis, panicula attenuata, florente patente,
 spiculis mucronatis, scabris, culmo
 debili. Roth. I. p. 42. 2. p. 115.
 panicula attenuata, spiculis subbi-
 floris, mucronatis, scabris, culmo
 incurvo. Linn. ed. Reich. I. p.
 191. ed. Gil. 3. p. 89. S. veg. ed.
 Pers. 118. Fl. suec. 2. n. 85.
 culmo debili, panicula nutante, locustis bifloris
 flosculis subvillosis. Hall. helv. n.
 1469.

Melica panicula sparsa, globulis ad genicula rufes-
 centibus. Berg. frc. p. 320.

Gramen nemorosum panicula laxa, radice repente.
 Vaill. par. 90.

paniculatum, angustifolium alpinum, lo-
 custis rarioribus et angustioribus
 non aristatis. Scheuchz. agr. p. 164.
 t. 2. Rupp. jen. p. 311. Gmel. sib.
 I. p. 95. Hall. goett. p. 45.

sylvaticum panicula tenui e locustis rarissi-
 compositis. Dill. giess. p. 130. app. 57.
Ioliaceum alpinum, paniculis ex rarioribus

et exiguis locustis compositum.

Mont. gram. 39. ic. 12.

canino vineali simile, angustioribus foliis,
paniculis minoribus, non aristatis.

Scheuchz. it. 2. p. 135. t. 18. f. 3.

cirrhosa et villosa, spongia ad singula geni-
cula, donatum, paniculatum, aipi-
num. Scheuchz. agr. p. 165. Bac-
con. mus. 2. p. 70. t. 59. et pag. 165.
Zinn. goett. p. 65.

Lamarck. 1179. 10. Nekker. gallob. p. 52. Gouan.
h. 44. fl. p. 122. Wilke. gryph. n. 51. Schrank. I. 345.
Jacq. vind. p. 16. Reyg. ged. I. p. 43. n. 6. Scholl.
barb. n. 74. Fl. d. Wett. I. 108. Murr. pr. p. 41.
Matuschka. I. 57. Gmel. tub. p. 23. Pollich. I. 91.
Schreb. spic. n. 55. Leers. 29. t. 5. f. 3. Willden.
prodri. n. 155. Lestib. E. 121. Flor. dan. t. 749.
Timm. pr. n. 642. Scopol. 1. 24. Leyss. hal. n. 95.
Hoffm. 46. Moench. hass. n. 75. meth. 188. Wigg.
prim. p. 8. Panz. 12. 347. Grimm. isen. p. 264.
Weig. pom. n. 63. Delambre. 154. Oestr. fl. I. 60.
Wibel. w. I. 144. Krock. I. 146.

Radix perennis, aut subrepens, aut repens, sto-
lonifera, fibrosa. *Culm* I. 4 pedales, raro altiores,
interdum ramosi, glabri, laeves, inferni plerumque
incurvi, dein erecti, versus apicem antorsum cur-
vati, nodis 4 - 7 purpurascensibus glabris. *Folia*
culmo latiora, vix 1 - 2 lineas lata, 2 - 10 pollices
longa, patentia, mucronata, rigidiuscula, glabra, sca-
briuscula, laeviter striata, siccata convoluta. *Ligu-
la* brevissima truncata. *Vaginae* glabrae, striatae,
inferiores saepe (non semper) scabriusculae. *Pani-
cula* I. - 8 pollices longa, modo densior, modo laxior,
pauciflora et nutans, raro recta, ante anthesin lanceo-
lato-contraeta, florens patentissima, raro racemosa.
Pedunculi non saepe solitarii, plurimum 3 - 5 in se-
mi-

miverticillis alternis, capillares, ramosi, antrorsum nutantes, pauciflorae. *Spiculae* plerumque solitariae, et longe pedicellatae, ex viridi alboque dilute fuscae, aut purpurascentes, compressae, lanceolato-mucronatae, 2-3 lineas longae, lineam dimidiam — unam latae, aetate fuscae. *Gluma calycina valvulis* lanceolatis, mucronatis, scabris, marginibus argenteis, lineam unam aut vix ultra longis. *Glumae corollaceae* plerumque 2, interdum 1, 3, 4, rarissime 5, mucronatae, scabrae, vix calycina longiores, marginibus argenteis. *Antherae purpureae*, aetate fulvae. *Stigmata alba*, plumosa.

Var. 1. *Panicula pluriflora*:

2. *Fibris numerosis ex fissuris infimo-rum internodorum progredientibus, purpurascensibus, glomeratim arcte implexis, nodum et partem internodii ambientibus.* (Insecti opus, secundum Goian. h. l. c.; Vitium a nimio succo nutritio ortum; Sec. Leers. l. c.) in nostro Depart. in sylva. Halgrund prope Lautern.
3. *Spiculis exiguis saepe sterilibus.*
4. *Planta tota decumbens, nodis 10, 12 et pluribus ramiferis, ramis erectis. — in sylva Nonnenwald prope Moguntiam.* —
5. *An — — — Poa panicula diffusa, spiculis bifloris totis glabris, culmo suberecto glabro. Gmelin tub. 23. variet. nemorosae?*
6. *Glumis corollaceis aut basi subvillo-sis, aut glaberrimis. Saepe in una eademque planta. (Jungenfelder-Aue).*

N.

7. Plantae prope Moguntiacum in dumetis ad fossas et prata, quoque in monumentis occurunt, characteribus plurimis *Poae nemoralis* praeditae, quoad culmum autem diversae. Altera nempe 3-4 pedalis, culmo inferne crassitudinis pennae corvinæ, et tereti, superne autem debili compressiusculo, incurvo. Altera, magis decumbens, adscendens, culmo toto manifeste compresso, filiforme et paucis crassiore, 6 pollices - 2 pedes longo. An Varietates aut diversae species?

Flor. Flor. -- Mess. *Matur.* Mess. -- Vend. *β. Apr.* -- *β. Jul.* *β. Jun.* -- *β. Oct.*

Habit. in muris, rupibus, dumetis, paludibus, umbrosis, sylvaticis. tot. sere *Gall.* et *Germ.* -- in nostro Depart. prope Lautern et molam imperialem, prope Moguntiacum in Jungenfelder Aue, et im Nonnenwald.

25. *Poa airoides.* Paturin des ruisseaux.
Schmielenartiges-Rispengras. *

Aira aquatica, panicula patente; floribus muticis laevibus calyce longioribus, foliis planis. Linn. ed. Reich. I. 177. ed. Gil. 3. p. 80. s. v. ed. Pers. II. 4. Fl. suec. 66. 68.

culmo inferiore repente, flosculis muticis, calyce longioribus, altero pedunculato. Roy. lugdb. 60.

Poa locustis bisfloris, glabris, florali gluma majori, plicata, serrata! Hall. helv. n. 1471.

Molinia aquatica. Wibel. w. 116.

Gramen paniculatum aquaticum miliaceum. Tourn. 521. Mapp. 135. Vaill. par. 89. t. 17, f. 7.

miliaceum aquaticum. Scheuchz. agr. p. 176.

Raj. syn. 255. Rupp. jen. p. 315.

Hall. goett. p. 46.

caninum supinum paniculatum dulce. C.

Bauh. pin. p. 1.

dulce odorum. Dill. giess. p. 111.

majus aquaticum. Lob. ic. 4.

Lobelii. J. Bauh. h. 2. p.

481.

Lamarck. 1176. I. Dalib. par. 26. Nekker gal. lob. p. 50. Nonne erf. p. 277. Plan. erf. p. 54. Curt. Lond. I. n. 10. Willden. prodr. n. 145. Lest. p. 218. Weig. pom. n. 52. Roth. I. p. 35. 2. p. 95. Poll. I. p. 73. Wigg. prim. p. 7. Gort. ingr. p. 11. Boehm. lips. n. 617. Schrank I. p. 327. Jacq. vind. p. 14. Goian. h. 43. flor. 121. Gmel. tub. p. 19. Scopol. I. 66. Hoffm. 38. Murr. prodr. p. 41. Dietr. I. p. 94. Oeder. t. 281. Fl. d. Wetter. I. p. 97. Schreber. spic. p. 49. Reich. frc. 15. Leyss. hal. n. 75. Delarbre. 10. Grimm. isen. n. 262. Panz. 12. 305. Zinn. goett. p. 63. Berg. frc. 321. Matuschk. I. 49. Scholl. suppl. 1022.

Radix perennis, repens, articulata, internodiis inanibus, fibrosa. Culmus glaberrimus, laevis, mollis, saepe ramosus, basi decumbens, ad genicula non raro radicans, dein curvato - ascendens, raro totus erectus, palmaris — 2½ pedem longus, striatus, laete viridis, nodis 2 - 3 purpurascensibus donatus, usque ad paniculam foliatus, ad nodos angustatus. Folia glabra, laevia, plana, erecta, 2 - 6 lineas lata, pollicem dimidiam — 4 longa, nervosa, laete viridia. Ligulae breves, albae, obtusae. Vaginae lae-

N 2

ves, glabrae, subcompressae, striatae. *Panicula* laxa, oblonga, digitalis-palmaris, pyramidalis; *patens*, divergens, inferne saepe, imo florans, *vagina* suprema involuta. *Rhachis*, *Pedunculi* et *Pedicelli* ad ramifications angustati. *Pedunculi* 4-7, in semiverticillis alternis, intermedius crassior et longior, omnes ramosi. *Pedicelli* subflexuosi. *Spiculae* plerumque lineam unam, interdum 2 lineas longae, ex viridi et albo spadiceae, rarius violaceae, ovato-obtusae, supremae saepe steriles. *Gluma calycina* *valvulis* inaequalibus; *exteriore* subrotunda, obtusa, *spicula* saepe breviore; *interiore* minima valde angusta, obtusa. *Glumae corollaceae* muticae: *inferior* sessilis, minor: *superior* pedicellata videtur, quia *glumae corollaceae* uni quidem *axi* adfixae tamen distantes sunt. *Válvula exterior* corollacea apice obtuso, paululum lacero. *Antherae* pallide flavae.

Var. Calycibus 5 floris, *glumis corollaceis* *valde remotis*: *in locis siccis*. Schreber.
(*Varietas dubia*).

Flor. Praer. — *Therm.* *Matur.* *Mess.* — *Fruct.*
β. Maj. — β. Aug. β. Jun. — β. Sept.

Habit. ad fossas, piscinas, paludes, rivulas, in pratis udis, rupibus sylvaticis. tot. fere. *Gall.* et *Germ.* — in nostr. Depart. circa Lautern, molam imperiale, Durckheim, Harteburg, prope Moguntiacum ad paludem, in rivulo Hartebach, et pratis Gonzenhemensibus. — In pratis Kostkemensibus, et ad rivulam Kaesbach:

26. Poa rhenana. Paturin rhénan. Rheinisches Rispengras. ***

Plantam mense Messid. (β. Jun. — β. Jul.) florentem, mihi incognitam, Poae megast. haud dissimilem, prope officinam laterariam Mombacensem, circa paludem in terra sabulosa crescentem inveni.

Radix perpendicularis, albida, superne crassitie pennae corvinae, geniculata, sensim angustior, ad nodos multis fibris ferrugineis, ramosis, fere perpendicularibus, saepe tuberibus praeditis, instructa. *Tubera* parva ad summum $1\frac{1}{2}$ lineam longa, saepa ovata, saepe globosa, mox gemina, mox solitaria, flavescentia, carnosae. *Culmūs* digitalis - pedalis, supra radicem crassitudine pennae anserinae, arcuatim curvatus, aut geniculato-erectus, superne teretiusculus, viridis, firmus, glaber, laevis, striatus, inferne albidus, ramosus, compressus, fere enodis: nodis nempe 2 (interdum unico) radici vicinis, radicantibus, ad dimidiā partem nudus. *Vaginae* valde striatae, glabrae, laeves, marginibus diaphanis, laete virides, subcompressae, inferiores straminei coloris et membranaceae. *Ligulae* loco margo fuscus, ciliatus. *Folia* ramorum erecta, culmea autem horizontaliter patentia, rigida, nervosa, 2-4 pollices longa, 1-3 lineas data; juniora fere filiformia, complicata, aetate canaliculato-aperta, aut glabra, aut villis raris, praecipue ad marginem et basin praedita, inferiore pagina, et in margine laetitia, superiore vero nervo intermedio deorsum valde scabro donata. *Panicula* patens 1-2 pollices longa, rigida. *Pedunculi* quaterni in semiverticillis alternis pilis rarissimis praediti, ramosi, flexuosi, horizontaliter fere patentes, inferiores 2-5 linearum longitudine nudi, laeves, ad basin incrassato-nodosi. *Rhachis* communis internodiis alternis, altero latere convexis, altero perfecto planis, laevibus, pilis rarissimis obsitis, ad insertionem pedunculorum, manifeste gibbosis. *Spiculae* approximatae, sessiles et pedicellatae, 2-3 lineas longae, 1- $\frac{1}{2}$ lineam lateae, compressae, ovatae, obtusae, ex viridi-flavescenti et violaceo variegatae, aetate spadiceae, spiculis trivalvis primo intuitu haud dissimiles. *Gluma*

calycina valvulis versus apicem scabris, ex ovato-acutis, inaequalibus, carinatis; superiore latiore, et glumam corollaceam vicinam superante; inferiore breviore. Glumas corollaceae plerumque 5, raro 6 aut 7, lanugine inter se cohaerentes, valvula exteriore margine membranaceo glabro, angustiore quam in triviali, dorso vix pubescente aut subvilloso, scabriusculo, acuta, (per lentem obtusa). Antherae flavae. Stigmata alba, plumosa.

Differt a P. triviali:

Panicula patentiore minus densa, semiverticillis remotoribus; foliis rigidioribus, glumis corollaceis angustioribus, margine glabro etc.

Differt a P. Megastachys: glumis calycinis, nec membranaceis, nec deciduis: glumis corollaceis minime ventricosis, apice nec repando: culmo erecto etc.

Accedit ab P. Eragrostis.

Forma spicularum, foliorum, culmi, etc.

17. Poa littoralis. Paturin maritime. Meer-Paturin. Rispengras. ***

Poa littoralis panicula coarctata secunda, mutica, foliis convolutis rigidis, caule humido mifuso. Gorian. fl. 470.

Differt a panicula spicata, secunda mutica; foliis convolutis brevibus pungentibus. Gerard. gallopr. 91.

Gramen caninum maritimum spicatum. Bauh. pin. 2. prodr. 4. Tourn. 518. Magn. bot. 112. hort. 90.

Folia brevia, rigida, ad margines et Vaginae villosa, parum sibi invicem remota. (Golian.)

Hab. in maritimis arenosis. Gall. in Dep. des Bouches du Rhône: du Var; de l'Hérault.

26. Poa cristata. Paturin à crête, Kamm-Ris-
tata, p. 199. péngras. *

Festuca locustis bifloris mucronatis, confertim im-
bricatis, panicula spicata. Hall,
helv. 1444.

Poa cristata, panicula spicata, calycibus subpilososis,
subquadrifloris pedunculo longiori-
bus, petalis aristatis, Linn. ed.
Reich. I. 193. ed. Gil. 3. 90. s. veg.
ed. Pers. 118.

Lamarck. 1179. 4. Pollich. 1. 94. Scholl. barb.
n. 76. Roth. I. 43. 2. 119. Fl. d. Wett. I. 110.
Plan. erf. p. 56. Murr. prodr. p. 41. Leers. 30. t. 5.
f. 6. Lestib. 220. Gmelin. tub. p. 23. Schrank I.
347. Wigg. prim. p. 8. Mönch. meth. 189. flor.
n. 76. Reich. fr. 2. 167. Grimm. isen. p. 262.
Leyss. hall. n. 97. Heffm. 46. Timm. prædr. n. 643.
Panz. 12. 314. Schreb. spic. p. 54. Oestr. fl. I. 60.
Krock. sil. I. 130. t. 20.

Aira cristata, panicula spicata, floribus muticis pe-
dunculo longioribus, glumis acumi-
natis, inaequalibus. Spec. plant. 2.
p. 94. Jacq. vind. p. 14. Zinn. goett.
p. 63. Roy. lugdb. 61. Dalib. par. 87.
Gmelin. sib. I. p. 93. n. 24. Nekker.
gallob. p. 45. Doerr. nass. p. 3. Goitian.
h. p. 42. fl. 121. Scop. I. 65. Sauv.
56. Kram. austr. p. 18.

Aira panicula spicata, floribus muticis, valvulis acu-
leatis aequalibus. Berg. fré. p. 322.

Collinaria. Ehrh. phyt. n. 31.

Gramen spica cristata, subhirsuta. C. Baul. pin. 3.
prodr. 8. Tourn. 519. Moris. h. 3.
p. 194. s. 8. t. 4. f. 7. Scheuchz. agr.
166. t. 3. f. 15. Seguier. veron. I.

p. 354. n. 4. Mont. prodr. p. 56.

Mapp. 131. Rupp. jen. p. 310. Hall.

goett. p. 54.

Rhadix perennis, fibrosa. *Culmi* saepe ad basin incurvi, dein erecti, stricti, palmares — 3 pedales, inferne squamis aphyllis tecti, teretes, glabri, interdum infra paniculam villosi sive pubescentes, aut superne paululum nudi, aut tantum usque ad medium tecti, nodis 2 - 3 purpureis donati. *Folia* plana, 1 - 4 pollices longa, lineam dimidiam — unam lata, nervo albido dorsali, scabra, rigidiuscula, margine ciliata, siccata convoluta, aut complicata, et fere setacea: *radicalia* angustiora, utrinque pubescentia: *culmea* latiora, supra pubescentia, subtus scabra. *Vaginae* pallide virides, aut rubellae, striatae, subvillosae, superiores scabrae. *Ligulae* vix illae, brevissimae, truncatae, subciliatae. *Panicula* 1 - 3, raro — 6 pollices longa, contracta, teres, spiciformis, aequalis, obtusa, florens paululum patentior, laxior magisque interrupta, spiculis et pedunculis nempe divergentibus. *Pedunculi* spiculis breviores, breviter ramosi, villosi, gemini-quini. *Spiculae* nitidae, ex viridi-albidae, interdum hirscentes, rarius purpureae, juniores ovatae, acuminatae, adultiores compressae, fere 3 lineas longae, vix lineam latae, aliae fere sessiles, aliae pedicellatae. *Glyma calycina* valvulis compressis, navicularibus, carinatis, ovato-oblongis, fere linearibus, acutis, margine argenteo, subciliato, dorso scabro. *Glumae corollaceae* 2 - 4, *Valvulis* valvula calycina majori fere aequalibus, navicularibus, compressis, fere linearibus, dorso (certe perlentem) scabro. *Squamulae* apice latiores, oblique truncatae, crenulatae, margine interiore unidentato. *Antherae* caeruleae, aetate flavae. *Stigmata* alba.

Var. 1. Spiculis laevibus.

2. Valvulis corollaceis breviter aristatis.

3. Spiculis solitariis, aut binis, ternis, alternantibus.

Flor. Flor. — Mess. *Matur.* Mess. — Fructid.

β. Apr. — β. Jul. β. Jun. — β. Sept.

Habit. ad vias, margines agrorum, et sylvarum, in arenosis, siccis, pascuis, collibus, sterilibus. tot. fere. *Gall.* et *Germ.* — in nostro Depart. ad tractum montifm Hardt, prope Maguntiam, Goezenheim et Mombach in arenosis, quoque circa Worms, Alzei. —

29. *Poa phoenicoides*. Paturin piquant.

Stechendes Rispengras. ***

Festuca phoenicoides racemo indiviso, spiculis alternis subsessilibus, teretibus, foliis involutis mucronato-pungentibus. Linn. ed. Reich. I. 206. ed. Gil. 3. 93. s. veg. ed. Pers. 122. Mont. 33.

pungen's. Lamarck. 1180. 4.

maritima. Goian. fl. 124.

Bromus ramosus. Linn. (sec. Vahl. symb. bot. 2. p. 23.?)

Triticum hispanicum. Linn. ed. Reich. I. 240. ed. Gil. 3. 122. Loefl. it. 44.

Gramen maritimum acutissimum foliis pungentibus, arundinaceum. C. Bauh. p. 7.

spica loliacea, foliis pungentibus. Pluk. t. 33. fl. 4.

spicatum foliis mucronatis, spica secalina. Magn. bot. 119.

phoenicoides foliis convolutis juncis pungentibus. J. B. hist. 2. p. 477. Magn. bot. 120.

spicatum pungens oceanicum. J. Bauh. hist. 2.

loliaceum maritimum, foliis pungentibus.

Tourn. 516.

Gerard. fl. gallopr. 95. t. 2. f. 2. Goian. illustr. 4.

Radix perennis. *Culni* 1 — 2 pedales, erecti, foliati. *Folia* glauca, marginibus involutis, acuminato-mucronata, pungentia, rigidiuscula. *Panicula* racemosa, *spiculis* solitariis, alternantibus, fere sessilibus, adpressis, oblongis, teretibus, acutis. *Gluma calycina* *valvulis* mucronatis. *Glumae corollaceae* 6 — 8, muticæ.

Habit. in maritimis arenosis; *Galliae* meridion.

30. *Poa spadicea*. Paturin doré. Braunes Rispengras.

Poa n. II. Gerard. fl. gallopr. 91. t. 95. f. 1.

Gerardi. Allion. fl. pedem. 2. p. 245.

Festuca spadicea, panicula secunda, calycibus quinquefloris, flosculo ultimo sterili, foliis laevibus. Linn. ed. Reich. 1. 205. ed. Gil. 3. 98. s. v. ed. Pers. 122. Goian illustr. 4. Dietr. 1. 104.

panicula erecta, *spiculis* ovatis 4 floris, *glumis* acuminatis muticis, foliis setaceis glabris pangentibus. Smith. in trans. lin. 1. t. 10. Hoffm. 51.

panicula secunda patula, etc. Moench. m. 190. (?)

aurea Lamarck. 1180. 8.

Hall. helv. 1436.

Anthoxanthum paniculatum. L. (secund. Smith, in trans. lin. 1. p. III. Huc pertinet; *Anth.* vero *pan.* *aristis* et quidem *dorsalibus*, *valvulis* *corollaceis* *villosis*, *statura* *minore*, *panicula*

haud secunda, etc. eto. gaudet, et
nil aliud quam varietatem *A. odorat*
esse videtur.)

Gramen alpinum latifolium, panicula heteromalla
spadicea locustis pennatis. Schéuch.
agr. 278.

panicula pendula anrea. C. Bauh. p. 3.

Radix perennis, fibrosa. *Culmi* 1 — 4 pedales,
erecti, teretes, glabri, foliati, nodis 2 — 3 purpu-
reis instructi. *Folia* lineam 1 — 1½ lata, valde
longa, siccata convoluto-setacea, glabra, mucrone
pungente et marginibus laevibus praedita. *Vagi-*
nae sublaxae, striatae. *Panicula* secunda, laxa,
contractiuscula, florens subpatens, erecta, aetate
saepe apice nutante, 3 pollices circiter longa, flavesc-
cens aut spadicea. *Pedunculi* basi nodosi, glandula
nempe alba instructi. *Spiculae* juniores teretes, ex
ovato-oblongae, aetate distichae. *Gluma calycina*
valvulis laevibus, glabris, acutis, nitidis, paulu-
lum inaequalibus, marginibus argenteis. *Glumae*
corollaceae 3 — 6, plerumque 4, aetate distantiores,
ultimae abortientes, *valvula* exteriore mutica, acu-
minata, 2 lineas longa, glabta. *Stantlna* cum *An-*
theris plerumque violaceae.

Flor. — Praer. — Fructid. — 3. Maj. — 3. Sept.

Habit. in humidis, collibus, pratis, montosis,
alpibus. *Gall.* meridionalis et *Germaniae*. In
Austria, Styr., Tyrol:

51. Poa intermedia. Paturin intermédiaire.

Mitleres-Rispengras. **

Festuca pratensis, panicula secunda obliqua, spicu-
lis muticis sublinearibus (com-
pressis). foliis planis. Curt.
Lond. 6. n. 66. Hoffm. 52.
Wibel. w. 106.

Radix perennis fusca. Culmi 2 - 3 pedales, erecti, teretes, laeves, glabri, nodis 2 - 3 fuscis. Folia longissima, pagina superiore striata, molliter villosa, inferiore glabra, laevia; culmea planiuscula; radicalia setaceo-convoluta. Vaginae striae, glabrae, laeves. Ligulae brevissimae, truncatae. Panicula secunda, oblique patens, rarius divisa; pedunculis supremis solitariis, simplicibus, ramosisque, inferioribus binatis ramosis. Spiculas oblongae, glabrae, fere lineares, ex tereti compresiusculae. Glumae corollaceae plerumque 5; valvula exteriore mutica; interior subintegra.

Var. valv. exter. coroll. subaristata.

Flor. Praer. — Mess. — β. Maj. — β. Jul.

Habit. in pratis, pascuis. Germ. Francon.

32. Poa fluitans. Paturin flottant. Manna-Rispengras. *

Poa fluitans. Moench. Hass. n. 78. Scopoli. I. 73.

locustis teretibus, multifloris, glumis floralibus exterioribus truncatis, interioribus bisidis. Hall. hely. n. 1453.

spiculis oblongis erectis. Hort. cliff. 28. Roy. lugdb. 62.

Festuca fluitans, panicula ramosa erecta, spiculis subsessilibus, teretibus, muticis. Linn. ed. Reich. I. 207. ed. Gil. 3. 99. s. veg. ed. Pers. 122. Flor. suec. 90. 95.

Lamarck 1180. II. Wilke gryph. n. 59. Schreber. Graes. 37. t. 3. Grimm. isen. p. 265. Oeder. fl. dan. t. 237. Schrank. I. p. 355. Roth. I. 47. 2. 132. Curt. Lond. I. n. 6. Berg. fr. p. 324. Stillingst. misc. t. 10. Doerr. nass. p. 18. Leers. 35. t. 8. f. 5. Gmelin. tub. p. 26. Poll. I. 107. Dietr. I. 105. Willden. prodr. n. 166. Hoffm. 52. Reich. fr. 18. Boehm. lips. n. 643. Wigg. prim. p. 8.

Reygo gedan. I. p. 51. n. 7. 2. p. 45. Leyss. hal. n. 106. Gdian. hort. 49. fl. 124. Lestib. 122. Jacq. vind. p. 17. Fl. d. Wett. I. 121. Nonne erf. p. 284. Plant. erf. p. 58. Murr. prodr. p. 42. Nekker. gal. lob. p. 59. Weig. pom. n. II. Matuschk. I. 63. Schöll. barb. n. 81. Moench. m. 190. Delarbre 86. Wibel. w. III. Krock. I. 165.

Dactylis marchica esculenta. Berg. frc. p. 321.

Gramen paniculatum aquaticum fluitans. Tourn. 521.

Mapp. 133.

fluviale. Tabern. ic. 216.

aquaticum fluitans multiplici spica. C. Bauh.

pin. p. 3. Scheuchz. agr. p. 199.

t. 4. f. 5. Magn. bot. 119. Hall.

goett. p. 44.

paniculatum fluitans. Buxb. Chak.

p. 144. Rupp. jen. p. 310.

cum longissima panicula. J. Bauh.

h. Z. p. 490. Raj. hist. p. 1281.

syn. 3. p. 412. Volck. norimb.

p. 197. Dill. giess. p. 97.

miliaceum aquaticum. Brizae locustis semi-

ne rufo. Barrel. rar. 1209. ic. 7.

mannaes esculentum prutenicum. Loes. pruss.

p. 168. ic. 21.

foliaceum fluitans spica longissima divisa.

Moris. hist. 3. p. 183. s. 8. t.

3. f. 16.

aquis innatans. Lobel. ic. I. p. 12.

Radix perennis, repens, fibrosa. Culmī inferne albī, curvati, crassi, radicantes, ramosi, dein aut in aqua natantes aut in terra suberecti, 2-6 pedales, glabri, laeves, plerumque ex tereti-compressiusculi, angulis 2 obtusis oppositis, striati, nodis 3-6 purpurascētibus instructi, usque ad paniculam saepe tecti. Folia ex plane subcanaliculata, supra subsca-

bra, marginibus scabris, glabra, pallide viridia, dorso carinato, mollia; culmea 3-8 pollices longa, 3-4 lineas lata, radicalia longiora. Vaginae colore foliorum, compressae, angulo dorsali obtuso, striae tae, glabrae. Ligulae oblongae, acutiusculae. Panicula ramosa, laxa, subsecunda, pedalis — ultra bipedalis. Rhachis compressa, glabra. Pedunculi alterni: inferiores ramosi, solitarii aut bini aut terni, inaequales, semiteretes, scabriusculi, in flor- rescens exakte horizontaliter patentes, raro erecti, stricti. Pedicelli breves. Spiculae adpressae, 9-15 lineas longae, molliusculae, fere lineares, ex tereti-compressae, obtusae, pallide virides raro rubellae. Gluma calycina valvulis lanceolatis, ovatis, obtusiusculis, glabris, marginibus argenteis: exterior 2 lineas longa; interiore minore, acutiore, angustioreque. Glumae corollaceae 7-12, laxe inter se cohaerentes; valvula exteriore glabra, ex ovato-oblonga, et ex obtuso-subacuminata, septincervia, scabra, margine apiceque membranaceo-argenteo, 3 lineas fere longa: interiore acuminata, paulo brevior, bifida, margine nervoso reflexo. Squamula semiobicularis, horizontalis. Antherae purpureae ant flavae. Stigmata alba.

Var. 1. Vivipara. Spiculis palmaribus, valvulis corollaceis, ovariiisque in foliola mutatis.

2. Raram varietatem inter Obersaulheim et Werstadt ad rivulum Mühlbach, in terra sicca glareosa crescentem, legi; culmo vix sesquipedali, erecto, debili; panicula densiore, spiculis 4-5 floris, 3 lineas longis, lineam dimidiam latis, valvulis profunde viridi-

bus, marginibus ex violaceo-
argenteis.

Flor. Flor. — Therm. Matur. Therm. — Vend.
f. Apr. — f. Aug. — f. Jul. — f. Oct.

Habit. in fossis, paludibus, piscinis, et ad mar-
gines earum, locisque hyeme inundatis, tot. fere
Gall. et *Germ.* — In Dep. Montis-Jovis hand pro-
cul Lautern, prope Moguntiam in fossis et paludi-
bus.

33. *Poa loliacea*. Paturin loliacé. Lolch-
Rispengras. **

Festuca loliacea spicata, spiculis alternis sessilibus,
compressis, muticis. *Curt. lond.*
6. n. 66. Hoffm. 52. 1811. 1813
elongata. *Ehrh. gram.* 93. *Beitr.* 6. 133.
Dietr. I. 109.

Panicula spiciformis, disticha, simplex. *Spicu-*
lae alternae, muticae, compressae, fere sessiles.
Glumae corollaceae valvula exterior obscure quin-
quenervia, pubescens: interior striata glabra.

Habit. in pratis. *Germ.* Hannov. *Gall.* circa
Moguntiam in declivitate loricae extimae (culmo
vero compresso)?

34. *Poa curvata*. Paturin courbé. Gekrüm-
tes - Rispengras. ***

Radix . . . fibrosa, albida. *Culmus* ex
magna parte decumbens, internodiis incurvatis ad-
scendens, supremo stricto, erecto, longissimo, gla-
ber, teres, laevis, junior usque ad paniculam tectus,
florens infra paniculam 3 - 6 pollicum longitudine,
nudus, nodis purpureis glabris 2 - 3 instructus, pe-
dalisch - bipedalis. *Folia* virentia plana, 2 - 3 lineas
lata, 6 pollices - pedem longa, glabra, scabra, ad
basin plicato - auriculata, striata, profunde viridia,

sicca complicato-plana, ita ut interdum fere setacea sint. *Vaginae* laeves, glabrae, coloris foliorum. *Ligulae* brevissimae, margo quasi fuscus aut albidus. *Panicula* stricta, erecta, secunda, spiciformis, contracta, florens patentior, 3-6 pollices longa, 3-5 lineas lata. *Rhachis* plerumque flexuosa, sub-torta, uno latere excavato plano, laevis, glabra. *Pedunculi* plurimum bini alternatim semiverticillati, a basi statim ramosi, multiflori (spiculas 8-10 gerentes), cum spiculis pollicares; *intermedii* 2 (aut unicus), simplices; *omnes* erecto adpressi, aut paullulum patentes, florentes patentiores. *Spiculae* juniores teretes, ex ovato-lanceolatae, adultiores compressae distichae, 3-4 lineas longae, 1-2 lineas latae ex sordide viridi et albo variegatae, fasciculatae, sessiles et breviter pedicellatae. *Gluma calycina* *valvulis* marginibus argenteis instructis, laevis, glabris, lanceolatis, subacutis, *inferiore* breviore, angustiore, uninervia, *superiore* latiore, 2 lineas longa, trinervia. *Glumae corollaceae* 4-5; *valvula* *exteriore* laevi, glabra, lanceolata, acutiuscula, superne argenteo-marginata, 5 nervia, *valvula* *superiore* calycina paulo majore; *interiore* diaphana, margine nervoso, per lentem scabriusculo. *Antherae* flavae. *Stigmata* alba.

Var. 1. *Valvula exteriore* *corollacea* interdum infra apicem brevissimum mucrone exiguo, armato oculo vix visibili, instructa.

2. *Spiculis* supra medium solitariis et sessilibus alternis. *Panicula* superne loliacea.

Florentem plantam, mihi incognitam, mense Fruct. (β. Aug. — β. Sept.) in Monte prope Kleinwinterheim, inter rivulum et viam (Chaussée) inventi. —

35. *Poa disticha*. Paturin distique. Zwei-
zeiliges Rispengras. ***

Poa disticha spica disticha terminali, hinc convexa,
uscula illinc plana. Wulf. Jacq. ic. vol.

L. 19.

Cynosurus distichus, spica ovata, compressa, spi-
culis distichis, 5 floris, foliis
subulatis. Schrank. Hoffm.
49. Hopp. pl. rar. Cent.

Differt a loliacea:

Spica ovata, foliis subulatis. *Gluma calycina*
5 flora, violacea, valvulis 3 dentatis, spiculis circiter
12 imbricatis donata est. Flori Mess. — Fructe ill. & Jun. — &. Sept.

Habit. in alpinis. Germ. Carinth. Salisb. Tyrol.

AD TAB. XXIII.

XXII. Bromus. Droue. Trespe (Gramen. Tourn. Aegylops. Dillen.)

Linn. ed. Gil. 24. Mont. 32. Venten. 2. 108.
Lam. t. 46. Flor. dan. t. 289. Moench. m. 191.

Gluma calycina pluriflora, bivalvis: valvulis
oblongis, acuminatis, inferiore minore. *Glumae co-*
rollaceae 3 - 16, bivalves, maturitate plerumque re-
motiores et patentiores: valvula exteriore plerum-
que majore, magnitudinis circiter valvularum caly-
cinarum aut majore, raro minore, infra apicem aut
bisidum aut integrum, aut ex apice bisido plerumque
Aristam rectam emittente: interiore lanceolata, ple-
rumque exteriore minore interdum majore, mutica,
saepe marginibus inflexis setaceo-ciliatis donata. Fi-
lamenta tria, capillaria, corolla breviora. Anthe-
rae oblongae. Ovarium turbinatum. Styli duo bre-
ves, reflexi, villosi. Stigmata simplicia. *Glama*

O

corollacea semini adnata nec dehiscens. *Semen* unicum oblongum, tectum, hinc convexum, inde sultatum.

Panicula spiculis plus minusve compressis. *Spiculae* aut basi attenuata (*Festucoides*), aut basi apice multo latiore (*Bromoïdes*). *Vaginae* plerumque parum fissae.

**1. Bromus montanus. Droue des Montagnes.
Berg-Trespe. ****

Bromus montanus, panicula suberecta pedicillis simplicibus, distichis, arista petali longitudine. Scop. ed. 1. p. 205. ed. 2. 1. 82? panicula nutante, spiculis subsexfloris aristis longioribus. Pollich. I. p. 116. Roth. I. p. 49. 2. 141. Fl. d. Wett. I. p. 134. Schrank. I. 365. Dietr. I. 113. Hoffm. ed. I. p. 37. Oest. fl. I. 63. Wibel. w. 108. panicula nutante, spiculis distichis sexfloris, aristis corolla brevioribus. Moench. fl. hass. n. 90.

altissimus. Wigg. prim. p. 9. (?) .

glaber, panicula nutante, locustis quadrifloris, glumis subhirsutis. Hall. helv. n. 1506. (?)

giganteus. var. β . Linn. ed. Reich. I. p. 214. ed. Gil. 3. 105.

dumetorum. Lamarck. 1181. 6.

(asper. Linn. ed. Reich. I. 211. Gil. 3. 102. s. veg. ed. Pers. 123. ramosus. syst. ed. 13. p. 102. *Secundum* Pollich. 3. 319 (?).)

Gramen bromoides montanum, hirsutum, panicula minus sparsa, corniculata.
Scheuchz. agr. p. 263. t. 5. f. 16. (?)
avenaceum dumetorum, panicula sparsa.
Raj. hist. 1289. Tourn. 525.
Vaill. par. 93. Dill. giess. p. 71. Rupp. jen. p. 316.

Radix perennis, fibrosa, densa. Culmus erectus, 4 — 5 pedalis, teres, scabriusculus, nodis 5 — 6 praeditus. Folia plana, 4 — 6 lineas lata, 9 pollices ultra pedem longa, mollia, utrinque villosa, retrorsum scabriuscula, mucronata. Vaginae, praecipue inferiores, villosae, scabrae. Ligulae breves, obtusae, diaphanae. Panicula palmaris et longior, erecta, superne nutans. Pedunculi breves, 2 — 4 in semiverticillis alternis, simplices, ramosi. Spiculae lanceolatae, cum aristis pollicares, $1\frac{1}{2}$ lineam latae, ex tereti compressiusculae, virides, aut ex viridi et rubello variegatae, aetate rufescentes, villosae, scabrae. Gluma calycina valvula majore nervosa, lanceolata, 4 lineas fere longa. Glumae corollaceae 5 — 9, valvula exteriore, nervosa, lanceolata, acuminata, absque arista 5 lineas longa, infra apicem obtusiusculum, integrum, arista fere aequali, 4 lineas longa praedita.

Flor. Praer. — Therm. Matur. Therm. — Vend. 6. Maj. — 6. Aug. — 6. Jul. — 6. Oct.

Habit. in collibus et montibus sylvaticis, siccis, lapidosis, inque dumetis: Gall. — in Dep. Montis Jovis in sylva prope Bingen ueber der Nahe; circa Lautern; Steinbach. — in Depart: Rheni et Mosellae prope Stromberg. — Germ. in Hass. Palatin. Holsat. Wetterau. Carn. Bavar.

**2. *Bromus giganteus.* Droue gigantesque;
Riesentrespe. ***

***Bromus giganteus*,** panicula nutante, spiculis quadriploribus aristis brevioribus. Linn. ed. Reich. 1. 214. ed. Gil. 3. 104. s. veg. ed. Pers. 124. fl. suec. 2. ann. 199. it. scand. 394. Roth. 1. 49. 2. 141. —

Reyg. gedan. 1. p. 48. n. 5. Wigg. prim. p. 9. Huds. angl. p. 40. Hoffm. 56. ic. 11. f. 3. Weig. pom. n. 75. obs. bot. p. 11. t. 1. f. 5. Poll. 1. 115. Curt. Lond. 5. n. 58. Schrank. 1. 368. Schreber spic. p. 56. Graeser. 88. t. II. Wilke gryph. n. 62. Oestr. fl. 1. 63. Scop. 1. 80. exc var. 1. Plan. erf. p. 59. Leers. 38. t. 10. f. 11. Jacq. vind. p. 8. Moench. hass. n. 88. Meth. 193. Leyss. fl. hal. n. 114. Delarbre 38. Willden pr. n. 173. Nekker gallop. p. 66. Reich. frc. 19. Doerr. mass. p. 8. Scholl. barb. n. 88. Wibel. w. p. 342. Krock. 1. 168.

***Bromus glaber* locustis quadriploribus, nutantibus,
aristis longissimis. Hall. helv. n. 1510.
foliis digitii latitudine longissimis, panicula laxa.** Roy. prodr. 169.

Gramen avenaceum glabrum, panicula e spicis raris
strigosis composita, aristis tenuissimis. Raj. hist. 1909.
syn. 3. p. 415. 4. p. 56. Mont.
prodr. 57. Tourn. 526.
silvaticum, panicula altissima. Rupp. jen.
p. 313.

glabrum, panicula recurva. Vaill. par. p.
93. t. 18. f. 3.

bromoides aquaticum, latifolium, panicula sparsa tenuissime aristata. Scheuchz. agr. p. 264. t. 5. fl. 17.

Radix perennis, fibrosa, flavescens. Culmus basi incurvus, erectus, firmus, laevis, valde striatus, laete viridis, aut stramineus, nodis 4 — 6 oliveis aut atro-purpureis, cylindraceo-contractis, donatus, 3 — 6 pedalis, internodio supremo longissimo. Folia pedalia, et ultra pedalia, 4 — 9 lineas lata, nutantia, infra medium laevia, versus apicem paginis et marginibus scabra, basi subangustata, membrana dura flava aut fusca, lateribus falcatis ancta, plana, sulcato-striata, glabra, nervo dorsali albido praedita, laete viridia, siccata marginibus subconvolutis. Vaginae colore foliorum compressiusculae, striato-sulcatae, superiores, laeves, glabrae, inferiores scabrae aut scabriuscule, prae-cipue in dorso et versus apicem, ab apice usque ad basin fissae, (quod in plurimis Bromi speciebus non reperitur.) Ligulae flavescentes aut fuscae, superiores, breves, truncatae, fissae aut crenulatae, inferiores 1 — 1 $\frac{1}{2}$ lineam longae. Panicula pedalis-sesquipedalis, laxissima semiverticillis valde remotis, secunda, nutans. Rhachis-semiteres, latero plano subcanaliculato, nervo intermedio albido eminente notato, internodiis longis, inferioribus laevibus, angulis vero scabriusculis, superioribus scabris. Pedunculi bini, non raro infra medium coaliti, indeque solitarii, obscure triquetri, longissimi, scaberissimi, superne ramosi, nutantes. Spiculae ex tereti-compressiusculae, glabrae, scaberissimae, ex ovato-oblongo-lanceolatae, fere lineares, laete virides, albo variegatae, cum aristis 8 — 10 lineas, imo pollicem et ultra pollicem longae, 1 $\frac{1}{2}$ lineam latae. Gluma calycina valvulis angustis, acuminatis, corollaceis angustioribus et brevioribus. Glumae corollaceae 4 — 9; valvula exteriore angusto-lanceolata, 5 nervia, strigoso-scabra, margine argenteo, infra apicem vix manifestum, obtusum, per-

lentem bifidum, *aristam* mox rectam, mox flexuosa, mox curvatam, albantem, capillarem, scabram, valvula longiore (5-12 lineas longam) producente: *interiore* *exteriore* interdum majore, lanceolata, margine aut setoso-ciliato, aut scabro, non raro versus apicem aut integrum aut lacerum incisa, et quasi denticulata. *Squamulae* basi cartilagineae, apice acuto. *Antherae* flavae. *Stigmata* alba.

Var. 1. *Villosa.* *Culmo, foliis, vaginis, spiculis* villoso*s, aut pubescentibus.*

2. *aristis* basi rubellis, et *spiculis* apice violaceis, *pedunculisque* multo brevioribus. Linn. I. c. Lamarck. 1188.

3. *Fl. d.* Wetter. I. 133. Scop. var. I.

Flor. Mess. — *Fruct. Matur. Fruct.* — *Vend. β. Jun.* — *β. Sept.* — *β. Aug.* — *β. Oct.*

Habit. in sylvis, collibus, dumetis, pratis tamen siccis quam humidis, ruderatis, ad muros. tot. fere *Gall.* et *Germ.* — in nostro Depart. circa Lautern, Oderbach, Beutelsteinerschloß, Otterberg, Heilgenmoschel: in Depart. Rheni et Mosellae, prope Stromberg, in sylva bingensi. — Varietatem glabram, longe aristatam, inter Koenigstein et arcem, ad saepes, et in dumetis, inveni.

3. *Bromus elatior.* Droue élevée. Hohe Trespe. *

Festuca elatior, *panicula secunda* erecta, *spiculis* subaristatis, exterioribus teretibus.

Linn. ed. Reich. I. p. 207. ed. Gil. 3. 99. s. veg. ed. Pers. 122. fl. suec. 91. 94.

panicula spicata, *spiculis uno* versu inclinatis submuticis. Roy. lugdb. 68.

Poa elatior *panicula subsecunda* *spiculis octofloris*,

- teretibus, compressis, culmo erecto.
Moench. hess. n. 77.
- panicula spicata stricta, spiculis oblongis,
erectis, multifloris, submuticis. Gmelin.
sib. I. p. 109.
- foliis latis, asperis, locustis teretibus, muti-
cis, glumarum eris membranaceis. Hall.
helv. n. 1451.
- phoenix Scopoli. 174. Oestreichs. flor. I. 59. ?
- Gramen arundinaceum spica multiplici, Calama-
grostis Dioscoridis. C. Bauh.
p. 6. Volk. norimb. p. 197.
- pratense majus locustis tumidis. Buxb.
cent. 5. p. 41. app. n. 16.
- loliaceum panicula multiplici et spicata.
Scheuchz. agr. p. 200. t. 4.
f. 6. Buxb. hal. p. 146.
Hall. goett. p. 44.
- spica divisa, pratense majus.
Moris hist. 3. p. 184. n. 15.
s. 8. t. 2. f. 15.
- elatius locustis modo muticis,
modo brevissimis, aristis
instructis. Mont. prodr.
36. Seguier. Veron. I. 337.
- paniculatum arundinaceum spica multiplici.
Rupp. jen. p. 314.
- elatius, spicis longis muticis
squamosis. Tourn. 522.
Scheuchz. agr. p. 202. Dill.
giess. n. 90. Vaill. par. 92.
Raj. hist. 1286. angl. 3. p.
411. 4. p. 51.
- spartum spica brizae, paniculata, et cor-
niculata. Barr. rar. 1154.
§ 25. ?

Lamarck. 1180. 10. Curt. Lond. 6. n. 66. Grimm. isen. p. 265. Jacq. vind. p. 17. Nekker gallob. p. 60. Roth. 1. 46. 2. 128. Poll. 1. 104. Doerr. nass. p. 18. Hofst. 51. Weig. pom. n. 70. Fl. d. Wetter. 1. 120. Gmelin. tub. p. 26. Matuschk. sib. 1. 62. Plan. erf. p. 58. Moench. meth. 190. Leyss. hal. n. 105. Leers. 34. t. 8. f. 6. Wilke gryph. n. 58. Schrank. 1. 354. Willden. prodr. p. 42. Wigg. prim. p. 8. Lestib. 222. Schreb. spic. p. 58. Graes. 34. t. 2. Scholl. barb. n. 80. Panz. lin. 12. 401. Delarbre. 86. Oestr. flor. 1. 61. Wibel. w. 106. Krock. 1. 158.

Radix perennis, repens, articulata, fibris albis aucta. *Culmi* basi incurvati, erecti, aut paululum geniculato-erecti, ad infimos geniculos, saepe radicantes, 2-4 pedales, aut teretes, aut ad genicula compressiusculi, laeves, striati, virides, 3-5 nodis purpureis instructi. *Folia* patentia, in margine et superiore pagina scabra, striata, inferiore laevia, viridia, nervo albo dorsali donata, aetate plerumque marginibus convolutis: *radicalia* 1-3 pedes longa, 3-4 lineas lata: *culmea* breviora. *Vaginae* striatae, laeves, interdum praecipue inferiores scabriusculae, glabrae, virides. *Ligulae* vix ullaee. *Panicula* 6-15 pollices longa, junior subnutans, adultior erecta, pyramidalis, subunilateralis, secunda, raro spiciformis, florens patula. *Rhachis* semiteres, uno latere plano excavato, angulis scabriusculis, internodiis longioribus quam in *Brom. arund.* *Pedunculi* ad basin paululum nodosi, inferiores pluriflori, ramosi, gemini, inaequales, divergentes, interdum solitarii, uniflori aut pluriflori, compressi, hispidi, strictiores, in anthesi fere horizontales; superiores solitarii, breves et per breve, semiverticaliter erecti. *Spiculae* ovato-lanceolatae, acutae, teretes, 4-10 lineas longae, lineam aut paulo magis latae, florentes compressae, siccatae distichae, virides,

aut ex sordide violaceo et albo variegatae, superiores fere sessiles, erectae. *Gluma calycina valvulis mucronatis, lanceolatis, marginibus argenteis, exteriore trinervia, altera duplo fere minore, interiore ovato-lanceolata, mucronata, 2-2 $\frac{1}{3}$ lineam longa.* *Glumae corollacea 5-11, florentes patentissimae, valvula exteriore obscure quinquenervia, laevi, 3 lineas longa, ovato-lanceolata, aut mutica (speciemque Poae referente) aut breviter aristata, aristा vix visibili, plurimum, certe armato oculo, infra apicem brevissimum, aut bifidum aut integrum, egrediente; apici vero ita adpressa, ut ex eo (sicuti in Festucis) provenire videatur.* Interdum etiam in una eadem que spica acumen apicis tenuerrimum cafet. Cæterum valvula exterior corollacea apice et marginibus diaphanis et glabris instructa est. *Interior valv. coroll. nervo marginali, marginibusque inflexis, apice bifido donata.* *Squamulae oblongae acutae.* *Antherae longae bifurcate, purpureae aut flavae.* *Stigmata alba.*

Flor. Flor. — Fruct. Matur. Mess. — Vend.

— Apr. — Sept. — Jun. — Oct.

Habit. in pratis, pascuis, pomariis, aggeribus, totius fere *Gall.* et *Germ.* in nostro Depart. fere ubique prope Moguntiam in pratis (Bleichwiesen), ad vias circa Weissenau, ad rivulum Hartebach, — Haud procul Hochheim in pratis.

4. *Bromus arundinaceus.* Droue aquatique.

Wassertrespe. ***

Bromus arundinaceus, panicula erecta contracta, spiculis oblongis, scabris, subaristatis, paucifloris.

Roth. 2. p. 141. 3. 566. 1580.
panicula laxa, locustis quadrifloris brevissime aristatis. Weig.

obs. bot. p. 12. Hall.
helv. 1511.

An? *Bromus aquaticus* panicula suberecta, pedunculis geminis, spiculis oblongo-ovatis glabris, aristis valvulis longioribus. Schrank, I. 367.

Festuca arundinacea, panicula erecta stricta, spiculis oblongis erectis paucifloris aristatis, calycibus angustatis. Schreb. spic. p. 57. Roth. Verz. a. G. T. 270. p. 240. Hoffm. 52. Ehrh. gram. 125.

elatior. var. *arundinacea*. Roth. I. 46.

pratensis. Lamarck. 1180. 15. Lestib. 223. Huds. angl. 37.

locustis teretibus multifloris, glumis semi-membranaceis, breviter aristatis. Hall. helv. n. 1433.

Gramen arundinaceum, *locustis viridi-spadiceis*, *lliaceis*, *brevius aristatis*. Scheuchz. agr. p. 266. t. 5, f. 18.

Radix perennis, repens. *Culmus* basi plus minusve obliquus, aut totus erectus, laevis, crassitie fere pennae anserinae, 2 - 6 pedalis, teres, non raro compressiusculus, striatus, nodis purpureis aut olivaceis 3 - 4, internodio supremo longissimo, raro ad basin ramosus, ramis sterilibus. *Folia* dura, glabra, plana, siccata margine convoluto, mucronata, striato-sulcata, scabra (certe apice), subtus pallidiora, nitida, nervo dorsali albido, basi utrinque auriculato-plicata, auriculis fuscis; *radicalia* pedalia-bipedalia, et longiora, patentia: *culmea* 6 pollices - sesquipedem longa, 2 - 6 lineas lata. *Vaginae*

striato - sulcatae, glabrae, inferiores interdum (prae-
cipue versus apicem) scabriusculae, ab apice fere
ad basin fissae, marginibus diaphanis. *Ligulae* loco
margo fuscus. *Panicula* 3 pollices - pedem et ultra
longa, erecta, ramosa, contracta, florens patens et
laxiflor: maturitate subsecunda, et nutans. *Rhachis*
semiteres, uno latere canaliculato, dorso laevi, an-
gulis, certe in internodiis superioribus, scabris.
Pedunculi inferiores gemini, terni et solitarii, inae-
quales, scaberrimi, compressi, cum *pedicellis* sub-
flexuosi, pluriflori, basi albido-nodosi. *Spiculae*
oblongae glabrae, obtusiusculae, teretes, erectae,
aestate compressiusculae, 3 raro 6 - 10 lineas longae,
ante Anthesin lineam latae, ex sordido viridi-albo-
et violaceo pictae, superiores sessiles. *Gluma caly-
icina* *valvulis* lanceolato-linearibus, dorso viridi-
bus scabriusculis, mucronatis. *Glumae corollaceae*
plerumque 4 - 6 calycina majores; *valvula exteriore*
oblonga, dorso scabra, ante et in anthesi mutica
apparente, dein infra apicem parvum, armato oculo
obtusum, et plerumque integrum, non raro autem
(per bonam lentem) bifidum, *aristam* producente,
validam, rigidam, rectam, scabram, acetate $1\frac{1}{2}$ - 2 li-
neas longam: *interiore* interdum paululum exteriore
majore, lanceolata; obtusiuscula, bifida, margine
viridi, scabro. *Antherae* violaceae aut luteae. *Stig-
mata* alba. — (Tota planta durior et rigidior, quam
Brom. elatior; Habitusque magis arundinaceus.)

Flor. Mess. — Therm. — Jun. — Aug.

Habit. in nemoribus humidis, dumetis, ad ri-
vulos, in pratis uidis: *Gall.* — prope Moguntiam in
pratis uidis, inter Nakkenheim et Laubenheim. —
Germ. in Saxon. Brem. — inveni quoque ad rivulum
Kaesbach, lateris Rheni dextri prope der Donners-

mühle, et in pratis Kostheimensibus ad rivulum
Kaesbach positis.

5. *Bromus arvensis*. Droue des Champs.
Feld-Trespe. *

Bromus arvensis, panicula nutante, spiculis ovato-oblongis. Linn. ed. Reich. I. p. 212. ed. Gil. 3. 103. s. v. ed. Pers. 123. fl. suec. 85. 97.

giganteus var. I. Scop. I. 80.?

polymorphus. Scop. I. 79.

Culmo paniculato, spicis compressis. Fl. lapp. 27. H. el. 25. Sauv. 38.

glaber, locustis octifloris, nutantibus, glabris, glumis marginatis. Hall. helv. n. 1509. 2. n. 1510. 2. n. 1511.

panicula diffusa, spiculis teretibus. Sauv. 38.

Festuca guaminea, effusa juba. C. Bauh. pin. p. 9. prodr. p. 19. theatr. 144. J. Bauh. hist. 2. p. 479. Scheuchz. agn. p. 262. t. 5. f. 15.

nemoralis latifolia mollis. C. Bauh. pin. 10.

elatior paniculis minus sparsis, locustis oblongis strigosis, aristis purpureis, splendentibus. Rupp. jenit. p. 315.

bromoides segetum, latiore panicula. Hall. goett. p. 43. Vaill. par. 95 usd.

avenaceum dumetorum, paniculatum, manus, glabrum. Moris. hist. 3. 213.

Gramen pratense paniculatum, altissimum, locustis parvis splendentibus, non aristatis. Tourn. 524. Mapp.

Oeder. t. 293. Pollich. I. 213. ? Leyss. hal. n. 112.
 Goian. h. 51. fl. 125. Willden. prodr. n. 171. Smith.
 in transact. Linn. 4. 281. Lamarck. 1181. 137. Weig.
 pom. p. 73. obs. p. 6. t. 1. f. 3. Zinn. goett. p. 68. Fl.
 d. Wetter. I. 131. Roth. I. 48. 3. 138. Reyg. gedan. I.
 p. 48. n. 2. Boehm. lips. n. 641. Krock. I. 167. Schrank.
 I. 356. Scholl. barb. n. 86. Leers. 37. t. 11. f. 3. Wi-
 bel. w. 108. Moench. fl. n. 86. Reich. 19. Doerr. p. 7.
 Nekker gallob. p. 61. Plan. erf. p. 59. Dietr. I. 112.
 Gmelin. tub. p. 28. Murr. prodr. p. 42. Hoffm. 55.
 Jacq. vind. p. 17. Wilke. gryph. n. 61. Delarbre. 38.
 Oestr. fl. I. 63.

Radix annua, fibrosa. Culmus 2-4 pedalis, ju-
nior obliquus, adultior erectus, glaber, nodis 3-4,
purpureis. Folia plana, latiuscula, subtus et mar-
gine scaberrima, supra villosa. Vaginae striatae,
margine piloso. Ligulae acutiusculae, multifidae.
Panicula parum nutans, 4-10 pollices longa. Pe-
dunculi 4-6, alternatum semiverticillati, simplices
et ramosi, longi, siliiformes, scabri, ad bases et ra-
mificationes nodosas non raro. Bractea subulata brevi
instructi. Spiculae ex ovato-lanceolatae, teretius-
culae, nutantes, ex viridi albo purpureoque colora-
tae, interdum minus coloratae tantum virides appa-
rent, per lentem pubescentes et paululum strigosae,
cum aristis parum ultra pollicem longae, lineam la-
tiae. Gluma calycina valvulis carinatis, muticis,
obtusiusculis, nervosis, corollaceis minoribus. Glu-
mae corallaceae 5-10, valvula exteriore margine
membranaceo albido, ex ovato-lanceolata, nervosa,
infra apicem brevem obtusum aristam 2-3 lineas
longam, crassiusculam, subulatam, rectiusculam,
saepe flexuosa, emittente. Squamulae ovatae. An-
therae purpureae. Stigmata alba.

Var. Mutica, panicula erecta.

Flor. Flor. — *Mess.* Matur. Mess. — *Fruct.*
β Apr. — *β Jul.* *β Jun.* — *β Sept.*
Habit. ad margines agrorum, in versuris, pratis
 siccis, ad vias, inter segetes, totius fere *Gall.* et
Germ.

6. *Bromus squarrosus*. Droue rude. Sparri-
 ge Trespe. **

Bromus squarrosus, panicula spiculis ovatis, aristis
 divaricatis. Linn. ed. Reich. I. 210.
 ed. Gil. 3; 101. s. v. ed. Pers. 123.

Bromus foliis hirsutis, per oras asperrimis, locustis
 glabris, teretibus, novemfloris. Hall.
 helv. n. 1503. excl. syn. Reich. frc.
 n. 72. Grimm. isen. emend. p. 121.
 polymorphus. Scop. I. 79.

Avena locustis teretibus novemfloris, aristis reflexis.
 Hall. helv. n. 1501.

Gramen seu Festuca graminea, glumis vacuis. Magn.
 bot. 121. hort. 92. Sauv. 38. Scheuchz.
 agr. 251. t. 5. f. II. Bauh. pin. 144.
 prodr. 64.

festuceum majus, locustis crassis, lanugi-
 nosis. Buxb. cent. 5. p. 19. t. 38. f. I.
avenaceum locustis amplioribus, candican-
 tibus, glabris et aristatis. Tourn. 525.
phalaroides, acerosum nutante spica. Barr.
 ic. 24. f. I. 2. Mont. ic. 52.

Goian. hort. 50. fl. 125. Fl. der Wett. I. 129.

Oestr. fl. I. 63. Hoffm. 54. Moench. meth. 192. Die-
 trich. I. III. Schrank. I. 361. Kerner. t. 497. Lestib.
 224. Smith. in trans. lin. 4. 281. Delarbre. 38. Krock.
 I. 162.

Radix annua, fibrosa. *Culmus* 2-3 *pedalis*. *Fo-*
lia 2-3 *lineas lata*, *villosa* (*villis* in *siccatis* *vix* *ma-*
nifestis), *scabriuscula*, *laeviter striata*. *Vaginae*

pubescentes. *Panicula laxa*, secunda, minime unilateralis, primo erecta, matura nutans. *Pedunculi* plures semiverticillati, simplices, et subramosi; filiformes, apice incrassato. *Spiculae* ovatae, crassinculæ, erectæ et subnutantes, glauco-virides, albo variegatae, teretes, aetate planæ, squarrosæ. *Glumæ corollaceæ*, 7-14, maturæ divergentes, *valvula* exteriore dorso glabro, margine ciliato, infra apicem incisum aristata; *arista* recta, aut flexuosa, matura saepe recurva.

Var. 1. Spiculis villosis.

2. Panicula pauciflora, spiculis alternis.

Flor. Praer. — *Therm.*

8. Maij. — *8. Aug.*

Habit. in agris, arvis, pratis siccis, inter segetes. *Gall.* — in Depart. de l'Hérault, de la Loire, du Rhône, Saône, Haute Saône, Saône et Loire, du Puy du Dome. — *Germ.* in Austr. Bavar. Wetterau. Siles.

7. *Bromus secalinus*. Droue seiglin. Roggen-Trespe. 1628

Bromus secalinus, panicula patente, spiculis ovatis, aristis rectis, seminibus distinctis. Linnæus ed. Reich. 208. ed. Gilib. 100. sive veg. ed. Pers. 123. Fl. suec. 84. 90.

panicula nutante, spiculis ovatis, compressionis, glumis nudis distinctis, aristis subulatis brevioribus, flexuoso-rectis. Roth. 1. 47. 2. 133.

vitosus. Weigel. obs. bot. p. 4. t. 1. f. 2. Schrank. 1. 358.

foliis glabris locustis duodecemfloris. Hall. helv. n. 1502. var. 8?.

squarrosus. Lamarck. 1181. § 2.

polymorphus. Scopol. I. 80.

Festuca graminea glumis glabris. C. Bauh. pin. p. 9.

Scheuchz. agr. p. 251. t. 5. f. 10.

Berg. frc. p. 323. n. 2.

culmo paniculato, spicis compresso-ovatis.

Fl. lapp. 28. Roy. lugdb. 67.

Sauv. 38.

*Gramen avenaceum arvense, glumis non villosis, et
veluti compressi.* Rupp. jen. p. 316.

locustis glabris purpurascensibus

et aristatis. Tourn. 525. Buxb.

hal. p. 142. Mapp. 138,?

segetale majus, gluma turgidiore.

Moris. h. 3. s. 8. t. 7. f. 17.

Gramen Gros Montbelgard. J. Bauh. h. 2. p. 438. Magn. bot. 121. hort. 92.

Pollich. I. 108. 3. 318. Willden. prodr. n. 167.

Reyg. gedan. I. p. 48. n. 1. Gmelin. tub. p. 27.

Gooian. hort. 50. fl. 124. Wilke. gryph. n. 60. Fl.

d. Wetter. I. 125. Leyss. hal. n. 107. Moench. fl.

n. 83. Wigg. prim. p. 8. Doerr. nass. p. 7. Murr.

prodr. p. 42. Smith. in transact. lin. 4. 281. Mat-

tuschk. I. 65. Leers. p. 36. t. 11. f. 2. Zinn. goett.

68. Plan. erf. p. 58. Nekker. gallob. p. 163. Weig.

pom. n. 72. Dietr. I. p. 110. Reich. frc. 18. Hoffm.

53. Scholl. barb. n. 82. Delarbre. 38. Oestr. fl. I.

62. Wibel. w. 108. Krock. t. 160.

*Radix annua, ramosa, fibrosa. Culmus laevis,
glaber, 3-4 pedalis, erectus, striatus, teres, stri-
ctus, laete viridis, nodis 4-6 atro-olivaceis, ple-
rumque incrassatis, et saepe angulo circulari emi-
nente donatis, obliquis, vix pubescentibus instru-
ctus. Folia plana, 2-3 lineas lata, 5-7 pollices longa,
nervosa, nervo albido intermedio praedita, striata,
rigidiuscula, supra hirsuta aut pubescentia et sca-
brius-*

briuscula, margine, versus basin paululum attenuata et pilis raris brevibus donata, micronata, laete viridia. *Vaginae* striatae, glabrae, inferiores fere totae tubulosae, apice tantum paululum fissae, superiores vero usque ad medium, *infiniu* rarissime villosiuscula. *Ligulae* obtusae, parvae, dentatae. *Panicula* 3-8 pollices longa, secunda, patens, primo erecta, demum apice nutans. *Rachis* internodiis semiteretibus, angulatis, glabris, laevibus. *Pedunculi* 4-9, raro solitarii aut bini, angulato-compressi, inaequales, alternatim semiverticillati, longi, simplices et ramosi, scabri, basi cartaginei flavique. *Pedicelli* subflexuosi. *Spiculae* ex glauco pallide virides, albo variegatae, ovatae, oblongae, juniores teretiusculae, interdum curvatae, demum compressiusculae, glabrae, cum aristis 5-15 lineas longae, 3-4 lineas latae, semper ex erecto nutantibus, aetate flavae. *Gluma calycina* nervosa *valvulis* pubescensibus (quod quidem, ino per lentem, nunquam vidi,) obtusiusculis; *exteriore* ovata, obtusissima, dorso scabriuscule, margine membranaceo angusto; *interiore* parum minore, ovato-lanceolata, acutiore. *Glumae corollaceae* 8-16, glabrae, maturitate remota, distinctae, divergentes, subsquarrosoae, convolutae et fere cylindraceae; *valvula exteriore* versus apicem latiore, ovata, margine albo, concava, obtusa, glabra, 7. nervia, subnifida, apice dorsoque scabriuscule, calycinis paulo majore, infra apicem obtusum bifidum aristata, *arista* valvula aut breviore, aut ei aequante, primo flexuosa, dein recta, scabriuscule: *interiore* lanceolata, setaceo-ciliata. *Squamulae* ovatae, acutae. *Antherae* fulvae. *Stigmata* alba.

Var. I. mutica; circa Moguntiam vulgaris.

2. *spiculis* 3-4 floribus; (in fossa primaria prope portam Gauthor.)

Flor. Flor. — Fruct. *Matur.* Mess. — Vend.

2. Apr. — 2. Sept. — 2. Jun. — 2. Oct.

Habit. in agris secalinis, praecipue argillaceis, arenosis, et depresso, rarius ad vias, aut margines pratorum; tot. fere Gall. et Germ. — in nostro Depart. prope Lautern, ad molam imperialem; circa Bingen et in monte sancti Rochi; haud procul Moguntiacum auf dem Hartenberg. — Quoque circa Ditebergen, Telkenheim et Hochheim.

8. *Bromus tectorum*. Droue des toits.

Dach-Trespe.

Bromus tectorum, panicula nutante, spiculis linearibus. Linn. ed. Reich. I. 213. ed. Gil. 3. 104. fl. suec. 86. 98. s. veg. ed. Pers. 124.

grandiflorus var. β . Weig. obs. bot. p. 10. *arvensis* var. β ? Lamarck. 1181. 13. Lestib. 225.

hirsutus, panicula nutante pauciflora, locustis quinquefloris hirsutis, glumis acute lanceolatis. Hall. helv. n. 1508.

polymorphus. Scop. l. c.

Festuca avenacea sterilis, spicis erectis. Raj. angl. 3. p. 413. Pluk. alii. 174. t. 299. f. 2. *sterilis*, pedicellis brevioribus et spicis erectis. Motis. hist. 3. p. 212. s. 8. t. 7. f. 13.

sterilis humilior. C. Bauh. p. 10. Dill. gies. p. 79. Schleuchi. agr. p. 259.

Aegilops minor, panicula rario, locustis majoribus. Dill. gies. p. 163. app. p. 63. t. 3.

Gramen murorum, spicis pendulis angustioribus. Tourn. par. 91.

Roth. I. 48. 2. 139. Pollich. I. 114. Willden. prodri. n. 174. Reyg. gedan. I. p. 48. n. 3. Weig. pom. n. 74. Nekker. p. 64. Gmelin. tab. p. 28. Göttan. hort. 51. ? II. 125. ? Plan. erf. p. 59. Fl. d.

Wett. I. 132. Jacq. vind. p. 18. Schrank. I. 364.
 Wigg. prim. p. 9. Dietr. I. 112. Leyss. hal. n.
 113. Hoffm. 56. et ic. II. f. 2. Zinn. goett. p. 68.
 Doerr. nass. p. 8. Schreber. spic. p. 56. Moench.
 hess. n. 87. Meth. 193. Berg. frc. p. 324. Scholl.
 barb. n. 87. Leers. 38. t. 10. f. 2. Murr. prodr. p.
 42. Delarbre 38. Oestr. fl. I. 63. Wibel. w. 109.
 Krock. I. 172.

Radix annua, fibrosa. Culmi palmares - pedales, tenues, erecti, glabri, laeves, nodis parvis 3-4 instructi, deflorati decumbentes et rufescentes. Folia glauco-viridia, plana, angusta, utrinque hirsuta aut villosa aut pubescentia, mollia, marginibus versus basin ciliatis. Vaginae praecipue inferiores villosae, glauco-virides, aut rufescentes, superiores striatae et magis quam inferiores fissae. Ligulae truncatae, inciso-dentatae. Panicula primo erecta, dein secunda, aetate nutans. Rachis internodiis pubescentibus. Pedunculi 4-5, in semiverticillis alternis, capillares, ramosi; pubescentes, scabri. Spiculae oblongae, angustae, teretusculae, laeves, nutantes, pubescentes, aut villosae, cum aristis vix pollicem longae. Gluma calycina nervosa, valvula majore 4, minore 3 lineas longa. Glumae corollaceae plerumque 5, maturae divergentes, squarrosoe, terminales saepe abortientes; valvula exteriore trinervia, ex viridi purpurascente, margine albo, 5 lineas longa, infra apicem acutissimum bifidum aristata, arista recta, tenuissima 5-6 lineas longa, interiore margine reflexo; ciliato, piloso.

Flor. Flor. — Fruct. — β. Apr. — β. Sept.

Habit. in collibus siccis, muris, tectis, agris, ad vias tot. fere Gall. et Germ. — in nostro Depart. hand procul Lautern, Hartenburg, Durckheim, Cretten, (circa Moguntiam in muris munimento-rum.?)

9. *Bromus sterilis.* Droue sterile. Taube
Trespe. *

Bromus sterilis, panicula patula, spiculis oblongis
distichis, glumis, subulato-
aristatis. Linn. ed. Gil. 3.
103. ed. Reich. 1. 212. s. veg.
ed. Pers. 123.

panicula nutante, spiculis ovato-
oblongis. Berg. frc. n. 324. 2
distichus. Moench. m. 192.
grandiflorus. Weigel. obs. p. 19.
Oestr. fl. 1. 63. Schranck. 1.
362. (an variet. major?)
panicula nutante, locustis septem-
floris, glumis argute lanceo-
latis, lineatis, subhirsutis.
Hall. helv. n. 1505.

Bromos herba. Dod. cer. 141.

Festuca avenacea sterilis elatior. C. Bauh. pin. p.
9. Dill. giess. p. 80.

graminea, annua sterilis, spicis depen-
dentibus. Moris. h. 3. p. 212.
s. 8. t. 7. f. II.

Aegilops 1. Mathiali Diosc. p. 746. J. Bauh. h. 2.
p. 439.

Gramen avenaceum panicula sparsa, locustis majori-
bus et aristatis. Tourn.
526. Mapp. 137. Scheuchz.
agr. p. 258. t. 5. f. 14. Buxb.
hal. p. 142. Hall. goett. p.
48. Rupp. jen. p. 315.

loliaceum locustis longissimis, modo pur-
purascensibus; modo viridi-
bus. Mont. 35. ic. 1.

Lamárck 1181. 12. Zinn. goett. p. 68. Plan.

erf. p. 59. Pollich. I. 112. Curt. Lond. t. 24.
 Gmelin tub. p. 27. Nekker. p. 65. Grimm. isen. p.
 265. Goilian. h. 50. fl. 125. Doerr. nass. p. 7. Fl. d.
 Wetter. I. 131. Lestib. 225. Roth. I. 48. 2. 137.
 Leers. 37. t. II. f. 4. Dietr. I. 112. Hoffm. 55. ic.
 II. f. 4. Willden. prodr. n. 170. Scop. I. 78. Leyss.
 hial. n. III. Schranck I. 363. Schöll. barb. n. 84.
 Reich. frc. 19. Smith. in transact. Lin. l. c. Moench.
 hass. n. 85. Murr. prodr. p. 42. Delarbre. 38.
 Oestr. flor. I. 62. Vibel. w. 109. Krock. I. 165.

Radix annua, fibrosa, fibris capillaribus. Culmi
1-3 raro — 6, pedales, saepe usque ad paniculam fo-
lliati et tecti, erecti, inferne non raro incurvi aut
geniculati, raro ramosi, striati, glabri, nodis 5-6
angulo eminente donatis, purpureis. Folia plana,
2-4 lineas lata, 3-6 pollices longa, mucronata, basi
margineque scabriuscula, glauco-aut laete viridia,
nervo dorsali albo notata, certe inferiora superiore
pagina villosa. Vaginae inferiores villosae, pilis
dellexis, et quoad maximam partem coailatae, margi-
nibus nudis; superiores non raro scabriusculae et
glabrae, omnes saepe in latere dorsali ruptae, striatae.
Ligulae obtusae, lacerae et quasi denticulato-cilia-
tae. Panicula semipedalis-pedalis, laxa, 10-60 spi-
culas gerens, primo contracta, dein patula et nutans.
Rachis fere teres, interdum angulata. Pedunculi
2-8 alternatim semiverticillati, mox longi, mox
breviores, apice incrassati, basi connati, filiformes,
compressi, hispidi aut pilosi et laeviores, simplices
vel ramosi (prope Maguntiam saepe ramosissimi.)
Spiculae ovato-oblongae, lanceolatae, florentes ob-
verse lanceolatae, ex glauco-viridi et albo, inter-
dum purpureo variegatae, raro totae violaceae, mar-
ginibus albis donatae, striatae, juniores erectae, dein
nutantes, scabrae, glabrae, raro per lentem pubes-
centes, compressae, 2 lineas fere latae, cum aristis

interdum 2 pollices longae. *Gluma calycina valvulis* lanceolatis, carinatis, mucronatis; *majore* 6, *minore* 4 lineas longa. *Glumae corollaceae* 6-10, terminales abortientes breviusque aristatae, florentes divergentes; *valvula exteriore* 7 lineas longa, lanceolata, mucronata, 3-7 nervia, nervis viridibus scaberrimis, albo-marginata, carinata, et infra apicem acuminatum acutissimum bifidum *aristam* rectam semipollicarem-pollicarem et longiorem scaberrimam producent: *interiore* setis raris in margine reflexo pectinata. *Squamulae* ovatae crenulatae. *Antherae* subpurpurascentes. *Stigmata* alba.

Var. 1. *Panicula* nutante, *spiculis* alternis erectis, pubescentibus 2-4 (in agris et ad vias).

2. *Vaginis* et *foliis* valde ciliatis.

Flor. Flor. — *Fruct.* Matur. rarissime.

4 Apr. — 8 Sept.

Habit. in agris, sylvis, incultis, ad vias, sepes, muros, in ruderatis: tot. fere *Gall.* et *Germ.* — in Depart. Montis Jovis circa Moguntiacum in loricatum extimarum declivitate; in monte Harteberg; prope Zahlbach; Weissenau; Lautern; Alzei; Bingen.

10. *Bromus asper*. Droue rude. Rauhe Trespe. *

Bromus asper panicula nutante scabra, spiculis villosis aristatis, foliis scabris. Linn.ed. Reich. 1. 211. ed. Gil. 3. 102. s. veg. ed. Pers. 123. ramosus. syst. veg. ed. 13. p. 102. hirsutus. Curt. lond. no. 8 -- Hoffm. 55. panicula ramosa nutante scabra, spiculis linearibus decemfloris, arista longioribus, foliis scabris. Huds. angl. 40. n. 7. ?

Festuca graminea, nemoralis, latifolia, mollis. C,
Bauh. p. 9. theatr. 144.

dunetorum, juba longiore. Moris.

hist. 3. p. 213. s. 8. t. 7. f. 27.

Aegylops major, caule et foliis arundinaceis, locustis
glabrioxibus, e fusco-xerampeli-
nis. Dill. giess. p. 130. app. p. 60.?

Roth. I. 48. 2. 136. Fl. d. Wett. I. 130. Moench.
m. 193. ?) Leyss. hal. n. 110. Murr. prodr. p. 42.
Smith. in transact. Lin. 4. 281. Oestr. fl. I. 63. Krock.
I. 164. c. ic.

Radix perennis, fibrosa, densa. *Culmi* 2 - 5,
pedales, pubescentes, obliqui, striati, scabriuscui,
nodos incurvis pubescentibus. *Folia* plana, lata,
longa, e glanco-viridia, villosa, ubique et margine
praeципue scabra. *Vaginae* striatae, pubescentes, in-
feriores deorsum hirsutae, scabriuscuae. *Ligula*
subacuminata, interdum lacora. *Panicula* palmaris
flaccida, nutans. *Pedunculi* 3 - 4, alternatim semi-
verticillati, longi, tenues, debiles, scaberrimi, ra-
mosi, et simplices. *Spiculae* oblongo-lanceolatae,
fere lineares, ex tereti compressiusculae, pendulae,
pubescentes. *Gluma calycina valvula exteriore* li-
neari, carinata, mucronata; dorso purpureo scabra;
interiore trinervia, nervis elevatis, purpureis, sca-
bris. *Glumae corollaceae* 5 - 14, compressae, lau-
ceolatae, utrinque attenuatae; maturitate distichae,
distinctae: *valvula exteriore* trinervia, dorso piloso,
scabro, infra apicem brevem, bifidum, tenuissimum
aristam aequalem, aut *valvula minorem*, purpuream,
scabram, rectam emittente.

Flor. Praer. — *Fruct.* *Matur. Fruct.* — *Vend.*
β Mai. — β Sept. — β Aug. — δ Oct.

Habit. in dunetis, sylvaticis, nemorosis, agris,
montosis. *Germ.* in Hassia, Saxon. Wetterau. Ha-
nov. Hannover.

11. *Bromus multiflorus*. Droue multiflore.
Vielblütige Trespe. *

Bromus multiflorus, panicula patente, spiculis lanceolatis, compressis, glumis nudis, marginatis, imbricatis, aristis capillaribus aequalibus rectis. Weig. obs. bot. p. 25. t. 1. f. 1. Roth. I. 47. 2. 134. (exc. plurim. synon.) Fl. der Wett. I. 127. Schrank. I. 358.

panicula erecto patente, pedunculis subsimplicibus, spiculis ovato-lanceolatis compressis suboctofloris, aristis rectiusculis, glumae longitudoine. Ehrh. gr. 116. Hoffm. 53.

secalinus, var. *hordeaceus*, panicula erecta, coarctata. Linn. ed. Reich. I. 209. ed. Gil. 3. 101. Fl. suec. I. n. 87. Matuschk. I. 66. Reyg. ged. I. p. 48. n. 4. Krock. I. p. 168.

foliis glabris, locustis duodecimfloris. var. I. Hall. helv. n. 1502. panicula patente, spiculis ovatis. Berg. fr. p. 323?

Festuca graminea glumis hirsutis. C. Bauh. p. 9. Scheuchz. agr. p. 250. t. 5. f. 9. Rupp. jen. 315.

Gramen ad gramen dū Gros accedēns. Magn. bot. 121. spica hirsuta ad Gramen du Gros accedens. Magn. hort. 92.

Radix annua, fibrosa. Culmi 2-3 pedales, laeves, erecti, glabri, nodis pubescentibus, purpureis

5-6. *Folia* plana utrinque villosa, molliuscula, marginibus scabris. *Vaginae* pubescentes aut hirsutae, pilis deflexis, maxima ex parte tubulosae. *Ligulae* crenulatae. *Panicula* fere pedalis, patens, junior erecta, adultior nutans. *Rhachis* scabra, glabra, ex semitereti obscure trigona. *Pedunculi* 6-8, inaequales, valde breves et 2-3 pollices longi, alternatim semiverticillati, capillares, simplices ramosique, scabri. *Spiculae* ex ovato-lanceolatae, compressissimae, villosae aut subhirsutae. *Gluma calycina* valvula exteriore acuta, interiore ovata obtusa, 7 nervia; utraque margine diaphano. *Glumae culmaceae* 8-16, valvula exteriore, superne latiore, 7 nervia, margine albo praedita, oblonga, infra apicem brevem obtusum bifidum, acuminatum, *arista*, recta, scabra, longitudine valvulae donata.

Flor. Flor. — *Therm.* Matur, Therm. — *Fruct.*

β. Apr. — β. Aug. — β. Jul. — β. Sept.

Habit. in agris, versuris, collibus, rupibus; tot. fere *Germ.* — *Gall.* in nostro Depart: prope Moguntiam inter segetes, quoque circa Bretzenheim, Zahlbach, Hechtsheim.

12. *Bromus mollis*. Droue vellue. Weiche Trespe. *

Bromus mollis panicula erectiuscula spiculis ovatis, pubescentibus, aristis rectis, foliis mollissime villosis. Linn. ed. Reich. 1. 209; ed. Gil. 1. 101. s.v.ed. Pers. 123. *secalinus*. Lamarck. 1181. 9. Lestib. 224. *secalinus* var. β. Goian. hort. 50. fl. 125. excl. syn. *panicula erecta coarctata*. Guett. obs. 1. p. 184. Boehm. lips. n. 642. *hirsutus*, locutis septifloris, ovato-conicis. Hall. helv. n. 1504.

1630

manus. Weigel. obs. p. 8. t. 1. f. 9. Hoffm.

54. *Bromus montanus* Scopoli 1. 82.

Festuca avenacea hirsuta paniculis minus sparsis. Dill.
giess. p. 71. Raj. hist. p. 1289. syn.
3. p. 413. 4. p. 55.

Gramen avenaceum locustis villosis angustis candican-
tibus et aristatis. Scheuchz. agr. p.
254. t. 5. f. 12. Tourn. 526. Bar-
rel. rar. 1228. ic. 83. f. 1. 85. f. 1.
locustis villosis, *crassioribus,*
Tourn. 526. Hall. goett. p. 48.
Vaill. par. p. 95.
villosum, *locustis amplioribus*
viridantibus, *margine argenteo*
ciuctis. Scheuchz. agr. p. 253.
pratense panicula squamata et vil-
losa. Mor. h. 3. p. 213. s. 8. t. 7.
f. 18.

Gramini murali Dalechampii simile, si non idem. J.
Bauh. h. 2. p. 438.?

Leyss. hal. n. 108. Pollich. 1. 110. ? Curt. Lond.
t. 15. Grimm. isen. emend. p. 120. Nekker gallob.
p. 65. Moench. fl. n. 84. Meth. 192. Willden. prodr.
n. 168. Fl. d. Wetter. 1. 128. Oestr. fl. 1. 63. Roth. 1. 47.
2. 135. Matuschk. 1. 66. Nonne. erf. p. 283. Plan. erf.
p. 58. Doerr. nass. p. 7. Leers. 36. t. 11. f. 1. Murr.
prodr. p. 42. Wibel. w. 107. Schrank. 1. 360. Schreb.
Graes. p. 60. t. 6. Reyg. ged. 50. n. 2. Scholl. barb.
n. 83. Reich. frc. 18. Hoffm. 54. Wigg. prim. p. 9.
Krock. 1. 161. Weig. obs. p. 7. t. 1. f. 4. Berg. frc. p. 324.
Dietr. 1. 110. Gmelin. tub. p. 27. Smith. in transact.
Lin. 4. 281. Delarbre. 38.

Radix biennis, saepe annua, fibrosa. Culmus
1 - 2 pedalis et altior, erectus, teres, pallide viri-
dis, glaber, superne autem subvillosus, striatus,

nodis 3 - 5 incrassatis, purpureis, villosis ad basin saepe ramulis sterilibus auctus. *Folia* mollissima ex albido-villosa, inferne nervosa, 2 - 3 lineas lata, 4 - 5 pollices longa, nervo dorsali albido praedita, nullo modo scabra, aut tantum marginibus scabriusculis. *Vaginae* villosores, striatae, ad maximam partem tubulosae. *Ligulae* breves semibifidae aut faciniatae. *Panicula* erecta, interdum subnutans, densiuscula, contracta, 2 - 4 pollices longa, molliissima, glauco-viridis. *Rhachis* subtomentosa, internodio inferiore tereti, superioribus semiteretibus. *Pedunculi* inaequales, ad summum pollicares, terni-seni et plures in semiverticillis alterius, semiverticaliter erecti, villosoi, plerumque simplices, interdum ramosi. *Spiculae* plerumque ovatae, in plurifloris ex ovato-lanceolatae, erectae, nonnullae fere sessiles, ex tereti-compressiusculae, acutiusculae, villosoe, glauco-virides albo-variegatae, subsplendidae, cum aristis 9 lineas longae, $1\frac{1}{2}$ lineam latae. *Gluma calycina valvulis* acuminatis, exteriore angustiore, ciliata; interiore latiore, ovata, 7 nervia, denticulata (dicta, quod quidem nunquam vidi, sed marginem semper integerimum diaphanum observavi, et saepe ciliatum, uti in exteriore). *Glumae corollaceae* 6 - 14 imbricatae, *valvula* exteriore ovata, margine sebro candido, infra apicem brevem, bifidum, acutum, *arista* 2 - 4 lineas longa, recta, scabra instructa. *Squamulae* ovatae, obtusae, *Antherae* fulvae. *Stigmata* alba.

Kar. *Nanus.* Culmo digitali, pedali, paucifloro, spiculis 2 - 3 - 4 alternis latioribus, brevioribus. — in solo sterili. (pr. Moguntiam.)

Flor. Flor. — Fruct. *Matur.* Therm. — Vend. β . Apr. — β . Sept. β . Jul.. — β . Oct.
Habit. in pratis siccis, arenosis, ad vias, in mu-

ris, ad sepes, in pomariis, t. sere *Gall.* et *Germ.*
prope Moguntiam, Zahlbach, Weissenau.

13. *Bromus inermis*. Droue inerme. Quek-
kentrespe. **

Bromus inermis panicula erecta, spiculis subtereti-
bus, subulatis, nudis, submuticis.
Linn. ed. Reich. I. 210. ed. Gil. 3.
102. s. v. ed. Pers. 123.

Festuca Leysseri. Hall. app. 2. ad Scheuchz. p. 47.
n. 28. helv. n. 1433. Moench. hass.
n. 82. speciosa panicula diffusa, spiculis teretibus
subulatis, muticis, aristatisque.
Schreb. spic. n. 59. Wigg. prim.
p. 8. Wibel. w. 106.

Gramen pratense elatius, locustis longis squamosis
non aristatis. Buxb. cent.
t. 40. n. 21. majus, locustis tumidis. ibid. t. 4.
n. 16. ?.

Roth. I. 48. 2. 136. Pollich. I. III. Fl. d. Wett. I.
129. Leyss. hal. n. 108. Jacq. vind. p. 18. Schrank. I.
367. Scholl. barb. n. 85. Dietr. I. 112. Plan. erf. p. 58.
Willd. pr. n. 169. Hoffm. 54. Schreber. Graes. 97. t. 13.
Oestr. fl. I. 64. Krock. I. 166.

Radix perennis, repens, geniculata, squamis
tecta, ad nodos fibrosa. *Culmi* laeves, inferne in-
curvi, erecti, 2-3 pedales, teretes, nodis 4-5 pur-
pureis, interdum viridibus instructi. *Folia* 5-12
pollices longa, 3-8 lineas lata, pendentia, scabri-
uscula, laete viridia, glabra; *inferiora* nonnunquam
undulata et hirsuta. *Vaginae* striatae, interdum
nervo dorsali eminenti praedita, laeves, glabrae,
inferiores raro hirsutae, maxima ex parte tubulosae.

Ligulae breves, obtusae. Panicula digitalis-pedalis, junior contractiuscula, basi angustata, adultior patentior, matura patens, erecta, aetate apice vix mutante. Rhachis teres, laevis, superne scabra. Pedunculi quini-octoni, teretiusculi, filiformes, simplices et ramosi, basi nodosi. Spiculae erectae, pulchrae, fere lineares, ex tereti compressae, 6 - 10 lineas longae, lineam latae, acutae, ex laete viridi, albo et roseo variegatae, glabrae, laeviter aut vix scabrae. Gluma calycina valvulis lanceolatis, fere aequalibus; inferiore carinata, acutiore; superiore trinervia, latiore. Glumae corollaceae 7 - 10, superiores abortientes, florentes distantes; valvula exteriore oblonga, obtusa, trinervia, et striis aut nervulis angustioribus cum majoribus tribus alternantibus notata, margine membranaceo albido, apice, certe in una panicula imo eademque in spicula, mox integro, mox bifido, mox ladero donata, et modo mutica, modo aristata, arista brevi, seabra, subulata, recta, ex nervo dorsali crassiusculo in utraque pagina elevato, orta, aut ex apice quidem, aut paulo infra apicem progrediente; valvula interiore aut manifeste bifida, aut (raro) integra, nervo viridi, marginali, ciliato. Squamulae ovatae, obtusae. Antherae longae, prismaticae, aurantiacae. Stigmata alba, ibidem, sordida, sanguinosa, rufa.

Flor. Praer. — Therm. Matur. Therm. — Vend. B. Maj. — B. Aug. — B. Jul. — B. Oct.

Habit. iu pratis, pomariis, dumetis, ad ripas fluviorum et rivulorum, t. f. Germ. in Gall. in nostr. Depart. circa Hartenburg, Dürckheim, Herxheim, Worms, Alzei, Werstadt, Bingen, Moguntiacum (in fossa primaria prope Münster- et Gauthor; ad rhenum inter salices; in Jungenfelder Aue; et prope Mombach.)

14. *Bromus versicolor*. Droue versicolore.
Veränderliche Trespe. **

Bromus versicolor, panicula patente spiculis angustis linearibus arista longiorib[us] feoerib[us]. Pollich. I. 109.
panicula patente, spiculis lanceolatis, coloratis, teretibus, laevibus, 7-9 floris, aristis sub-patulis longioribus, Moench. meth. 193.

(asper L. secundum. Roth. 2. 136. Reichl. in ed. Linn. I. p. 214. in ed. Gil. 3. 102. 9
(arvensis L. sec. Höffn. 55.)

Radix annua. *Culmi* pedales - 2 pedales, teretes, glabri, laeves, tenues, erecti aut curvati. *Folia* villosa, 2 - 3 lineata, 2 - 4 pollices longa, basi angustata, scabra. *Vaginae* albo-villosissimae ac molles, sere tubulosae, paululum fissae. *Ligulae* breves, crenulatae. *Panicula* pedalis, erecta. *Pedicelli* longi, semipedales, ramosissimi, seni-septeni. *Spiculae* 1 - 2 lineas latae, 5 - 6 lineas longae, juniores teretes, florentes, compressae, glabrae, ex viridi-albo, et purpureo variegatae, interdum uti in *arvensi* sere virides, et minus coloratae, non raro autem in una eademque panicula coloribus diversis donatae.

Glumarum corollacearum valvula exterior arista fusca aut albida 3 lineas longa, recta, praedita, 5 nervia, *interior* setis rigidiusculis ciliata.

Flor. Flôr. — Fruct.

β. Apr. — β. Sept.

Habit. ad vias, in agris, versuris, inter segetes.

Gall. in nostro Depart. circa Lautern, Oderbach; in via cava prope Nieder Ingelheim; circa Moguntiam in fossis siccis monumentorum; in ruinis templi Stae Crucis; in monte Hartenberg. *Germ.* in Hassia.

**15. Bromus racemosus. Droue à grappe.
Traubenartige Trespe. *****

Bromus racemosus, racemo simplicissimo, pedunculis unifloris, floribus sexfloris, laevibus, aristatis. Linn. ed. Reich. 1. 215. ed. Gil. 3. 105. s. v. ed. Pers. 124. Lamarck. 1181. 4. Dietr. 1. 113. Lestib. 224.

Festuca avenacea spicis strigosioribus e glumis glabris compactis. Raj. hist. 1909. syn. 267.

Gramen avenaceum spicis strigosioribus glabris. Tourn. 526.

Culmus 2-3 pedalis. **Folia** mollia, villosa, inferiore pagina nervosa, 3-4 lineas lata. **Vaginae** striatae, villosae. **Panicula** 8-10 pollices longa, patentiuscula, nutans, racemosa. **Pedunculi** plerumque simplices, tenues, plures, interdum vero solitarii et uniflori. **Spiculae** in pedunculis alternae, ovatae, acuminatae, ex laete viridi et albo variegatae, parvae, glabrae. **Glumae corollaceae** plerumque 6, valvula exteriore infra apicem brevem bisidum aristata.

Floret, aestate.

Habit. ad margines agrorum, in montosis et lapidosis Gall. meridion. —

**16. Bromus pratensis. Droue des prés.
Wiesentrespe. *****

Bromus pratensis, panicula erecto-patente, pedunculis subsimplicibus, spiculis ovato-lanceolatis compressis sub 8 floris, aristis rectiusculis glumae longitudine. Ehrh. gram. 116. Hoffm. 53. Wibel. w. 107.

Culmi teretes, superne scabriusculi, inferne laeves. Vaginae Foliaque subhirsuta. Ligulae ovatae obtusae, lacerae. Panicula erecto-patens. Pedunculi simplices aut subraniosi. Spiculae ovato-lanceolatae, compressae, glabrae, 4-8 florae. Gluma corollacea valvula exteriore ovata, obtusa, paululum infra apicem integrum arista capillari, subflexuosa, longitudine valvulae armata.

Flor. Mess. — Therm. — 6. Jun. — 8. Aug.

Habit. in pratis et agris. Germ.

633.

17. *Bromus erectus*. Droue droite. Grade
Trespe: **

Bromus erectus panicula erecta, pedunculis subsimplicibus, flosculis lanceolatis teretiusculis, foliis radicalibus angustissimis, ciliato-pilosis. Smith. in trans. Lin. 4. 281. Engl. bot. 471. Dicks. h. sicc. 14. 6. Hoffm. 55. angustifolius, panicula erecta, spiculis linearibus, 3-7 floris, aristis brevibus, foliis linearibus. Schrank. I. 366. Oestr. h. 1. 63.

hirsutus, angustifolius, locustis quinquefloris, aristis folliculo brevioribus. Hall. helv. n. 1507.

an? arvensis Lamarck. 1181. 13.

Festuca pratensis lanuginosa. C. Bauh. pr. 19. Vaill. p. 93. t. 18. f. 2.

Gramen bromoides pratense, foliis praeter Culmum angustissimis, rara lanugine villosis. Scheuchz. agr. 255.

Radix perennis, fibrosa. Culmus ad sesquipedem altus. Folia hirsuta, raro glabra, scabra, radicalia lineam dimidiam, culmea lineam unam aut ultra lata. Panicula contracta, stricta. Pedunculi soli-

solitarii, aut bini, interdum plures. *Spiculae* longissimae, unciales et longiores, 3-8 florae ex viridi albo purpureoque variegatae, aetate distichae. *Gluma calycina valvulis* acutis, angustis, albo marginatis. *Gluma corollacea* 6-10, *valvula* exteriore evata, acuta, hirsuta, infra apicem bifidum *arista* 2. lineas longa, *valvula* breviore, armata.

Flor. Praer. — *Mess.* β. Maj. — β. Jul.

Habit. in pratis, montanis. *Germ.* in Bavar. Carinth. Helvet. circa Basileam.

18. *Bromus pseudarvensis*. Fausse Droue des Champs. Falsche Akker-Trespe. ***

Bromus arvensis. Pollich. I. 113.

Radix perennis, fibrosa. *Culmus* 1-3 pedalis, basi curvatus, dein erectus, laevis, glaber, debilis, nodis 2-4 purpureis glabris, internodio supremo longitudine dimidia culmi, aut longiore instructus. *Vaginae* laeves, glaberrimae (certe inferiores), paullulum tantum in latere folii opposito fissae et ciliatae. pilis raris, albidis, deint tubulosae, nervosae, striatae. *Ligulae* loco margo parvus albidus. *Folia* plana, pauca, 1-2 lineas lata, semipedalia ac pedalia, siccata marginibus convolutis minime vero setacea, glabra, in margine et apice scabra. *Panicula* digitalis-palmaris, primo intuitu paniculae juniori *inermis* haud dissimilis, sed spiculis paucioribus instructa, plus minusve contracta, in et post anthesin nutans et secunda. *Rachis* scabra, ex tereti compressiuscula, angulis 2 oppositis argutiusculis, uno latere non raro subsulcato. *Pedunculi* plerumque 4, interdum 5-6-8, in semiverticillis alternis, semiverticaliter erecti, simplices et ramosi, scabri, teretes, filiformes, inaequales, apice incrassato. *Spiculae* quoque spiculis *inermis* quoad formam valde similes, oblongae nempe, fere lineares, compressiusculae, utrinque attenuatae, ex sor-

Q

dide griseo-virides aut subpurpurascentes, parum albo variegatae, cum aristis fere pollicares, aut pollicares, raro ultra pollicares, 1-1½ lineam latae. *Gluma calycina valvula inferior* tres lineas longa, carinata, lanceolata, versus apicem scabra; *superior* 4 lineas longa, latiore, acutiore, toto in dorso scabra, utraque albo marginata, per lentem strigosa et pubescens. *Glumae corollaceae* 5-6, raro 7-10; superiores abortientes, aetate divergentes, *valvula exterior* 3-fere 5 lineas longa, lanceolata, 5-nervia, nervis 3 crassioribus et 2 intermediis tenuioribus, dorso versus apicem scabro, margine membranaceo glabro, ex apice acuminato obtusiusculo vix bifido aristata, *arista* scabra, recta 2-3 lineas longa: *inferiore* nervis marginalibus scabris, apice acuminato, obtusiusculo. *Antherae longae rubrae*. *Stigmata* alba.

Flor. Praer. — *Therm.* Matur. Mess. — Fruct.

β. Maj. — β. Aug. — β. Jun. — β. Sept.

Plantam descriptam in locis a Pollich indicatis; circa Moguntiam nempe, Wormatiam et Crucenacum quoque circa Hochheim, ad margines agrorum, fossas, viasque inveni.

543. 19. *Bromus decumbens*. Droue inclinée
Liegende Trépse. *

Festuca decumbens, panicula erecta, spiculis subulatis muticis, calyce flosculis majore, culmo decumbente.

Linn. ed. Reich. I. 206. ed.

Gil. 3. 98. s. v. ed. Pers. 122.

Flor. sv. 92. 93. it. scan. 226.

locustis terefibus, muticis octifloris, flosculis alternis imperfectis. Hall.

helv. n. 1434.

Poa decumbens. Scop. I. 69. Wigg. prim. p. 8. Oestr. fl. I. 60.

Melica decumbens. Web. spic. p. 3. Moench. m. 173.
rigida. Wibel. w. 117.

Gramen avenaceum parvum, procumbens paniculis
 non aristatis. Tourn. 225.
 Mont. prodr. 53. t. 2. f. 1.
 Pluk. alm. 174. t. 34. f. 1. Raj.
 angl. 3. p. 408. hist. 1288. Rupp.
 jen. p. 317. Dill. giess. p. 71.
triticeum palustre humilius, spica mutica
 breviore. Moris. hist. 3. p.
 177. s. 8. t. 1. f. 6.

Schreber. spic. p. 58. Oeder. fl. dan. 162. Will-
 den. prodr. n. 164. Poll. 1. 105. Leers. 34. t. 7. f. 5.
 Roth. 1. 46. 2. 131. Hoffm. 53. Lamarck. 1180. 21.
Wilke gryph. n. 57. Krock. 1. 157. c. ic. Schurank.
 1. 355. Gmelin. tub. p. 26. Doerr. nass. p. 17.
Golian. fl. 470. Reyg. ged. 2. p. 43. Léyss. hal.
 n. 104. Fl. d. Wett. 1. 123. Weig. pom. n. 69.
Panz. 12. 404. Nekker gallob. p. 60. Lestib. 222.
Scholl. barb. n. 1025. Delarbre. 86.

Radix perennis, subrepens, fibrosa, densa.
Culmi palmatae — bipedales, basi subbulbosae, et
 saepe curvato-decumbentes, dein oblique adscendentia-
 tes, saepe autem stricte erecti, et post anthesin in-
 clinati, teretes, aut parum compressi, glabri, nodis
 3-4 purpurascensibus aut flavescensibus donati, su-
 perne parum nudi. *Folia* plana, rigidiuscula, sca-
 briuscula, nonnunquam tota laevia, erecta, mucro-
 nata, supra, imprimis ad basin, pilosa, interdum
 glaberrima, 3 pollices circiter longa, 1-1½ lineam
 lata, striata, glauco-viridia: *culmea* breviora, sum-
 mum saepe paniculam superans. *Vaginae* striatae,
 certeque superne villosae. *Ligula* villosa, margine
 prominula. *Panicula* aut aequalis, aut, rarius qui-
 dem, secunda, erecta, contracta, spiciformis, rigi-
 diuscula, pauciflora, plerumque simplex, 1-2 pol-

lices longai. *Pedunculi* solitarii, alterni, breves, plurimum simplices, inferiores non raro ramosi, longi, erecti, 2-3flori. *Spiculae* ovatae, ventricosae, obtusae, erectae, compressissimae, e viridi alboque aut flavicante, aut purpureo variegatae, splendentes, glabrae, lineas 3-4½ longae, 1-2 lineas latae. *Gluma calycina valvulis* inaequalibus, ovato-lanceolatis, carinatis, marginibus argenteis, mucrone obtuso terminatis, exterioro longitudine spiculae, aut ea vix longiore: interioro breviore, angustiore. *Glumae corollaceae* 4-6, raro 7-8, aut superiores aut (secundum Haller) alternae abortientes, basi pilosae, *valvula exteriora* quinquenervia, margine infra medium ciliato, apice obtuso, trifido (rudimentum aristae inter apicem bifidum), 3 lineas longa: interiora plana, apice bi- aut trifido. *Semen setis 2-3 obvallatum.*

Flor. Praer. — Therm. *Matur.* Therm. — Vend. 1. Maj. — 1. Aug. 1. Jul. — 1. Oct.

Habit. in pascuis, pratis, aggeribus, sylvis et ad margines earum: tot. fere *Gall.* et *Germ.* — in nostro Depart. circa Lautern.

20. *Bromus glomeratus*. Droue pelotonnée.
3. classiq. HIC. Knaultrespe.

Bromus glomeratus. Scopol. I. 76.

locustis tetranthis, fasciculatis, imbricatis.
Hall. helv. 1572.

Dactylis glomerata, panicula secunda glomerata. Linn.
ed. Reich. I. 197. ed. Gil. 3. 93.
s. veg. edit. Pers. 119. fl. suec. I. n. 87.

Lamarck. 1184. Willden. prodr. n. 160. Goitian.
hort. 47. flor. 119. Schreb. Graes. 72. t. 8. f. 2. Wigg.
prim. p. 8. Fl. dan. t. 743. Weig. pom. n. 65. Fl. der
Wetter. I. 115. Roth. I. 40. 2. 109. Leers. 22. t. 3.
f. 3. Nekker. gallob. p. 58. Lestib. 227. Scholl. barb.
n. 59. Matuschk. I. 59. Wilke. gryph. n. 53. Reich.

frc. 14. Gmel. tub. p. 24. Doerr. nass. p. 16. Plan-
erf. p. 56. Hoffm. 48. Murr. prodr. p. 42. Schrank.
1. 348. Jacq. vind. p. 13. Dietr. 1. 100. Leyss. hal. n.
84. Reyg. ged. 1. p. 44. Poll. 1. 96. Panz. lin. 12. 369.
Moench. hass. n. 62. meth. 181. Delarbre. 73. Oestr.
fl. 1. 54. Wibel. w. 110. Kröck. 1. 149.

Cynosurus panicula secunda glomerata. Fl. suec. 2.
n. 85. Sauv. app. 310. Boehm. lips.
n. 638. Berg. frc. p. 323.

Poa fasciculis confertis uno versu dispositis. Hort.
cliff. 28. Roy. lugdb. 62. Nonne. erf.
p. 281. Zinn. goett. p. 64.

Festuca paniculis partialibus secundis glomeratis.
Gmelin. sib. 1. p. 117.

Gramen asperum. J. Bauh. hist. 2. p. 467. Raj. hist.
n. 1287.

spicatum folio aspero. C. Bauh. pin. p. 3. prodr.
p. 9. theatr. 45. Moris.
hist. 3. p. 202. s. 8. t. 6.
f. 38. Magn. bot. 114.
Volk. norimb. p. 197.
Scheuchz. agr. p. 299. t.
6. f. 15. Buxb. hall. p.
148. Dill. giess. p. 87.
Hall. goett. p. 50.
spica grumosa longio-
re et breviore. Barr.
ic. 26. f. 12.

paniculatum spicis crassioribus et breviori-
bus. Tourn. 521. Mapp. 133.
Rupp. jen. 309.

loliaceum asperum paniculis contractis.
Mont. pr. 36.

arvense spica compacta divulsa. Loes.
pruss. 110. t. 23.

Radix perennis, fibrosa, albida. Culmus ere-

etus, scaber, teres, inferne squamosus, et saepe geniculatus, aut curvatus, atque compressus, superne nudus, 2-5 pedalis, nodis 4-6 olivaceis aut purpureis instructus. *Folia* utrinque scaberima, plana, mucronata, nervoso-striata, glabra, duriuscula, viridia, 5 pollices - 2 pedes longa, 3-5 lineas lata, nervo dorsali albido instructa. *Vaginae* compressiusculae, nervo dorsali carinante, scabiae, glabrae, raro pubescentes. *Ligulae* longae, obtusae, lacerae. *Panicula* secunda, manifeste ramosa, 2 pollices - pedem longa, junior plus minusve contracta, florens patens. *Rhachis* subflexuosa, internodiis longis, sensim minoribus, uno latere canaliculato, altero convexo, scabra, glabra, raro ad basin paullum pilosa. *Pedunculi* ramosi, solitarii, aut gemini, alterni, compressi, uno latere plano, glabri, basi nodosi, albidi, interdum subhirsuti, scabri. *Pedicelli* inaequales bislori. *Spiculae* pedicellatae, et subsessiles, glomerato-fasciculatae, obtusae, 3-4 lineas longae, 1 lineam latae, maturae distichae, compressae, ex viridi et albo, interdum ex violaceo variegatae, ovato-lanceolatae. *Gluma calycina* valvulis subcarinatis, pubescentibus aut ciliatis, mucronatis, compressis; *inferiore* valde angusto, minore; *superiore* trinervia, magnitudinis valvularum exteriorum corollacearum aut parum majore, margine membranaceo, dorso scabro, ciliato. *Glumae* corollaceae 4, raro 3 aut 5, valvula exteriore 2-3 lineas longa, compressa, subcarinata, dorso scabro-ciliato, marginibus vix membranaceis, ciliatis, obscure quinquenervia, ex apice membranaceo bifido, raro integro, aristam brevem, vix quadrantem lineae longam, rectam, scabram, producente: *interiore* complicata, margine vix nervoso, ciliato, apice acuto aut bifido instructa. *Squamulae* 2, lanceolato-acuminatae. *Antherae* purpureae, aetate pallidae. *Stigmata* alba.

Var. 1. Vivipara. 2. Aristis 2, altera dorsali. 3. 2, Aristis 2, altera dorsali.
Flor. Praer. — Therm. *Matur.* Therm. — Vend.
 β. Maj. — β. Aug. β. Jul. — β. Oct.
Habit. in pomariis, aggeribus, pratis, nemori-
 bus, ad saepes, vias, totius fere *Gall.* et *Germ.* —
 Circa Moguntiam, sicuti in toto Departamento ab-
 unde.

AD TAB. XXIV.

XXIII. Festuca. Fétuque. Schwingel
 (Gramen T.).

Venten. 2. 108. Linn. ed. Gil. 2. p. 24. Lam. t.
 46. Fl. dan. t. 848. Mœnch. m. 189.

Gluma calycina pluriflora, bivalvis; *valvulis* com-
 pressis, plus minusve subulatis, acuminatis, in-
 aequalibus, alternis, raro oppositis, muticis, non
 saepe aristatis: *inferiore* plerumque minore, rarius
 majore. *Glumae corollaceae* 2-20, bivalves; *valvu-*
lis oblongis, acuminatis, raro obtusis, inaequalibus;
exteriore majore, aut ex apice integro aristata, aut
 mucronata, raro mutica, margine interdum mem-
 branaceo. *Squamulae* 2, lanceolatae, rarius ovatae,
 aut truncatae, aut crenato-dentatae. *Filamenta* tria
 (raro unicum) capillaria, corolla breviora. *Antheræ*
 oblongæ. *Ovarium* turbinatum. *Styli* 2, breves,
 reflexi. *Stigmata* simplicia, plumosa. *Gluma co-*
rollacea semini adnata nec delicens. *Semen* uni-
 cum, tenui-oblongum, utrinque acutum, hinc sul-
 catum.

Panicula, interdum spiciformis. *Spiculae* plus
 minusve compressæ, aut *valvulis* *corollaceis* obtusis
 (*Bromoïdes*), aut acutis (*Festucoïdes*).

1. Festuca Myurus. Fêteque queue - de - rat.
Maeuseschwanz-Schwingel. **

Festuca myurus, pânicula spicata, calycibus minutissimis, muticis, floribus scabris, aristis longis. Linn. ed. Reich. I. 205. ed. Gil. 3. 98. s. veg. ed. Pers. 122.

foliis setaceis, pânicula erecta, locustis glabris longius aristatis. Hall. helv. n. 1443. Hofer. in act. helv. 2. p. 143.

pânicula spicata nutante, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris longius aristatis. Roy. lugdb. 68.

Gramen festaceum myurum elatius, spica heteromalla gracili. Schéuchz. agr. p. 293. t. 6. f. 11. Barrel. ic. 99. f. 2. minore spica heteromalla. Scheuchz. agr. p. 294. t. 6. f. 12.

murorum spica longissima. Vaill. par. 94. Raj. angl. 3. p. 414. Moris. hist. 3. p. 215. s. 8. t. 7. f. 43.

Lamarck. 1180. 21. Poll. I. 104. Wigg. prim. p. 8. Goiani. hort. 49. flor. 124. Roth. I. 45. 2. 128. Fl. d. Wett. I. 119. Reich. frc. 2. 168. Doerr. nass. p. 18. Leers. 33. t. 3. f. 5. Delarbre 86. Schreber. spic. p. 58. Lestib. 223. Gmel. tub. p. 26. Nekker. gallop. p. 61. Scholl. suppl. n. 1004. Hoffm. 50. Krock. I. 160. Wibel. w. 105.

Radix annua, fibrosa. Culmi digitales - 2 pedales, inferne nonnunquam ramosi, incurvo-decumbentes, dein plus minusve erecti, tenues, teretes, uno latere vero subsulcato-planiusculo (?) glabri, nodis 3 - 5 purpureis. Folia glabra, 3 - 5 pollices

longa, vix lineam lata, plana, aetate convoluto-setacea, striata, pallide aut ex glauco-viridia, apice et saepe versus basin marginibus scabriusculis: *radicula* pauca brevissima; *culmea* sensim longiora. *Vaginae* coloris foliorum, striatae, subangulatae, glabrae, *suprema* plerumque basin paniculae involvens, aut paulo remota. *Ligulae* breves, obtusae, saepe incisae. *Panicula* viridis, aetate rufa, 1 - 12 pollices longa, 4 - 6 lineas lata, secunda, et subunilatealis, nutans, ad maximam partem spiciformis. *Rhachis* sulcata. *Pedunculi* inferiores gemini, terni, culmo adpressi, ramosi; superiores solitarii, brevissimi, simplices. *Spiculae* erectiusculae, juniores teretes, lanceolato-oblongae, cum aristis 7 - 13 lineas longae, 1 - 1½ lineam latae; adultiores compresae, distichae, scaberrimae, glabrae aut strigoso-pubescentes et ciliatae. *Glumae calycina valvulis* acutissimis; *superiore* majore, 2 lineas longa, lanceolato-lineari, membranaceo-mucronata; *inferiore* ad summum 1 lineam longa, aut exigua, vix visibili, lanceolata. *Glumae corollaceae* 4 - 3, lineares, *valvula exteriore* lanceolata, hispidiuscula, striata, 3 lineas longa, diaphana, *arista* recta, demum flexuosa, scaberrima, 5 - 10 lineas longa instructa. *Filamenta* tria, non raro autem unicum. *Antherae* flavae. *Stigmata* alba.

Flor. Flor. — *Mess.* Matur. Fruct.

β. Apr. — β. Jul. β. Aug. — β. Sept.

Habit. ad vias, sepes, agros, in muris, rupibus, arenosis, pascuis, siccis, collibus steriliорibus, t. fere *Gall.* — in Depart. Montis Jovis, prope Lautern; inter Dürckheim et Manheim. — *Germ.* in Hols. Wetter. Herb. Wirtemb. Barb. Goett. Francon. Siles.

2. *Festuca ovina*. Fêteque ovine. Schaafer-schwingel.

Festuca ovina, panicula secunda, coarctata, aristata, culmo tetragono, nudiusculo, foliis setaceis. Linn. ed. Reich. 11202. ed. Gil. 3.96. s.v. ed. Pers. 121. Fl. s. veg. 95.91. foliis praeangustis, panicula stricta, locustis quinquefloris subhirsutis. Hall. helv. n. 1442.

Poa foliis setaceis, panicula ramosa, floribus petiolatis antrorsum spectantibus, glumis subulatis. Roy. lugdb. 62.

setaceis panicula secunda, glumis angustis aristatis. Boehm. lips. n. 634. Gmel. sib. I. p. 107. n. 42.

Bromus ovinus. Scopol. I. 77.

Gramen foliis junceis, setaceis brevibus, majus, radice nigra. C. Bauh. pin. 5. prodr. 34. Dill. p. 87. Scheuchz. agr. p. 279. Hall. goett. p. 44.

Gramen foliis brevibus majus, radice nigra, panicula delicatiore. Scheuchz. agr. p. 281.

minus. C. Bauh. pin. 2. minus vulgare panicula rigida. Rupp. jen. p. 312. cristatum paniculis nigris antibus. Loes. Pruss. 110. t. 24.

paniculatum sparteum alpinum, panicula angusta spadiceo-viridi, proliferum. Scheuchz. agr. p. 213. app. t. I. Raj. angl. 3. t. 22. f. I.

Lamarck. 1180. 18. Wigg. prim. p. 8. Roth. I. 44. 2. 124. Poll. I. 100. Gmel. tub. 25. Goüan. hort. 44.

fl. 124. Wilke gryph. n. 55. Fl. d. Wntter. I. 117.
 Leyss hal. n. 98. Matuschk. I. 61. Berg. frc. p. 326.
 Stillingl. misc. t. 8. Leers. 31. t. 8. f. 3. Plan. erf. p. 57.
 Moench. hass. n. 78. iii. 189. Willd. prodr. n. 161.
 Schranck. 312. Murr. prodr. p. 42. Reich. frc. 17.
 Doerr. mass. p. 17. Dietr. I. 103. Scholler. barb. n. 77.
 Weig. pom. p. 67. Panz. lin. 12. 393. Schreb. spic. p. 56.
 Hoffm. 51. Zinn. goett. p. 66. Lestib. 223. Delarbre.
 85. Krock. I. 156. Wibel. w. 103. Oestr. fl. I. 61.

Radix perennis, fibrosissima, nigrescens. *Culmi* sex pollices-pedem alti, glabri, scabriusculi, tenuis, fere filiformes, basi saepe incurvo-decumbentes, dein erecti, supra medium nudi, infra paniculam aut manifeste aut obscènre tetragoni, interdum fere perfecte teretes, tortique, interdum autem trigoni, inferne teretes, nodis 2-3 fuscis, raro unico, instructi. *Folia* setacea, 1-5 pollices longa, lineam dimidiata lata, aut angustiora, superiore latere sulcato, viridia, aut rubella, rigidiuscula, scabriuscula. *Vaginae* laeves, striatae, glabrae. *Ligulae* breves, saepe margine tantum visibles. *Panicula* secunda, sub-unilateralis, ante et post anthesin contracta, spiciformis, 2-3 lineas lata, florens patens et multo latior, semper erecta, lanceolata, 2-3 pollices longa. *Pendunculi* solitarii et bini, superiores breves uniflori, inferiores in florescentia saepe horizontales, pluriflori. *Spiculae* erectae, juniores teretes, acutae, adultiores compressae, distichae, aut virides, aut ex viridi-flavescentes, aut violaceae, pubescentes, lineam 1 $\frac{1}{2}$ - 2 $\frac{1}{2}$ longae, vix unam latae. *Gluma calycina* valvulis acutis; superiore lanceolato-mucronata, lineam 1-1 $\frac{1}{2}$ longa, interdum uti inferior exigua. *Glumae corollaceas* 3-7, valvula exteriore interdum ciliata, marginibus dorsoque scabra, arista vix ultra lineam dimidiata longa donata. *Squamulae* ovatae acutae. *Antherae* luteae. *Stigmata* alba.

Var. 1. vivipara.

2. glauca.

3. spiculis glabris.

4. Culmo foliisque laevibus.

Flor. Flor. — Mess. Matur. Mess. — Fruct.

β. Apr. — β. Jul. — β. Jun. — β. Sept.

Habit. in campis, collibus, apricis, pascuis, muris, rupibus, ad margines viarum et agrorum, praecipue in terra arenosa sicca et sterili. tot. fere *Gall.* et *Germ.* — in nostro Depart. fere ubique; prope Moguntiam in arenosis.

3. *Festuca rubra*. Fétuque rouge. Rother

Schwingel. *

Festuca rubra, panicula secunda, scabra, spiculis sexfloris aristatis, flosculo ultimo mutico, culmo semitereti. Linn. ed. Reich. I. 203. ed. Gil. 3. 96. s. v. ed. Pers. 121. fl. sv. 9c. 92.

montis celtici. Delarbre. 87. ?

ovina. var. Lamarck. 1180. 18. Lestib. 223. foliis perangustis, locustis quinquefloris, teretibus, aristatis, oris membranaceis. Hall. helv. n. 1440.

hirsutis latiusculis, locustis paniculatis, quinquefloris, glabris, aristatis. ibid. 1435.

Gramen alpinum pratense, panicula duriore, laxa, spadicea, locustis majoribus. Scheuchz. agr. p. 287. t. 6. f. 9.

pratense paniculatum elatius, spica laxa heteromalla. ibid. 289.

Poll. I. 102. Roth. I. 45. 2. 125. Wigg. prim. p. 8. Hoffm. 50. Goian. h. 49. fl. 124. Wilke gryph. n. 50. Fl. d. Vett. I. 118. Scholl. barb. n. 78. Gunn. norweg. n. 551. Plan. erf. p. 57. Schrank. I. 353. Moench. hass.

n. 81. meth. 189. Leyss. hal. n. 99. Wibel. w. 105.
Stillingfl. misc. t. 9. Weig. pom. n. 68. Dietr. t. 104.
Gmelin. tub. 25. Panz. 12. 395. Oestr. fl. 1. 61. Wiiden.
prodr. n. 162. Delarbre. 85. Krock. 1. 59.

Radix perennis, subrepens, fibrosa. *Culmi*
1 - 3 pedales, basi curvato-crecti, filiformes aut
crassiores, supra medium nudi, uno latere planius-
culi, inferne teretes et nodis **2 - 3** purpureis instructi.
Folia dura, rigidiuscula, **3 - 6** pollices longa, lineam
dimidiam - **2** lineas lata, scabra, laete aut ex glauco
vel rubello viridia, basi non raro fusca; *radicalia*
caespitosa, setacea, superiore latere subcompressa;
culmea plerumque **2**, latiora, plana, aetate autem
apice convoluto, inferiore pagina glabra, superiore
striata, villosa. *Vaginae* glabrae, laeves, striatae.
Ligulae breves, obtusae. *Panicula* subunilateralis,
secunda, **4 - 6** pollices longa, densiuscula. *Rhachis*
semiteres, scabra. *Pedunculi* scabri, inferiores ge-
mini, rarius solitarii, pluriflori, patentes; *superiores*
semiverticaliter erecti, uniflori. *Spiculae* lan-
ceolatae, compressiusculae, aut pubescentes, aut
glabrae, scabrae aut scabriusculae, ex viridi-sub-
violaceae, aetate uti culmi rufescentes, cum aristis
4 - 6 lineas longae, **1**-fere **2** lineas latae. *Gluma ca-*
lycina valvula majore lanceolato-mucronata, cir-
citer **2** lineas longa. *Glumae corollaceae* **5 - 8**, su-
periores saepe abortientes et vix aristatae, inferiores
valvula exteriore **2** lineas longa, et *aristis* lineam
1 - 1½ longis praeditae. *Squamulae* apice bidentato.
Antherae flavae. *Stigmata* alba.

Flor. Flor. — Mess. Matur. Mess. — Fructid.
β. Apr. — β. Jul. β. Jun. — β. Sept.

Habit. in collibus, montosis, muris, pascuis,
versuris, pomariis, aggeribus, ad vias, t. f. Germ.
et Gall. — in nostro Depart. fere ubique:

4. *Festuca duriuscula*. Fétuque durète.
Harter Schwingel.

Festuca duriuscula, panicula secunda oblonga, spiculis oblongis laevibus, foliis setaceis. Linn. ed. Reich. 1. 204. ed. Gil. 3. 97. s. veg. ed. Pers. 121.

foliis perangustis, panicula stricta, locustis distichis, aristatis, glabris, septifloris. Hall. helv. n. 1437.

panicula nutante, inferne ramosa, spicis adscendentibus hispidis, foliis setaceis. Roy. lugdb. 68.

Gramen pratense panicula duriore laxa, uuam partem spectante. Raj. hist. 1286. angl. 3. p. 413. t. 19. f. 1. Scheuchz. agr. 285. Buxb. hal. p. 143. Rupp. jen. p. 313. Hall. goett. p. 44. foliis junceis brevibus, minus. C. Bauh. pin. 5. theatr. 73. Scheuchz. agr. 282. Buxb. hal. p. 145. ?

tenue duriusculum et pene junceum. J. Bauh. hist. 2. p. 443. (quoad descript.)

Flor. dan. t. 848. Lamarck. 1180. 19. Scholl. barb. n. 79. Poll. I. 101. Wilke gryph. n. 84. Hoffm. 50. Murr. prodr. p. 42. Reyg. ged. 2. p. 43. Roth. I. 45. 2. 126. Fl. d. Wett. I. 119. Schreb. spic. p. 57. Leers. 32. t. 8. f. 2. Zinn. goett. p. 66. Schrank. I. 353. Gmelin. tub. p. 25. Nekker. p. 61. Wigg. prim. n. 8. Reich. frc. 17. Leyss. hal. n. 101. Dietr. I. 104. Doebr. nass. p. 17. Lestib. I. 104. Willd. prodr. n. 163. Moench. nass. n. 80. meth. 189. Jacq. vind. p. 17. Panz. 12. 397. Delarbre. 85. Krock. I. 157. Oestr. fl. I. 61.

Radix perennis, fibrosissima, nigrescens.
Culmi 3 pedes fere alti, scabriusculi, aut laeves,

nitidi, erecti, ex glauco- aut rubello-virides, superne nudi, aut perfecte teretes, aut obscure tetragoni, striati, glabri, rigidiusculi, tenues, nodis prope basin 2-3 purpureis. *Folia* rigidiuscula, dura, curvata, setacea, subtrigona, superiore latere sulcata nec dehiscentia, pallide aut ex glauco-viridia, pubescentia: *radicalia* caespitosa, 1-9 pollices longa; *culmea* 2-3, breviora, laevia. *Vaginae* striatae, longae, laeves, glabrae. *Ligulae* breves, fuscae. *Panicula* 1-6 pollices longa, lanceolata, subunilateralis, secunda, *junior* contracta, angusta, subspiciformis, *florens* paululum latior, patentior, subnudans, duriuscula. *Rhachis* angulata, laevis, plerumque flexuosa. *Pedunculi* inferiores solitarii aut gemini, firmi: superiores breves, semiverticaliter erecti. *Spiculae* ovatae, acutae, glabrae, aut pubescentes, florentes compressae, distichae, suberectae, pallide virides aut violaceae, cum aristis 2-4 lineas longae, 1 lineam latae. *Gluma calycina* valvulis dorso scabris, exteriore majore, 1½-2 lineas longa, lanceolata, mucronata. *Glumae corollaceae* 3-7, superiores non raro abortientes; *valvula* exteriore ad apicem scabra, longitudine valvulae calycinae majoris, *arista* tres quadrantes lineae — lineam unam longa, instructa. *Antherae* violaceae, aetate flavae. *Stigmata* alba.

Flor. Flor. — Mess. Matur. Mess. — Fruct. β. Apr. — β. Jul. — β. Jun. — β. Sept.

Habit. in siccis, arenosis, sterilibus, collibus, montosis, apricis, muriis, pratis, dumetis. Tot. fere *Gall.* et *German.* — in Depart. montis Jovis circa Lautern, Franckenstein, Hochspeier: prope Moguntiam in arenosis, inter paludem et Mombach: ad sylvam inter Gonzenheim et Budenheim; in declivitate loricae extimae munimentorum; in monte Harteberg. etc.

5. *Festuca amethystina*. Fétuque violette.
Veilchenblauer Schwingel. *

Festuca amethystina, panicula flexuosa, spiculis secundis inclinatis, submuticis, foliis setaceis. Linn. ed. Reich. I. 204. ed. Gil. 3. 97. s. veg. ed. Pers. 121.

capillata. Lamarck. 1180. 6. Lestib. 222.

(ovina) n. 1442. var. Hall. montis aurei. Delarbre. 86?

Gramen montanum foliis capillaceis, longioribus, panicula heteromalla spadicea et veluti amethystina. p. 276. t. 6. f. 7.

capillatum, locustis pennatis non aristatis. Vaill. par. 92. Scheuchz. agr. p. 275.

Leyfs. hal. n. 100. Roth. I. 45. 2. 126. Roy. lugdb. 68. Delarbre. 86.

Radix perennis, fibrosa. *Culmi* 1-3 pedes alti, filiformes, supra medium nudi, interdum ex rubro-violacei. *Folia radicalia* caespitosa, setacea, 6-9 pollices longa. *Panicula* 2-3 pollices longa, pauciflora, subunilateralis et secunda. *Pedunculi* spiculis longiores. *Spiculae* parvae, distichae, pallide virides, aut flavescentes, interdum violacei. *Glumae corollaceae* 5-6, valvula exteriore mucronata.

Floret, matur. et habit. cum priore.

6. *Festuca dumetorum*. Fétuque des buissons. Heckenschwingel. ***

Festuca dumetorum panicula spiciformi pubescenti, foliis filiformibus. Linn. ed. Reich. I. 205. ed. Gil. 3. 97. s. v. ed. Pers. 121.

Flor.

Flor. dan. 700. Roth. I. 45. 2. 127. Hoffm. 50.
(sub multifl.) Dietrich I. 104. Leyss. hal. n. 103.
Moris. hist. 3. s. 8. t. 2. f. ult.? Delarb. 85.

*Radix perennis, fibrosa. Culmi 1 - 1 $\frac{1}{2}$ pedales,
filiformes teretes, nodis 2 tumidis. Folia radicalia
pedalia, filiformia, vix ancipitia; culmea breviora
canaliculata. Bulbi saepe intra Vaginas culmi pro-
gnascuntur. Panicula parva subunilateralis secunda,
fere spiciformis. Spiculae 10 - 12, pubescentes, ca-
nescentes, inferiores geminae pedicellatae, superio-
res sessiles solitariae. Glumae corollaceae 6 - 7, val-
vula exteriore subaristata.*

Habit. in pascuis, montosis German. prope Hal.
sax.? — Gall. in Dep. du Puy du Dome, du Can-
tal, de l'Allier.

7. Festuca heterophylla. Fétuque hétérophile. Ungleichblättriger Schwingel. ***

Festuca heterophylla. Lamarck, 1180. 17. Jacq. coll.
2. p. 95. Oestr. fl. I. 61.

nemorum, panicula secunda nutante, spicu-
lis quinquefloris, glabris, aristatis,
foliis radicalibus setaceis,
culmeis planis, longissimis, sca-
briusculis. Leyss. hal. n. 102.
Abh. d. H. N. F. G. T. I. p. 368.
Roth. I. 46. 2. 129. Hoffm. 52.
Oestr. fl. I. 61

Gramen avenaceum minus, foliis inferioribus capil-
laceis, superioribus vero latiori-
bus. Tourn. 525.

*Radix perennis, caespitosa, nigricans. Culmi
2 - 4 pedales et altiores, striati, laeves, glabri, tenues,
laete virides, nodis 3 - 4 fuscis. Folia inaequalia, laete
viridia: radicalia caespitosa, numerosa, capillaria,
superiore latere canaliculata, vix marginibus sca-*

R

briuscula, pédalia et bipédalia: *culmea* plana, lineam dimidiā — fere unam lata, 10 pollices — sesqui-pedem longa, margine scabriuscule; supra villosa, sicca marginibus interdum complicatis nec setaceis. *Vaginae* laeves, glabrae. *Ligulae* breves obtusae. *Panicula* 3-8 pollices longa, secunda, laxa, pauci-flora. *Pellunculi* inferiores gemini, sive terni, inaequales hispidae. *Spiculae* pallide virides, longe pedicellatae, parvae. *Gluma* *calycina* *valvulis* acuminatis, gracilibus, versus apicem scabriuscule, *majoře* trinervia, *minore* uninervia, nervo viridi. *Glumae corollaceae* 3-5 raro plures; calycina paulo maiores, *valvula* exteriorē dorso scabriuscule, in aristā lineam unā attē paulo magis longam scabriuscule, terminata: *interiore* tererrima, integerim, margine nervoso viridiuscule.

Flor. Praer. — *Therm.* — β . Maj. — β . Aug.

Habit. in nemorosis, sylvaticis. *Gall.* — et *Germ.* in sylva Rhēnogāviae Niederwald haud procul arceū.

8. Festuca sciuroides, Fétuque queue d'ecureuil. Eichhornschwanz-Schwingel. ***

Festuca sciuroides, panicula secunda racemosa, caly-cibus abbreviatis, floribus dia-phaniis scabris, aristis longis. Roth. t. 46. 2. 130. Bot. Abh. u. Beob. p. 43. Hoffm. 49. Wibel. w. 104.

bromoides. Ehrh. gram. 6. Plan. erfard. p. 57. Wigg. prim. p. 8.

Gramen bromoides, pumilum paucifolium, longius aristatum. Scheuchz. agr. p. 291. panicula heteromalla, longioribus aristis donata. Scheuchz. agr. p. 290. t. 6. f. 10.

Radix biennis, fibrosa, Culmi palmares et altiores, versus basin ramosi, erecti, filiformes, glabri, maxima ex parte nudi, nodis 3-4 exiguis purpureis, quorum supremus infra medium culmi. Folia plana lanceolato-linearia, acuminata, striata, laete viridia, vaginis breviora, saepe emarcida, et siccata convoluto-filiformia. Vaginae striatae. Ligulae minimae fuscae et visibles. Panicula erecta, secunda, contracta, laete viridis, matura purpurascens, subnudans, longitudine fere dīgiti minimi. Pēdunculi compressi, canaliculati, incrassati, spiculis breviores, semper solitarii, plerumque simplicissimi, inferior interdum pluriflorus. Spiculae contractae, teretes maturae et siccatae patentes. Gluma calycina valvulis oppositis, concavis, lanceolato-linearibus, breviter aristatis, altera duplo majore, striata. Gluma corollaceae 5-6 conniventes, diaphanae, valvula exteriore dorso scabriuscula, nec hispida, nec pubescente, sed glabra costata, calycina majore, arista longiore, scabra terminata: interiore lanceolata, membranacea, nervo marginali, viridi, scabro donata. Filamentum constanter unicum. Anthera nigricans.

Flor. Praer. — Mess.

β. Maj. — 6 Jul.

Habit. ad margines agrorum, inque pascuis sterilioribus: Germ. Brem. Oldenb. Hannover. Saxon. Hols. Thur.

9. *Festuca bromoides*. Fétueque bromoïde.

Trespeartiger-Schwingel. **

Festuca bromoides, panicula secunda spiculis erectis, calycibus valvula altera integra, altera acuminata. Linn.ed.Reich. I. 202. ed. Gil. 3. 95. s.v.ed.Pers. 121. Mant. 325. Lamarck. 1180.

22. Goian. h. 49. fl. 124. Lestib.

223. Delarbre. 85. Oestr. fl. 1. 61.
spicis erectis ad unum latus, palea altera ca-
lycina minima, altera acumina-
ta. Roy. lugdb. 68.

Grauen paniculatum bromoides, minus, paniculis
aristatis, unam partem spectanti-
bus. Tourn. 524. Scheuchz. agr.
p. 297. t. 61 f. 14. Raj. angl. 3. p.
415. linst. 1287. Pluk. alm. 174.
t. 33. f. 10.

Myuro, minime autem ovina, similis.

Radix annua fibrosa. *Culmi* erecti, graciles,
articulati, foliati, ad summum sesquipedales. *Folia*
plana, glabra, glauca, 1½ - 2 lineas lata, marginibus
laevibus. *Panicula* secunda subspicata, inferne
lata, superne densior, 2 - 5 pollices longa, unila-
teralis. *Spiculae* erectae, viridiuseculae. *Gluma* ca-
lyrina valvulis valde inaequalibus, minore angutis-
sima fere setacea, majore acuminate. *Glumae corol-
laceae* 5 - 6, valvula exteriore glabra, arista 5 - 3
lineas longa instructa.

Habitat in arenosis, aridis Galliae meridiona-
lis. — *Germ.* Austr.

F. *Myurus*, *sciuroides* et *bromoides* verisimili-
ter varietates unius speciei sunt.

10. *Festuca pinnata*. Fétueque pinnée. Ge-
fiederter Schwingel. *

Festuca pinnata. Moench. meth. 191. Fl. d. W. 1. 125.
culmo alternatim spicato, spicis teretibus.
Sauv. 38. n. 89.

Bromus pinnatus, culmo indiviso, spiculis alternis
subsessilibus teretibus, subula-
tis, subaristatis. Linn.ed.Reich.

1. 216. ed. Gil. 3. 106. s. veg. Pers.
124. Reich. fr. 19.

Roth. 1. 49. 2. 144. Reyg. gedan. 2. p. 42. Boehm.
Lips. n. 639. Hoffm. 56. Willden. prodr. n. 175. Weig.
obs. bot. p. 14. t. 1. f. 10. Krock. 1. 177. Gmelin. tub.
p. 28. Poll. 1. 117. Doerr. mass. p. 9. Smith. in trans.
lin. 4. Scholl. barb. n. 89. Goian. hort. 51. f. 125.
Grimm. isen. p. 266. Leyss. hal. n. 115. Dietr. 1. 111.
Jacq. vind. p. 18. Leers. 391 t. 8. f. 3. Plan. erf. p. 59.
Scop. 1. 82. Schrank. 1. 368. Oestr. fl. 1. 64. Murr.
prodr. p. 42. Delarbre. 18. Bronnus corniculatus. Lamarck. 1181. 16. Lestib. 225.

fragilis. Schrank. 1. 370.

Triticum pinnatum. Moench. hass. n. 102. 3
bromoides. Wiggers prim. p. 11. Wibel.

culmo indiviso spiculis alternis subsessili-
bus. Zinn. goett. 67.
spicis distichis, loculis teretibus, hirsu-
tis, aristatis, duodecimfloris.
Hall. helv. n. 1431.

Poa culmo alternatim spicato, spicis teretibus hir-
sutis. Gmelin. sib. 1. p. 112.

Gramen sparteum, spicata Brizae panicula, corni-
culatum. Barrel. ic. 25.

spica Brizae majus. C. Bauh. pin. 9. prodr.
p. 19. theatr. 133. J. Bauh. hist.
2. p. 477. Petiv. gram. t. 3. f. 1.
Magn. bot. 121. hort. 92.

Loliaceum altissimum, spica Brizae prae-
longa, aristis brevibus donata.
Tourn. 517. Mapp. 330. Mont.
42. t. 16. Rupp. jen. p. 305. Hall.
goett. p. 43.
corniculatum. Scheuchz. agr. p.
35. t. 1. f. 7.

Radix perennis articulata, squamata, fibrosa. *Culmus* indivisus, erectus, seminudus, 2-4 pedalis, superne laevis, teres, glaber, nodis 3-4 subvillosis, purpurascens. *Folia* 3-6 pollices longa, 2-4 lineas lata, plana, lacte aut glauco-viridia, scabra, nervo albido dorsali. *Vaginae* striatae, molles, villosae. *Ligulae* breves, obtusae. *Rhachis* subflexuosa, uno latere excavata, laevis aut parum scabra, denticulis remotis. *Panicula* spiciformis disticha, 3-5 pollices longa, contracta 2 lineas, florens et patens autem 6-16 lineas lata. *Spiculae* 8-10, solitariae, alternae, approximatae, florentes horizontaliter patentes, absque aristis 10-14 lineas longae, 1-1½ lineam latae, pallide virides, lanceolatae, rigidiusculae, pubescentes, rectae aut curvatae, teretes, latere interiore rhachim spectante plano; inferiores brevissime pedunculae raro sessiles, superiores sessiles, terminalis semper erecta. *Gluma calycina* valvulis inaequalibus, striatis, acuminatis, majore sere 4 lineas lata. *Glumae corollaceae* 9-18, imbricatae, maturitate subdistichae, *valvula* exterior lanceolata, septinervia, obtusiuscula, 4 lineas absque arista longa, margine ciliato, dorso pubescente, in aristam, 2 lineas longam aut breviorem, hispidulam, flexuosa aut rectam, continuata: interior truncata, margine nervoso, scabriusculo. *Antherae* flavae. *Stigmata* alba. *Squamulae* 2 superne latiores, oblique truncatae, multisidae.

Var. 1. Spiculis muticis.

2. *Panicula* spiculis perfecte distiche positis, *a)* foliis glaberrimis. — (circa Kostheim in territorio elect. Mogunt.) *b)* foliis supra pubescens et ciliatis (in monte Ruchusberg prope Bingen).
3. *Panicula* quidem disticha, inferne

autem ex diversis lateribus quam
superne, rhachi hand torta, foliis
ciliatis et supra pubescentibus (in
fossa primaria inter portam Müin-
ster- et Gauthor).

Flor. Praer. — *Therm.* *Matur.* Therm. — *Vend.*
β. Maj. — *β. Aug.* *β. Jul.* — *β. Oct.*

Habit. in sylvis, montosis asperis, apricis, ru-
deratis, muris, sepibus, vineis, campis, ad margi-
nes agrorum, tot. fere *Gall.* et *Germ.* — in nostro
Depart. circa Lautern, Steinbach, Dürckheim, Mo-
guntiam, Hechtsheim, Mariaborn.

11. *Festuca gracilis.* Fétuque mince. Schlan-
ker Schwingel. 1664

Festuca gracilis. Moench. m. 191. Fl. d. Wett. I. 124.

Bromus gracilis, racemo simplicissimo nūtante, spi-
culis alternis sessilibus, remotis,
teretibus, subulatis, glabris, aristatis. Leyss. hal. n. 116. Hall. abh.
I. 370. Willden. pr. 174. Roth. I.
p. 49. 2. 145. Weigel. obs. bot. p. 15.
t. I. f. II. Schrank. I. 369. Oestr.
fl. I. 63.

pinnatus. var. Linn. ed. Reich. et Gil. l. c.
sylvaticus. Hoffm. 56.

Triticum culmo indiviso etc. var. vid. Zinn. l. c.
Gramen loliaceum corniculatum latifolium, spicis
teretibus, angustis et glabris.
Schenkz. agr. p. 36.
corniculatum spicis glabris.
Tourn. 516. Mapp 129. Rupp.
jen. p. 305.

Radix perennis, caespitosa, fibrosa. *Culmus*
2 - 3 pedalis, indivisus, filiformis, laevis, nodis
villoso, versus apicem pergracilis, debilis, et non

raro incurvus. *Folia plana*, glauco-viridia, supra scabra, basi pilosa. *Vaginae striatae*, pilosae. *Ligula obtusa*, fissa. *Panicula nutans*, saepe pendula, spiciformis disticha. *Spiculae 8-10*, striatae, inferiores breviter pedunculatae, interdum omnes sessiles, rhachi adpressae, alternae, remotae, teretes, angustae, ex linearis subulatae, inferior nonnunquam *vagina summi folii tecta*. *Gluma calycina valvulis acuminatis*. *Glumae corollaceae 4-16*, imbricatae, *valvula exteriore lanceolata*, glabra, apice in *aristam capillarem*, rectam, duplo fere longiorem desinente: *interiore brevi*, truncata.

Flor. Praer. — *Therm.*

2. Jul. — 6. Oct.

Habit. in sylvis montosis Germ. Saxon. Bavar. Wetter. Hass. Brandenb.

12. Festuca sylvatica. Fétueque des bois.

Waldschwingel. **

Festuca sylvatica. Hudson angl. p. 38.

dumetorum. C. Bauh. p. 10. pr. 19. J. Bauh. hist. 2. p. 545.

Bromus sylvaticus spiculis sessilibus culmo indiviso, aristis folliculi glumas longitudine aequantibus. Poll. I. 118. Hoffm. 56. Dietr. I. 113. Lamarck. 1181. 17. Lestib. 225. Krock. I. 179.

pinnatus. Oeder. t. 164.

pauper. Schrank. I. 370.

gracilis. var. Fl. d. Wett. I. 124. Moench. meth. 191. Schranck. I. 369.

Triticum sylvaticum. Moench. hass. n. 103.

locustis remotis hirsutis teretibus exquis, culmis floriferis gracilibus. Hall. helv. n. 1332.

teretiflorum, Wibel. w. 104.

Gramen sylvaticum hirsuta spica nutante. Dill. giess.

p. 163. app. p. 62.

loliaceum corniculatum, spica partiali sub-hirsuta, fragili. Scheuchz. agr. P. 38.

corniculatum spicis villosis. Tourn. 316. Mapp. 129.

Radix perennis, repens, fibrosa. *Culmus* 2 - 3 *pedalis*, *villosus*, *tenuis*, *debilis*, *superne non foliatus*. *Folia* 7 - 12 pollices longa, 2 - 5 lineas lata, utrinque *villosa*, *mollia*, *glaucoviridia*. *Panicula* *spiciformis*, *disticha*, *subnudans*. *Vaginae* *striatae* *vilosae*. *Spiculae* *alternae*, *vilosae*, *striatae*, *sabrate*, *virides*, 8 - 12 lineas longae. *Gluma calycina* *valvula* *majore arista*, *lineam longa*, *instructa*, *Glumae corollaceae* 8 - 10, *valvula* *exteriori absque aristam* fere 5 lineas longa, *ex apice aristam* 5 - 6 lineas longam producente.

Flor. Praer. — *Therm.*

8. Maj. — 2. Aug.

Habit. in sylvis montosis, ruderatis, dumetis.

Germ. Wetter. Hass. Bavar. Brem. *Gall.* — in nostro Depart. circa Lautern, prope turrim Oderbacen-sēm.

13. *Festuca distachya*. Fétueque ciliée. Zwei-ähriger Schwingel. ***

Festuca ciliata. Goian. Hort. 48. 547. fl. 124.

diandra. Moench. meth. 191.

gracilis paucis utriculis. Barr. ic. 83. n. 2.

Bromus distachyos, spīcis duabus erectis, alternis. Linn. ed. Reich. 1. 217. ed. Gil.

3. 107. Torner. in Amoen. acad.

4. p. 304. 450. s. veg. ed. Pers. 124.

Goian. fl. 124. Delarbre. 39.

ciliatus. Lamarck. 1181. 18.

spiculis subbinatis compressis sessilibus,
Ger. prov. 98. t. 3. f. 1.

villosus. var. Scopol. I. 83 (?)

Gramen spica brizae minus. C. Bauh. jun. p. 9.
prodri. p. 19. Pluk. alm. 173.
t. 33, f. 1., Magn. bot. 121.

festuceum myurum elatius, spica heteromalla gracili. Barr. ic. 99. f. 2.
Scheuchz. agr. 293. ?

loliaceum minus, spica brizae perlonga, aristis donata. Tourn. 517.

Radix annua, fibrosa. *Culmus* 6 pollices-pedem altus, foliatus, inferne nonnunquam ramosus, erectus, paululum geniculatus, nodis pubescentibus. *Folia* 1-2 lineas lata, pilis rigidis ciliata, interdum pagina superiore itidem pilosa. *Panicula* spiciformis, disticha, stricta, simplex. *Spiculae* 2-5, magnae, rigidae, durae, ex viridi-albidae, glabrae, juniores teretes, adultiores compressae, plano Rhacheos obversae, sessiles. *Gluma calycina valvulis acutis.* *Glumae corollaceae* 7-20, valvula exteriore (secundum Lamarck) ciliata, ex apice *aristam* longissimam producente: *interiore* obtusa, ciliata. *Filamenta* (secundum Moench.) duo.

Habit. ad margines agrorum et viarum *Galliae* meridionalis.

An *Bromus distachyos Germanorum* diversa species. ? Sequente modo descripta est:

14. *Festuca (pseudodistachya)*. Fetique pseudodistache. Falscher zweiähriger Schwingel. **

Bromus distachyos. Gmelin. tub. p. 29. Roth. I. 50.
2. 146, Schrank. I. 371. Oestr.
fl. I. 64.

spica terminali erecta, pauciflora, spiculis compressis ellipticis, seminibus di-

stinctis, aristis subaequalibus. Wigg.
obs. bot. p. 16. t. 1. f. 8.

Gramen spica brizae minus. Rupp. jen. p. 306.

Radix annua, fibrosa. Culmus semipedalis —
pedalis, rigidiusculus, superne nudus, incrassatus,
scaberque, erectus, geniculis incurvis. Folia pla-
na, retrorsum scabra, pubescentia. Vaginae sca-
brae. Ligulae brevissimae, truncatae, incisae. Pa-
nicula spiciformis, disticha, simplex. Spiculae ple-
rumque 2, raro solitaria aut 3, vix semiunciam distan-
tes, sessiles, commissurae culmi obversae, scabrae, ju-
niores ex tereti compressiusculae, lineares, adultiores
compressae ellipticae. Gluma calycina valvulis rigi-
dis acutis, strictis. Glumae corollaceae 8 - 12, imbrica-
tae, aetate distichae, remotiusculae, dorso scabrae, val-
vula exteriore lanceolata, aristam scabram, aequalem
aut paulo longiore, capillarem rectam producente:
interiore obtusa, linearis, ciliata, exteriore paulo majore.

Habit. in Bavar. Wirtemb. Pom. Austr.

15. Festuca multiflora. Fetuque multiflore.

Vielblütiger Schwingel. **

Festuca multiflora, foliis hirsutis latiusculis, spicu-
 lis paniculatis 5 - 10 floris, aristatis, glabris. Hoffm. 524 pl. 1
pratensis, foliis hirsutis, latiusculis, spiculis paniculatis, 5 floris, aristatis, glabris. Schreb. spic. p. 67.

Planta Bromo pseudarvensi quoad habitum valde
similis, differt autem: Foliis quidem planis et siccis
complicatis, superiore vero pagina villosis. Vaginis
praecipue inferioribus villosis et ciliatis, superio-
ribus non raro glabris. Ligula truncata brevissima.
Spiculis pollicaribus et ultrapollicaribus uti in
pseudarvensi, sed glabris. Valvulis exterioribus
corollaceis omnibus ex apice aristatis, aristu brevi.

Flor. Praer. — *Fruct.*

β. Maj. — β. Sept.

Habit. in pratis, ad margines agrorum, viarum fossarumque *Gall.* et *Germ.* — In Depart. Montis Jovis, inter Findheim et Gönzenheim, Niederolm, Niedersaulheim et Werstadt, in monte Rochusberg prope Bingen.

Bromus arvensis L. pseudarvensis L. et Festuca multiflora forsitan nil aliud quam varietas unius speciei sunt.

16. *Festuca tenuifolia*. Fétuque à feuilles étroites. *Sahmalblättriger Schwingel.* **

Festuca tenuifolia, panicula subsecunda, coarctata, mutica, culmo tetragono nudiusculo foliis capillaribus Hoffm. 51. Sibth. oxon. p. 44. Leers. t. 8, f. 4.

Differt ab ovina:

*Panicula magis coarctata, angustiore. Gluma-
rum corollacearum valvulis exterioribus mucronatis
nec aristatis. Antheris violaceis. Foliis capillaribus
angustioribus.*

Flor. et Habit. cum ovina.

AD TAB. XXV.

XXIV. *Ventenata. Ventenate. Ventenata.* (Bromus et Avena L.)

In memoriam celeberrimi Botanici parisiensis.

Differt a Festuca, Bromo et Avena:

*Valvula exteriora gluniae corollaceae inferioris
sessilis immediate ex apice aristam emittente, alterius
pedicellatae, apice minore acutissimo bifido*

praedita e dorso *aristata*; *tertiae* et si adest *quartas* apice acutissimo bifido donatae; basi aut dorso *arista* instructa. *Valvula* interiore exteriore duplo fere minore.

Spiculae teretes lanceolatae paniculatae.

1. *Ventenata bromoides*. Ventenate bromoïde. Trespenartige Ventenate. ***

Bromius triflorus, panicula patente floribus subtriangularibus. Linn. ed. Reich. I. 215. ed. Gil. 3. 106. s. veg. ed. Pers. 124. Poll. I. 119. Roth. I. 49. 2. 143. Dietr. I. 112. Reyg. ged. 2. p. 41. Oeder. dan t. 44C? Schrank. I. 365? Moench. hass. n. 89? Krock. I. 178?

Gramen bromoides, panicula sparsa, locustis minoribus aristatis. Scheuchz. agr. p. 511. t. 5. f. 19.

Radix perennis fibrosa. *Culni* caespitosi, erecti, basi incurvi et saepè ramosi, digitales - semipedales, glabri, teretes aut uno latere sulcati, nodis purpureis, 2-4 pollices longa; 1-1½ lineam lata, glauco-viridia, siccata convoluta, striata, supra scabra, subitus glabra, rigida, duriuscula, nervo albido dorsali instructa. *Vaginae* striatae, glabrae, coloris foliorum. *Ligulae* obtusiusculae. *Panicula* digitalis-palmaris, junior contracta, florens patens. *Pedunculi* 4-5 in semiverticillis alternis, sensim versus apicem minores. *Spiculae* parvae cum aristis 9 lineas longae, dimidiati-integram latae, lanceolatae, teretes, striatae, glauco-virides et albicantes. *Gluma calycina* valvulis inaequalibus, glabris, marginibus albo-argenteis; majore ovato-lanceolata, longitudine fere spiculae, uenpe 4 lineas fere longa: minore 3 lineas longa. *Glumae corollaceae* 3-4, valvula ex-

teriori 3 lineas longa, lanceolata, inferioris gluma corollaceae aristam 2 lineas longam, ex apice producente, secundam arista dorsali, saepe crispata, 6-7 lineas longa donata, tertiae et si adest quartae arista 4-5 lineas longa, basi inserta, armata. Valvula interior corollacea duplo minor et acuminata apparet. Axeos denticuli pilosi sunt.

Flor. Praer. — Therm. — B. Maj. — L. Aug.

Habit. in nemoribus, pratis, collibus siccis lapidosis. Germ. in Bavaria? Silesia? Hassia? Gall. in Depart. montis Jovis circa Lauterecken, Neustadt, Dresen, Standtebühl; in Dep. Sarae prope Grumbach.

2. Ventenata avenacea. Ventenate avénacée.

Haberartige Ventenate. ***

Avena dubia, paniculata, calycibus subtrifloris, flosculo infimo terminali arista recta, reliquis apice biaristatis, dorsali arista reflexa. Leers. herb. 41. t. 9. f. 3. Roth. I. 39. 2. 108. Hoffm. 59. et ic. 12. c. descr. Oestr. fl. I. 64. *tenuis*, paniculata, spiculis erectis subtrifloris, floribus omnibus fertilibus, infimo aristato, arista incurva, reliquis apice biaristatis, aristis brevibus erectis. Moench. meth. 195? Fl. d. W. R. 146.

paniculata calycibus subtrifloris, flosculis superioribus biaristatis, dorso arista reflexa, pedicellis superne incrassatis. Moench. Hass. n. 96. t. 2.

Holcus biaristatus. Vigg. prim. 776. Oestr. fl. I. 55.

Radix annua, fibrosa. Culmi spithamei — pedales, basi curvati, erecti, foliati, tenuis, laeves, internodio supremo longissimo, nodis 3-4 purpureo-

fuscis, tribus radici proximis. *Folia radicalia* pauca brevia, angustissima, striata, plana, glabra: *culmea* conduplicato - subulata, subscabria. *Vaginae* teretes, striatae, laeves, *inferiores* rufescentes, *superior* triplo longior, ampliorque. *Ligulae* oblongae, acutae, subtrifidae, longe prominentes. *Panicula* digitalis — palmaris, pauciflora, florēns patens. *Rhachis* internodiis teretibus, subscabris: *Pedunculi* filiformes, longi, patentes, sed briastuli, simplices, uniflori, raro biflori, rarius uti *terminalis* triflori. *Axis* pilosus. *Spiculae* erectae, parvae, in pedunculis plurifloris adpressae et subsessiles, pedicellis brevissimis incrassatis instructae. *Gluma* *calycinæ* *valvulis* oblongis, subteretibus, albidis, subfuscis, maculis sanguinibus nitentibus adspersis: *valvula* *exteriore* quinquenervia, *interiore* duplo majore & nervia, nervis parallelis, viridibus, scabris, utraque acuminata, albido - marginata. *Glumæ* *corollaceæ* 2, raro 3, rarius 4, omnes fertiles; *inferior* sessilis, basi nuda, longitudine glumæ *calycinæ*, *valvula* *exteriora* tereti subulata, 5 nervia, punctata, *arista* *terminali*, recta, vix longitudine aequali, donata; *interiore* duplo breviore, plana, apice bifido: *superior* brevissime pedicellata, basi pilosa, priori similis at apice et dorso aristata; *aristis* nempe *terminalibus* 2, capillo tenuioribus, rectis, parallelis; longitudine sere *valvulae*; *dorsali* unica paulo supra medium proveniente, geniculata, tortili, *valvula* duplo longiore: *summa* *tertia*, imo *quarta*, si adsunt, uti intermedia se habentes. *Antheræ* ochroleucae, exiguae. *Stigmata* alba. *Squamulae* ovatae.

Flor. Praer. — *Mess.* *Matur.* *Mess.* — *Fruct.*

— *β Maj.* — *β Jul.* .. . *β Jun.* — *ε Sept.*

Habit. in arvis siccis, sterilibus, *Germ.* Herborn, Austriae, Hass. ? Wetterau.

AD TAB. XXVI.

XXV. Arundo. Roseau. Schilf.

Tourn. 526. Linn. ed. Gil. 2. 26. Venten. 2. 110.
Lam. t. 46. Moench. meth. 196. Scheuchz. agr. 3.
143. Oeder. flor. dan. t. 280.

Gluma calycina bivalvis, *valvulis erectis*, *oblongis*, *acuminatis*, *muticis*; *inferiore breviore*.
Glumae corollaceae 2-6, *valvulis longitudinis valvularum calycinarum aut longioribus*, *oblongis*, *acuminatis*, *exteriore basi lanugine longa instructa*.
Squamulae 2, *acutae*. *Filamenta tria*, *capillaria*.
Antherae utrinque bifurcatae. *Ovarium oblongum*,
Styli 2, *capillares*, *reflexi*, *villosi*. *Stigmata simplicia plumosa*. *Gluma corollacea semini adnata nec dehiscens*. *Semen unicum oblongum*, *utrinque acuminatum*, *basi pappo instructum*. *Spiculae lançolato-acutae*. *Panicula plus minusve contracta*.

1. Arundo Phragmites. Roseau commun.
Gemeines Schilf. *

Arundo phragmites, calycibus quinquefloris, panicula laxa. Linn. ed. Reich. 1. 227.
ed. Gil. 3. 114. s. veg. ed. Pers.
127.

vulgaris. Lamarck. 1189. 5. Lestib. 227.
palustris. Moris. hist. 3. p. 218. t. 8.
f. 2. J. Bauli. hist. 2. 485.
sive Phragmitis diascorides C. Bauh.
pin. p. 17. Tourn. 526. Mapp. 30.
Buxb. Thal. p. 27. Berg. frc. p. 325.
Mönt. ic. p. 31. β. Scheuchz. agr.
p. 161. t. 3. f. 14. Magn. bot. 29.
hort. 23. Zannichell. ven. 22.
t. 183.

t. 183. Rupp. jen. p. 318. Dill.
giefs. p. 175. Hall. goett. p. 46.
panicula laxa flosculis quinis. fl. suec. 99.
105. Boehm. lips. n. 624.
calycibus subhifloris. Sauv.
monsp. 38.
palustris. Camer. epit. 73.
foliis secantibus, locustis trifloris papposis
muticis. Häll. helv. n. 1518.
media vulgaris, foliis et culmo in summo
fusiforme corpus componentibus.
Scheuchz. agr. p. 162.

Wilke gryph. n. 65. Schkuhr. bot. H. I. t. 26. f. 1.
Weig. pom. n. 78. Gronov. virg. 137. Nonne erf. p.
280. Plan. erf. p. 60. Jacq. vind. p. 267. Krock. I. 196.
Roy. lugdb. 66. Reich. frc. 20. Roth. I. 50. 2. 147.
Nekker gall. p. 69. Gmelin. tub. p. 30. Poll. I. 128.
Scopol. I. 89. Moench. hass. n. 97. Meth 196. Gmelin
sib. I. p. 125. Scholl. barb. n. 95. Engl. bot. 401. Willd.
pr. n. 183. Wibel. w. 109. Goüan. hort. 55. fl. 126.
Grimm. is. p. 267. Fl. d. Wett. I. 150. Oestr. fl. I. 65.
Doerr. nass. p. 4. Matuschk. I. 72. Schrank. I. 378.
Wigg. prim. p. 10. Leers. 44. t. 7. f. 1. Murr. prodr.
p. 43. Hoffm. 60. Dictr. I. 123. Leyss. hal. n. 122.
Delarbre. 27. Zinn. goett. p. 70.

Radix perennis, longe repens, fibrosa. *Culmus*
erectus, 3 - 15 pedalis, striatus, simplex, raro in-
ferne ramis sterilibus auctus, infra paniculam paulu-
lum nudus, -basi crassitie digit, glaber, scabrius-
culus, siccus, nodis 10 - 26 purpureis, junior folio
convoluto-coniformi terminatus. *Folia* plana, ner-
vosa, glabra, rigida, dura, margine serrulato-sca-
bro, lanceolata basi attenuata, apice mucronata, 5
pollices — sesquipedem longa, 8 - 16 lineas lata,
glauco-viridia, nervo albido dorsali praedita, sum-
num panicula longius. *Vaginae* glabrae, striatae.

Ligulae densae pilosae. *Panicula* pedalis -- ultrapedalis, densa, contracta, florens et matura patentior nutans atque secunda, post anthesin plumosa. *Rhachis* laevis aut scabriuscula, *internodiis inferioribus* teretibus, tortis, nodis pilis sericeis circumdati, *superioribus* semiteretibus, uno latere plano, *sequentibus* lateribus 2 oppositis planis, *summis* tetragonis, lateribus oppositis canalieulatis. *Pedunculi* 7-10, alternatim semiverticillati, aut dorso subconvexi, altero latere canaliculato, aut subtrigoni, subtetragoni, vel scabriusculi vel laeves, ramosissimi, valdeque inaequales. *Spiculae* erectae angustae, 7 lineas longae, quadrantem lineae latae, juniores glabrae, obscure purpureae, lanceolato-mucronatae, teretiusculae. *Axis* plomosus. *Gluma calycina* *valvulis* trinerviis, *superiore* 3 lineas longa, *inferiore* 1½-2 lineas longa, ovato-acuta, latiore. *Glumae corollaceae* 3-6, plerumque vero 3-4, florentes remotiores, patentiores; *valvulis* angustissimis purpurcis, ad basin albidis, junioribus diaphanis, *exteriore* 5 lineas longa, apice convoluto-setaceo, obtusiusculo, uninervia, *interiore* triplo breviore retusa. *Semen* villis sericeis longitudine valvulae exterioris cinctum. *Antherae* purpureae, aetate pallidiores. *Stigmata* alba.

Var. *spiculis bifloris*.

Flor. Mess. — Vend. Matur. Vend. — Frim.
β. Jun. — β. Oct. β. Sept. — β. Dec.

Habit. in fossis, piscinis, lacubus, pratis uidis, ad ripas fluviorum et rivulorum lente fluentium, tot. fere *Gall.* et *Germ.* — In Dep. montis Jovis, prope Moguntiam in fossa primaria Portae novae in palude Bruch, pratis Gonzenhemensibus; im Altrhein; circa Frankenthal etc.

Offic. Radix arundinis.

2. Arundo donax. Roseau cultivé. (Canne.)

Zahmes Schilf. ***

Arundo donax calycibus quinquefloris, panicula diffusa, culmo fruticoso. Linn. ed. Reich. I. 227. ed. Gil. 3. 113. S. veg. ed. Pers. 127. Dietr. I. 123. Oestr. II. 5. 65.

sativa. Virid. cliff. 7. hort. cliff. 26. Lamarck. 1183. 6. Lestib. 227.

quae Donax Dioscorides et Theophrasti. C. Bauh. p. 271. theatr. 27. Tourn. 526. Scheuchz. agr. p. 156. t. 3. f. 14. A. B. C. Mont. ic. I. Magn. bot. 29. hort. 23.

calycibus trifloris, panicula diffusa. Roy. lugdb. 66. Mill. dict. n. 2. Goüan. h. 54. flor. 126. Sauvage. 38. Scop. I. 89. Forsk. aeg. arab. descr. p. 73. Gmelin. iti 2. p. 199.

caule lignoso, geniculato, foliis latissimis locustistrifloris. Hall. helv. n. 1516.

maxima et hortensis. J. Bauh. 2. p. 486.

indica laconica versicolor. Motis. hist. 3. p. 219. s. 8. t. 8. f. 9. hort. cliff. 26. versicolor. Mill. dict. n. 3.

Radix perennis, repens, articulata. Culmi 7-9 pedes alti, inferne geniculati, sublignosi, crassi, duri, foliati, nodis numerosis, approximatis; ju-niores folio in coni speciem convoluto terminati. Folia 2 - 3 polices lata, 1 - 2 pedes longa, paginis laevibus, marginibus scabris, juniora ciliata, aetate glabra, glauco-viridia. Vaginae coloris foliorum, aetate flavescentes. Panicula speciosa, 1 - 1 $\frac{1}{2}$ pedem longa, erecta, densa, purpurea, diffusa. Spiculae glabrae plerumque 2 - 5 florae, 7 - 9 lineas longae.

Gluma calycina valvulis inaequalibus, acutis. Glumae corollaceae valvula exteriore acuta. Axis plurimosus, uti in antecedente.

Var. foliis variegatis, flavescentibus, lineis viridibus.

Floret. cum antecedente.

Habit. in collibus apricis, hortis, vineis, sylvis, ad margines agrorum; Gall. in Depart. de l'Hérault, du Var, des Bouches du Rhône, des Basses-Alpes, de la Vaucluse. — Germ. in Austr. littoral. — Plantæ quoque culta.

AD TAB. XXVII.

XXVI. Avena. Avoine. (Aveine. Averon.) Haber. (Hafer.) (Avena et Holcus Auth. Avena et Gram. Tourn.)

Linn. ed. Gil. 2. 25. et 195. Venten. 2 101. et 109. Mill. illustr. p. 241. t. 7. Lam. t. 47. Tourn. t. 267. Moench. m. 133 et 194.

Spiculae hermaphroditae, aut polygamicae. — In speciebus hermaphroditis: Gluma calycina bivalvis, rarissime trivalvis, corollaceas laxè colligens; valvulis inaequalibus, saepe fere ventricosis, lanceolatis, acutis, aut bidentatis, laxis, muticis, exteriore majore. Glumae corollaceae 1-10, bivalves, valvula exteriore calycinis plerumque duriore earumque magnitudine aut breviore, plus minusve teretiuscula, et plerumque subventricosa, utrinque acuminata, apice integro aut dentato, plerumque e dorso aristata, arista, (raro 2) spiraliter saepe intorta, geniculo veluti inflexa, interdum recta, (in plantis cultis nonnunquam carente). Squamulae 2, lanceolatae, aut acutæ, aut obtusæ, vel integræ, vel incisæ. Filamenta tria, capillaria.

Antherae oblongae, bifurcatae. *Ovarium obtusum*. *Styli* duo reflexi, pilosi. *Stigmata simplicia*, pluma. *Gluma corollacea* semini adnata, plurimum haud dehiscens. *Semen unicum*, tenuis, oblongum, utrinque attenuatum, raro obtusum, aut bidentatum, sulco longitudinaliter notatum. — *In speciebus polygamicis Gluma corollacea hermaphrodita* plerumque unica, interdum 2. *In spiculis bifloris*: *Gluma corollacea mascula* 1, superior aut inferior, in *trifloris* 2, laterales, hermaphrodita minores: *Filamentis* 3, *Antherisque uti in hermaphroditis*, *Pistillo* carente, aut ejus rudimento. *Arista* in *polygamicis* aut nulla, aut *dorsalis*, raro 2, rarius *terminalis*.

Panicula laxa aut *contracta*.

1. *Avena pubescens*. Avoine pubescente.
Zarthaariger Hafer. *

Avena pubescens, subspicata, calycibus trifloris, basi pilosis, foliis planis pubescentibus. Linn. ed. Reich. I. 223. ed. Gil. 3. III. s. veg. ed. Pers. 126. Mant. 327.

triantha locustis teretibus, erectis, petiolis sericeis, gluma exteriore lacera. Hall. helv. n. 1498.

calycibus trifloris, panicula nutante, foliis planis. Gmelin. sib. I. p. 129.

pratensis. Gort. ingr. 15.

var. β . Nekker. gallob. p. 67.

pilosa Scopoli. I. 86.

Festuca dumetorum, foliis angustissimis pilosis. C.

Bauh. pin. p. 10. prodr. p. 19.

Vaill. par. 89. ic. t. 18. f. 1.

Gramen avenaceum hirsutum, panicula purpurea argentea splendente. Scheuchz. agr.

p. 226. t. 4. f. 20. Tourn. 525.
 Raj. angl. 3. p. 406 t. 21. f. 2.
 Dill. giels. p. 86. Rupp. jen. p.
 317. Hall. goett. p. 48.

Lamarck. 1182. 8. Willden. pr. 180. Huds. angl.
 42. Wiggers prim. p. 9. Fl. d. Vetter. I. 144. Roth.
 I 38. 2. 105. Schrank I. 376. Poll. I. 127. Gmelin.
 tub. p. 332. Hoffm. 59. Berg. frc. p. 325. Leers. 42.
 t. 9. f. 2. Reyg. ged. 2. p. 41. Leyss. hal. n. 120. Reich.
 frc. 2. 168. Plan. erf. p. 60. Lestib. 226. Scholl. barb.
 92. Moench. hass. n. 95. Doerr. nass. p. 5. Murr. pr.
 p. 32. meth. 195. Delarbre. 33. Oestr. fl. I. 64. Wi-
 bel. w. 121. Krock. I. 189.

Radix perennis, stolonifera, fibrosa, densa.

Culmus erectus, basi paululum curvatus, laevis, teres,
 $1\frac{1}{2}$ - 4 pedes altus, nodis purpureis 3 - 4, superne pa-
 rum nudus. *Folia* plana, rigidiuscula, non involuta,
 laete aut ex purpureo-viridia, 1 - 3 lineas lata, 2 - 8
 pollices longa; *radicalia* angustiora, utrinque pilosa,
 pilis rigidiusculis, retroflexis; *culmea* saepe latiora,
 marginibus et nervo carinante scabra, pubescens, *sum-
 mum* brevissimum glabrum, aetate complicatum.

Vaginae teretes, striatae, scabriusculae, certe inferi-
 ores pilosae, pilis rigidis, albis, retroflexis. *Ligu-
 lae* vaginalium culmearum superiorum magnae, ob-
 tusa, acumine longo intermedio, *summae* et *infe-
 riores* perbreves, obtusae, acumine vix manifesto,
 et vix crenulatae. *Panicula* junior contracta et co-
 arctata, florens patens, 4 - 6 pollices longa, multi-
 flora, aetate iterum contracta, et subnutans. *Rhachis*
 internodiis teretibus laevis. *Pedunculi* 5 - 7 in se-
 miverticillis alternis, compressi, scabri, simplices,
 et ramosi, plerumque 1 - 4 spiculas gerentes. *Axis*
 plumosus. *Spiculae* erectae, pulchrae, lanceolatae,
 ex viridi-albo et purpureo-variegatae, splendentes,
 glabrae, absque aristis 6 lineas longae, $1\frac{1}{2}$ lineam

fere latae (*Avenae elatioris*, cui primo intuitu haud dissimiles, majores) laeves. *Gluma calycina valvulis membranaceis*, pellucidis, acuminatis, *majore* ovato-lanceolata, mucronata, basi nervis viridibus donata, fere semiunciali; *minore* breviore. *Glumae corollaceae omnes* aristatae, plerumque 3, rarius 2, 4, 5, basi pilosae, *superiores* minores: *valvula exteriore* lanceolata, obtusa, 4-5 lineas longa, quinque nervia, apice dentato, dente intermedio majore, ex dorso *aristam* 8-10 lineas longam, ex albo violaceam aut subfuscari, demum tortilem, producente: *interiore* breviore, angusta, membranacea, marginibus enerviis. *Squamulae* longitudine ovarii, truncaiae, tridentatae. *Antherae* purpurascentes, aut flavae. *Stigmata* alba.

Flor. Flor. — Mess. *Matur.* Mess — Fruct.

ꝝ Apr. — ꝝ Jul. *ꝝ Jun.* — ꝝ Sept.

Habit. in pratis, pomariis, hortis, aggeribus, sylvis, muris, tot. fere *Gall.* et *Germ.* — in Dep. Mont. Jovis circa Lautern, et circa Moguntiam in declivitate loricarum interiorum ad Portam Miinster.

2. *Avena pratensis*. Avoine des prés. Wiesensäfer. **

Avena pratensis, subspicata, calycibus quinquefloris. Linn.ed.Reich. I. 225. ed.Gil. 3. 112, s. veg. ed. Pers. 127. Mant. 327.

spicis erectis, calyce spiculis breviore. flor. lapp. 33. Fl. suec. 96. 104. Boehm. lips. n. 628.

pilosa. Scopoli I. 86.

calycibus quinquefloris, panicula spicata, foliis involutis. Huds. angl. 42.

panicula spicata, spiculis cylindricis culmo adpressis. Guett. stamp. I. p. 182.

calycibus trifloris panicula erecta, foliis setaceis. Gmel. sib. I. p. 127.
petiolis brevibus unifloris, locustis teretibus
quinquefloris, basi pubescentibus.
Hall. helv. n. 1499.

Gramen avénaceum locustis splendentibus et bicoribus. Vaill. par. t. 18. f. 1.
elatus, foliis angustioribus glabris. Moris. hist. 3. p. 217. 8.
t. 7. f. 1.
montanum spica simplici, aristis recurvis. Tourn. 525. Scheuchz.
agr. p. 230. Raj. angl. 3. p. 152.
t. 21. f. 1. Rupp. jen. p. 317.
Hall. goett. p. 48.
angustifolium alpinum, spicata
panicula ex purpureo viridi et
argenteo variegata. Scheuchz.
agr. p. 230.

Lamarck. 1182. II. Wigg. prim. p. 9. Roth. 1. 39.
2. 107. Flor. dan. t. 1083? Zinn. goett. p. 69. Moench.
meth. 196. Schreb. spic. p. 53. Reich. frc. 2. 168.
Weig. pom. n. 77. Poll. I. 126. Scholl. barb. n. 94.
Flor. d. Wett. I. 147. Gort. ingr. p. 25. Lestib. 226.
Grimm. isen. p. 266. Hoffm. 59. Murr. prodr. p. 42.
Leers. 43. t. 9. f. 1. Wilke. gryph. n. 64. Goian. hort.
53. fl. 126. Willden. pr. n. 182. Schrank. I. 378.
Doerr. nass. n. 6. Delarbre. 33. Jacq. vind. p. 19.
Oestr. fl. I. 65. Wibel. w. 121. Krock. I. 194.

Radix perennis, luxurians, flavicans, fibrosa.
Culmi basi curvati, erecti, stricti, aut incurvati,
scabri, striati, $1\frac{1}{2}$ - 3 pedales, teretes, filiformes et
crassiores, laete aut ex rubello-virides, duriusculi,
ex magna parte nudi, nodis 2-3 purpureis. *Folia*
angusta, apice mucrone purpureo instructa; *radicalia*
caespitosa, 1 pollicem - pedem longa, 1 - $1\frac{1}{2}$ line-

am lata, plana, aetate convoluto — aut complicato-filiformia, duriuscula, striata, laete viridia, glabra, marginibus scaberrimis, nervo dorsali carinante: culmea brevia, plana, supra incana, scabra, subtus laevia. Vaginae subcompressae, foliis multo maiores, glabrae, striatae, basi scabrae, non raro maculis purpureis adspersae. Ligulae oblongae, interdum fissa. Panicula spiciformis, contracta, lanceolata, rigidiuscula, 5-7 pollices longa, pauciflora. Rhachis internodiis semeteretibus, subflexuosis, scabris. Pedunculi breves, incrassati, compressi, hispidi, stricti, culmo adpressi, an anthesi semiverticaliter erecti: inferiores gemini, altero bifloro longiore: superiores solitarii. Axis pilosus. Spiculae erectae, lanceolatae, ex tereti - planiusculae, glabrae, obtuso-mucronatae, ex viridi - albo et purpureo variegatae, splendentes, absque aristis 8 lineas longae, 1-1½ lineam latae, spiculis Avenae pubescentis haud dissimiles. Gluma calycina valvulis scaberrimis, majore spiculae fere longitudine, ovato-lanceolata, glabra, mucronata, nervosa, 7 lineas longa. Glumae corollaceae 3-5 raro 6-7, omnes aristatae, basi subpilosae, valvula exteriore ovato-lanceolata, nervosa, 6 lineas longa, apice acuminato, bifido, dorso aristam 8 lineas longam, rubro-fuscum, basi tetragonam, superne tortam, producente. Squamulae lanceolatae, acuminatae, ovario longiores, margine exteriore unidentata. Antherae purpureae. Stigmata alba.

Var. panicula densa, multiflora.

Flor. Flor. — Therm. Matur. Mess. — Fruct.

β. Apr. — β. Aug. — β. Jun. — β. Sept.

Habit. in pratis, pascuis, aggeribus, dumetis, ad margines sylvarum Gall. — in nostro Depart. circa Lautern, prope Moguntiam in declivitatibus locarum et pratis. — Germ. in Hass. Oldenb. Holsat. Wetter. Carniol. Bavar. Goett. Herb.

**3. Avena flavescentia. Avoine jaunâtre.
Goldhafer.**

Avena flavescentia panicula laxa, calycibus trifloris brevibus, flosculis omnibus aristatis. Linn. ed. Reich. I. 224. ed. Gil. 3. III. s. v. ed. Pers. 126. Mant. 326. flor. suec. n. 103.

pilosa. Scopoli. I. 87.
triantha locustis teretibus, calycina gluma altera minima; petiole villoso. Hall. helv. n. 1497.

Gramen avenaceum pratense elatius, panicula densa, flavescente, locustis majoribus, villosum. Scheuchz. agr. p. 225. t. 4. f. 19.

pratense elatius, panicula flavescente, locustis parvis. Tourn. 525. Scheuchz. agr. p. 223. t. 4. f. 18. Mont. gram. 55. t. 79. Raj. angl. 3. p. 407. hist. 1284. Dill. giess. p. 90. Rupp. jen. p. 317. Hall. goett. p. 47.
spica sparsa flavescente, locustis parvis. Moris. hist. 3. p. 215. s. 8. t. 7. f. 42.

Lamarck. 1182. 9. Willden. prodr. n. 181. Roy. lugdb. 66. Roth. I. 39. 2. 106. Goüan. hort. 53. fl. 126. Grimm. isen. p. 266. Leers. 48. 110. f. 5. Jacq. vind. p. 19. Curt. Lond. 3. p. 35. t. 212. Zinn. goett. p. 69. Flor. d. Wetter. I. 145. Gmelin tub. p. 332. Hoffm. 53. Kerner. I. t. 45. Gmelin sib. p. 129. n. 67. Schrank I. 377. Schreb. spic. p. 54. Graes. 76. t. 9. Leyss. hal. n. 121. Nekker. gall. 68. Scholl. barb. n. 93. Doerr. nass. p. 5. Moench. hass. n. 93. meth. 196. Reich. frc. 20. Plan. erf. p. 60. Poll. I. 125. Murr.

prodri. p. 42. Dietr. I. 121. Delarbre. 33. Oestr. fl. I.
64. Wibel, w. 121. Krock. I. 193.

Radix perennis, (annua. Moench.) fibrosa. *Culmi* virides, ad basin incurviusculi, erecti, laeves, 1-3 pedales, teretes, tenues, laeviter striati, glabri aut ad nodos 2-4, contractos, pubescentes aut glabros, remotos, purpureos vel virides, villosi, interdum quoque superne. *Folia* utrinque attenuata, pagina superiore, nonnunquam utrinque, villosa, mollia, 1-6 pollices longa, 2-3 lineas lata, plana marginibus et nonnunquam supra scabra, laete aut ex flavescente viridia, nervo albido dorsali brevi praedita. *Vaginae* tefetes, striatae villosae. *Ligulae* breves truncatae, subcrenatae. *Panicula* flavescens, 2-10 pollices longa, lanceolato-ovata, erecta, junior contracta, adultior patens. *Rhachis* teretiuscula. *Pedunculi* capillares, inaequales, 5-10, semi-verticaliter erecti, 2-5 et plures spiculas gerentes, subflexuosi. *Axis* plumosus. *Spiculae* absque aristis 3 lineas longae, dimidiata -- unam latae, ex viridi-flavae et splendentes, ovato-lanceolatae, compressae, subacutae, glabrae, dorso scabriusculae. *Gluma calycina* valvula exteriore angusta: interiore ovato-lanceolata, exteriore duplo majore, spiculae fere longitudinis, quiquenervia, nervis 2 lateralibus vix manifestis, margine membranaceo magno. *Glumae corollaceae* 2-5, plerumque 3, ultima abortiente, emnes aristatae, basi pilosae; *valvula* exteriore ovato-lanceolata, apice bifido, dentibus et lateribus membranaceis, argenteis, calycinis interdum longiore, infra incisuram apicis longam dorso *aristam* 4 lineas longam, tenuem, demum inflexam, producente. *Squamulae* ovato-lanceolatae. *Antherae* paleae flavae, aut albae. *Stigmata* alba.

Var. I. Spiculis majoribus.

2. — viviparis: *panicula* spicata,

squarrosa, *ovariis in fasciculos*
foliorum villosos excrescentibus
undique divergentibus.

3. *Dentibus apicis valvularum exterio-*
rum subaristatis.

4. *Panicula valde laxa.*

5. — *angusta coarctata, spiciformis,*
spiculis vernali tempore bi-
floris, autumnali 3-4 floribus (circa
Dietenbergen in territor. Darm-
stadt: ad vias).

Flor. Praer. — *Therm.* *Matur.* *Therm.* — *Vend.*
β. Maj. — *β. Aug.* *β. Jul.* — *β. Oct.*

Habit. in pratis, versuris, pomariis, pascuis,
 collibus: tot. fere *Gall.* et *Germ.* — In Dep. Montis-Jovis circa Lautern; prope Moguntiam, Gonzenheim, et Mombach in pratis. —

4. *Avena sesquitertia.* Avoine argentée. Sil-
 berhafer. ***

Avena sesquitertia, *paniculata, calycibus subtriflo-*
ris, flosculis omnibus aristatis,
receptaculis barbatis. Linn. ed.
 Reich. 1. 223. ed. Gil. 3. 111. s.
 v. ed. Pers. 126. Mant. 34.

(*flavescens* L.) var. Hall. helv. n. 1497.

Gramen pratense villosum, *panicula densa, ex ar-*
genteo-dilute spadicea vel fusca.
 Scheuchz. agr. p. 120. t. 4. f. 17. A.B.

Roth. 1. 38. 2. 105. Hoffm. 53. Leyss. hal. n. 119.
 Gmel. tub. p. 30. Plan. erf. p. 60. Moench. hass. p. 94.
 Oestr. fl. 1. 64. Krock. sil. 1. 188.

Radix annua fibrosa. *Culmus erectus, 2-3 pe-*
dalis, nodis pilosis. *Folia brevia, subtus pilosa.*
Vaginae inferiores hirsutae. *Panicula oblonga, pal-*
maris. *Pedunculi pilosi.* *Axis pilosus.* *Spiculae*

glabrae, splendentes, pallide flavae, aut subfuscæ.
Gluma calycina valvulis inaequalibus, corollaceis
 brevioribus. *Glumæ corollaceæ* 2-3, glabrae, ulti-
 ma si adest abortiens, omnes aristatae: *valvula ex-*
teriorum mucronata, integra, dorso arista duplo lon-
giore, instructa. *Antheræe* purpureæ. *Stigmata*
alba.

Flor. Praer. — *β. Therm.* — *β. Maj.* — *β. Aug.*

Habit. in pratis subalpinis, montosis *Germ.* —
 In Saxon. Hass. Virtemb. Austr. Siles.

5. *Avena strigosa*. Avoine rude. Rauher
 Hafer. ** 1559.

Avena strigosa panicula oblonga, contracta secunda,
 flosculis geminis apice biaristatis,
 dorso arista geniculata. Schreb. spic.
 p. 52. Matúška siles. I. 70. Roth. I.
 39. 2. 107. Scholl. barb. suppl. n. 1026.
 Wibel. w. 342. Timm. prodr. n. 659.
 Ehrl. gram. 38. Hoffm. 59. Krock. I.
 187. Rhezii obs. II. p. 11. Moench.
 meth. 195. Flor. d. Wetter. I. 141.
 Dietr. I. 117.

Radix annua, fibrosa. *Culmus* erectus 2 - 2½
 pedalis. *Folia radicalia* maxima, glabra, lineata,
 angusta, *culmea* brevia. *Vaginae* margine superne
 villis longis raris tortilibus obsessæ. *Ligulae* ob-
 tusa, fissæ. *Panicula* subpatens, secunda, nutans
 fere palmaris. *Pedunculi* capillares 1-2 flori. *Axis*
 plumosus. *Spiculae* splendentes pendulae, angustæ.
Gluma calycina valvulis ovato-lanceolatis, costis
 elevatis scabris. *Glumæ corollaceæ* 2, raro 3-4;
valvula exteriori glabra, angusta, longitudine ca-
 lycinarum, supra medium nervis scaberrimis notata;
 nitida, apice bifido, biaristato, *aristis* nempe 2 ter-
 minalibus, triplo brevioribus, tenuissimis, scaber-

rimis, aequalibus, et *dorsali* duplo longiore, *infra* medium fusca, recurva; *valv. inter:* *arista* *dorsali* *praedita?* (Moench. Fl. d. Wett.)

Flor. Praer. — Therm. *Matur.* Therm. — Vend. 8 Mai. — 8 Aug. — 8 Jul. — 8 Oct.

Habit. in segetes, et in ruderatis, sylvaticis. *Germ.* in Megap. Saxon. Brem. Siles. Hannov. Baruth. Westph. prope Barb.

6. *Avena fatua.* Avoine follete. Flughafer. *

Avena fatua, paniculata, calycibus trifloris, flosculis omnibus aristatis, basique pilosiss. Linn. ed. Reich. 1. 223. ed. Gil. 3. 110. s. veg. ed. Pers. 126. Fl. suec. 97. 101.

sylvestris pilosa, aristis recurvis. Moris. hist. 3. p. 209. s. 8. t. 7. f. 5.

seminibus hirsutis. Flor. lapp. 30. Roy. lugdb. 65. Sauv. 38.

panicula patente flosculis basi pilosis. Berg. fr. p. 325.

pilosa. Buxb. hal. p. 35. Scop. 1. c.

triantha locustis patulis villosis. Hall. helv. n. 1495.

Festuca prior. Dod. pempt. p. 539.

utriculis lanagine flavescentibus. Magnol. bot. 121. hort. 23. C. Bauh. pin. 10. theatr. 149. Barr. obs. 1229. ic. 75. n. 2.

Aegilops. Dod. cereal. p. 173. cum fig.

bromoides belgarum. Lob. ic. 33.

quibusdam aristis recurvis sive avena pilosa. J. Bauh. hist. 2. p. 433. Raj. hist.

1254.

Gramen avenaceum utriculis lanagine flavescentibus.

Tourn. 524. Scheuchz. agr. 239.

t. 5. f. 1. Mapp. 137. Rupp. jen.
p. 317. Dill. giefs. p. 174 app.
p. 89 t. 2. Hall. goett. p. 47.
lanuginosum, locustis lanugine
flavescens. Scheuchz. agr.
241.

Lamarck. 1182. 3. Wigg. prim. p. 9. Grunner.
norw. 1. 87. Schreber spic. p. 53. Graes. 109. t. 15.
Wilke gryph. n. 63. Goian. hort. 53. fl. 125. Mill.
illustr. 241. t. 7. Roth. 1. 38. 2. 104. Nekker ganob.
p. 67. Jacq. vind. p. 18. Hoffm. 60. Scholl. barb. n.
91. Schrank 1. 375. Nonne erf. p. 280. Plan. erf. p. 60.
Gmel. tub. p. 29. Flor. d. Wett. 1. 143. Zinn. goett.
p. 69. Dietr. 1. 119. Poll. 1. 124. Leers 42. t. 9. f. 4.
Leyss. hal. n. 118. Matuschk. 1. 68. Willden. prodr.
n. 179. Delarbre. 33. Krock. 1. 190. Moench. hass.
n. 92. Lestib. 226. Weig. pom. n. 76. Murr. prodr.
p. 42. Oestr. fl. 1. 64. Wibel. w. 120.

Radix annua, fibrosa, flavescens aut albida.
Culmi firmi, crassi, laeves, 2-4 pedes alti, inferne
curvati, dein erecti, teretes, glabri, striati, laete
virides, simplices, nodis 3-4 glabris aut pubescen-
tibus, viridibus vel purpureis, et internodio supre-
mo longissimo instructi. *Folia* lata, plana, lanceo-
lato-mucronata, undique scabra, nitida, striata, 5-
septinervia, viridia, *culmea inferiora* supremis et
radicalibus longiora, 14-15 pollices longa, 3-12
lineas lata, nervo dorsali albido crassiore instructa,
radicalia nonnunquam ciliata. *Vaginae* striatae,
laeves, glabrae, *inferiores* interdum pubescentes, vi-
rides. *Ligulae* breves, obtusae, fissae *Panicula*
6 pollices - pedem longa, junior pyramidalis, ma-
tura secunda, nutans, patens. *Rhachis* teres, inter-
dum flexuosa. *Pedunculi* solitarii - 8 ni, capillares,
compressi, debiles, nutantes, inaequales, apice in-
crassati, 1 - raro plurillori. *Axis* plumosus. *Spi-*

culae saepe pendulae, juniores ovato-lanceolatae, teretes et subcompressae, striatae, absque aristis 10-18 lineas longae, 2-3 lineas latae, ex glauco-virides et flavicantes. *Gluma calycina valvulis* ovato-lanceolatis, glabris, margine et apice membranaceo, fere aequalibus; *superiore* nervia, parum longiore, *inferiore* 7nervia, utraque corollaceis longiore. *Glumae corollaceae* 3, raro 2, *valvula exteriore* ovato-lanceolata, margine argenteo, 7-8 lineas longa, inferne 7nervia, dorso planiusculo, pilis fuscis aut albis adpressis strigosa, parum infra apicem glabrum bifidum, *aristam* 16 lineas longam, incurvam, inferne fuscum, tortam, superne viridem, aut armato oculo tantum scabram, aut tactu scaberrimam, emitte: *interiore* lanceolata, margine nervoso, ciliato, apice bifido, *exteriore* angustiore et breviore. *Squamulae* longae, angustae, acutae, ovario breviores. *Antherae* flavae. *Stigma-ta* alba. *Semen* villosum.

Flor. Mess. — *Fruct.* *Matur.* *Fruct.* — *Vend.*
β. Jun. — β. Sept. β. Aug. — β. Oct.

Habit. in agris, inter segetes, t. f. *Gall.* et *Germ.* — in Depart. Montis Jovis circa Lautern, Frankenthal, Oba, Wverstadt, Alzey, Oppenheim, Moguntiacum inter hordeum abunde.

7. Avena sativa. Avoine cultivée. Zahmer Hafer.

Avena sativa, paniculata; calycibus dispermis, seminibus laevibus, altero aristato. Linn. ed. Reich. I. 222. ed. Gil. 3. 110. s.v.ed. Pers. 126. hort. cl. 25. h. ups. 20. Mat. med. 47. Roy. lugdb. 65. Dietr. I. 115. Marterst. Bonn. 24. Sukow. oek. bot. 273. Lamarck. 1182. 2. Fl. d. VV. I. 138. Moench. meth. 195. Schrank. I. 374. Les-

Lestib. 225. Goian. hort. p. 52. n. 2.
fl. 125. Sauvage. 38. Delarb. 33.
Krock. I. 186.

Avena diantha locustis pendulis, floribus cartilagineis, inaequalibus, majore aristato.

Hall. helv. n. 1494. Blackw. t. 422.

panicula undiquaque sparsa, calycibus flore majoribus, gluma majore cartilaginea. Hall. in n. comm. goett. 5.
p. 16. t. 4.

disperma mill. dict.

vesca. Lobel. ic. p. 31.

nigra et alba. C. Bauh. pin. p. 23. Magnol. bot. 35. hort. 29. Tourn. 514.

Radix annua fibrosa, albida aut flavescens.

Culmi erecti, laeves, basi incurvi, teretes, glabri, striati, 1 - 3 pedes alti, nodis 2-4 purpureis aut viridibus. **Folia** nervosa, striata, scabra, glabra, laete viridia, plana, 4-8 lineas lata, 5 pollices-pedem longa. **Vaginae** striatae, glabrae, laeves. **Ligulae** breves, truncatae. **Panicula** plus minusve laxa, secunda, superne nutans, 6-15 pollices longa. **Rhachis** teres, laevis, glabra. **Pedunculi** solitarii aut bini — octoni, inferiores adpressi erecti, scabri, ramosi, nutantes, versus apicem incrassati. **Spiculae** pendulae, absque aristis pollicares et ultra-pollicares, glabrae, striatae, laeves, virides. **Gluma calycina valvulis** subaequalibus, corollaceis longioribus, et multo latioribus, ex ovato-lanceolato-oblongis, acuminatis, 11 nervis margine et apice argenteis membranaceis, duriusculis, 10 et plures lineas longis. **Glumae corollaceae** plerumque 2, raro 3; **inferior** sessilis, **secunda** et si adest **tertia** pedicellata, **valvula** exteriore dura, cartilaginea, glabra aut hirsuta, apice acuto bifido, ex dorso aristata, **arista** incurva, pollicari et ultrapollicari, scabra, in gluma

T

altera et tertia plerumque carente, tortili, basi fusca: *intiore* angustiore breviore membranacea marginibus nervosis ciliatis, apice bifida. *Antherae* flavae. *Stigmata* alba.

Var. I. alba; semine flavescente, glabro, axi glabro.

a. *vulgaris*; (descripta.)

b. *anglica*, s. *hyemalis*. Culmo crassior et altiore, foliis latioribus; semine majore.

c. *praecox*; Mens. Therm. maturans.

d. *monosperma*; gluma corollacea altera abortiente.

e. *trisperma*; glumis corollaceis 3 fertilibus.

f. *uniflora*; spiculis unilloris.

g. *aristata*.

h. *mutica*.

g. *mutica*. Glumis corollaceis omnibus muticis.

h. glumis corollaceis 2 fertilibus, tertia abortiente.

i. *nigra*. Semine nigrescente, aristis inferne nigrescentibus.

j. *glabra*, seminibus glabris.

a. *praecox*; semine fusco, mense Therm. maturante.

b. *quercina*; glumis valde duris, semine pallidiore.

c. *grisea*; semine griseo.

d. *brunea*; semine rufo.

e. *coerulea*; semine cinereo.

f. *pilosa*; semine et axi piloso.

Flor. Mess. — Therm. Matur. Fruct. — Vend.

β Jun. — β Aug. — β Aug. — β Oct.

Cultur in Gallia et Germania.

(Habit. secundum Anson in Insula Juan-Fernandez.)

3. *Avena bromoides.* Aveine bromoide.
Trespenartiger Hafer. ***

Avena bromoides, *subspicata*, *stricta*, *spiculis binatis*, *altera pedunculata*, *aristis divaricatis*, *calycibus octofloris*.
Linn. ed. Reich. I. 223. ed. Gil.
3. 113. s. veg. ed. Pers. 127.
Goiian hort. 52. flor. 125.

pratensis. var. Lamarck. 1182. II.

petiolis etc. Hall. helv. n. 1499. qua var.
prat. L.

Gramen alpinum avenaceum glabrum, angustifolium,
locustis aristatis in spicam dispositis.
Scheuchz. agr. 228. t. 4. f. 21. 22.

Differt praecipue a pratensi, (cujus verisimiliter
varietas est):

Spiculis longioribus, paucis.

Culmus bipedalis, teres, filiformis. Spiculae
teretes, quandoque solitariae alternae, saepius binatae,
(altera sessili, altera pedunculata) erectae, albican-
tes, veluti argenteae. Glumae corollaceae 4-8, ple-
rumque vero 8. Aristae e medio dorsi, tortiles, di-
varicatae. —

Facies Bromi squarroso.

Habit. in Galliae Depart. de l'Hérault.

9. *Avena nuda.* Aveine nue. Tartarischer
Hafer. ***

Avena nuda. C. Bauh. pin. p. 23. J. Bauh. hist. 2.
p. 339. Raj. angl. 3. p. 389. Lob.
ic. 32. Moris. hist. 3. s. 8. t. 7. f. 4.
Flor. d. Wett. I. 142.

paniculata, calycibus trifloris, re-

T 2

cepitaculo calycem excedente, petalis dorso aristatis, tertio flosculo mutico. Linn. ed. Reich. I. 222. ed. Gil. 3. 110. S. veg. ed. Pers. 126. Amoen. acad. 3. p. 401. Dietr. I. 118. Delarbre. 33. Oestr. fl. I. 64.

paniculata, calycibus quadrisfloris, arista dorsali recta nec torta, ultimo flosculo mutico seminibus decorticatis. Moench. m. 195.

calyce flore minore, locustis glabris bifloris aristatis, gluma minore bifida. Hall. Lin nov. C. Goett. 7. p. 19. t. 2. et 4.

Sativae similis. Differt autem:

Glumis corollaceis 3-4, *valvula exteriore* (*glumarum superiorum* muticarum *pedicellatarum* apice bifidarum) *dorso arista recta*, *nec torta*, *instructa*. *Seminibus* *decorticatis* (*Gluma corollacea dehiscente*). *Flor.* Mess. — Therm. *Matur.* Therm. — Vend. *β. Julii.* — *β. Aug.* *β. Jul.* — *β. Oct.* *Habit.* inter *avenam sativam*. *Germ.* in Austr. Darmstadt. — *Gall.* in Dep. de l'Allier; du Puy du Dome etc.

Io. *Avena orientalis*. Aveine orientale.
Türkischer Hafer. ***

Avena orientalis, *panicula coarctata*, *secunda*, *spiculis bifloris*, *horizontalibus*, *parallelis*, *seminibus laevibus*. Schreber. spic. n. 987. Moench. meth. 195. Fl. d. Wett. I. 140. Dietr. I. 118.

Differt a *sativa*:

Panicula magis *coarctata*. *Spiculis parallelis* et *Horizontaliter patentibus*, *nec pendulis*. *Seminibus*

glabris et glumis calycinis corollaceis durioribus longioribus.

Flor. Mess. — Therm. *Matur.* Therm. — Vend. β.Jun. — β.Aug. β.Jul. — β.Oct.

Colitur in Germ. Wetteravia et Comit. Hannov.

11. *Avena brevis.* Aveine courte. Kurzer Hafer. ***

Avena brevis, calycibus subtrifloris, seminibus brevibus, obtusis, apice bidentatis, arista dorsali scabra. Roth. 1. 40. panicula secunda laxa, calycibus dispermis, seminibus brevibus obtusis, apice bidentatis, dorso aristatis scabris. Roth. 2. 108. Bot. Abh. und Beob. p. 42, n. 1. Hoffm. 60.

Radix annua, fibrosa. *Culmus* bi-tripedalis. *Folia* scaberrima. *Vaginae* margine villis longis, raris, flexuosis, obsessae. *Ligula brevis*, truncata, crenata, ciliata. *Panicula laxa*, secunda, digitalis et paulo longior. *Pedunculi superiores uniflori*, inferiores bi- aut triflori. *Gluma calycina valvulis inaequalibus*, corollaceis longioribus, seminibus breviorebus, ovato-acuminatis, nervosis. *Glumas corollaceae* 2, aequales, *valvula exteriore* ovata, obtusa, apice bidentata, dorso superne nervo eminente scabro, basi glabra, supra medium aristam triplo longiorem, tortilem, recurvam producente: *interiore* obtusa. *Semina* ventricosa, nigricantia, quinquecostata, dorso superne praecipue scabra.

Var. 1. spiculis trifloris.

2. seminibus dorso ad insertionem aristae pilosis.

3. axi subpiloso.

Floret aestate. *Matur.* autumno.

Habit. inter segetes aestivas. — *Germ.* Dac.
Bremens.

11. *Avena versicolor.* Avoine versicolore.
Veränderlicher Hafer. ***

Avena versicolor, subspicata, calycibus subquinquefloris, rhachi pilosa. Willden. Hoffm. 59.

panicula spicata flavescente: spiculis sexfloris distinctis pedunculi longitudine, rhachi hirsuta. Oestr. fl. I. 65.

Scheuchzeri, paniculata, calycibus subquinquefloris, flosculis omnibus aristatis, basi pubescentibus. Host. — vid. Hoffm. l. c.

petiolis ramosis locustis teretibus, quinquefloris, basi pubescentibus. Hall. helv. n. 1500.

Testuca avenacea humilior, alpina, locustis varicoloribus, majoribus aristatis. Scheuchz. it. 6. p. 455. t. 19.

avenacea humillima, alpina, locustis varicoloribus splendidibus, in purpureas aristas desinentibus, caule hirsuto. Scheuchz. it. 6. p. 456.

Gramen avenaceum, paniculatum, alpinum, locustis varicoloribus, majoribus aristatis. Scheuchz. agr. p. 237. et T. III. prôdr.

Culmus semipedalis — pedalis, glaber. *Folia* glabra, minus rigida quam in *pratensi*, duas lineas saepe lata, carinata. *Panicula* perinde longa, angusta, spicata. *Pedunculi triflori* — pluriflori. *Spiculae* teretes, dimidio minores quam in *pratensi*. *Gluma calycina valvulis* splendidibus, purpureis,

apice curvo donatis, inaequalibus, mucronatis.
Glumae corollaceae 4-6, *valvula exteriore* ex viridi
 spadiceo et aureo varia, mucronata, *arista longa*,
 fusca, geniculata, tortili e dorso proveniente, do-
 nata: *interiore membranacea*, pariter ex aureo et
 argenteo varia. *Axis villosus.*

Var. culmo hirsuto.

Flor. Mess. — *Fruct.*

β.Jun. — *β.Sept.*

Habit. in pascuis alpinis et subalpin. *Germ.* in
Styria. Tyrol.

13. *Avena fragilis.* Avoine fragile. Zer-
 brechlicher Hafer. ***

Avena fragilis spicata, calycibus quadrifloris flosculo-
 longioribus. Linn. ed. Reich. I. 225.
 ed. Gil. 3. 112. S. v. ed. Pers. 127. Mant.
 326. Lamarck. 1182. 13. Schreb. Graes.
 t. 24. f. 3. Goüan. hort. 53. fl. 126.
 Moench. meth. 196. Oestr. fl. I. 65. —

Gramen loliaceum, lanuginosum, spica fragili arti-
 culata, glumis pilosis, aristatum.
Scheuchz. agr. 32.
lanuginosum spica fragili articu-
 lata, glumis glabris, aristatum.
Scheuchz. agr. 33.

spurium hirsutum aristis genicu-
 latis, maximum (medium et
 minus.) Barr. ic. 905. f. I. 2. 3.
 Mont. pr. 41.

spica longissima, aristata. Buxb.
 cent. 5. p. 20. t. 39. f. I.

Radix annua (perennis Moench) fibrosa, albida.
Culmi spithamei -- bipedales, inferne geniculato - de-
 cumbentes, dein erecti, laeves, glabri, filiformes,
 basi ramosi, nodis 3-4 purpureis. *Folia* pollicaria

et longiora, fere 2 lineas lati, plana, mollia, viridia, nervosa, villosa, acuminata. *Vaginae* nervosae, pilosae. *Ligulae* truncatae. *Panicula* spiciformis, 1-6 pollices longa, angusta, disticha. *Rhachis* glabra, saepe flexuosa, valde fragilis, internodiis compressis, uno latere excavato, albido, angulis scabris argutis. *Spiculae* adpressae, alternae, sessiles, virides, juniores teretes, adultiores apertae compressae. *Gluma calycina* valvulis oblongis, semi-teretibus, compressiusculis, nervis parallelis donatis, glabris, margine albo membranaceo, obtusis: *exteriore* dimidio angustiore et breviore. *Glumae corollacea* 3-10, superiores, saepe abortientes, remotae; *valvula exteriore* calycina minore, longiore, ventricosa, subcompressa, enervia, albida, glabra, apice viridi, superne margine membranaceo, acuminata, dorsa *arista* debili, inferne torta, infracta, albida armata: *interiore* angustiore, breviore, membranacea, albida, obtusa aut apice crenato, armato oculo ciliata, marginibus inflexis. *Squamulae* oblongae, acutae, pilosae, ovario dimidio breviores. *Antherae* flavae breves. *Stigmata* alba.

Var. Spiculis pubescentibus, foliis nudiusculis, inferiore pagina glabris, ciliatis.

Floret aestate.

Habit. in arvis, pratis montanis, siccis, ad vias; *Gall.* in Depart. de la Drome; des hautes Alpes; de l'Isere; du Var; des Bouches du Rhône; des Basses Alpes; de la Vaucluse; de l'Hérault; de l'Aude; du Gard etc. — *Germ.* in Aust.

14. *Avena alpina*. Avoine des Alpes. Alpenhafer. ***

Aira alpina foliis subulatis, panicula densa, flosculis basi pilosis aristatis, arista brevi-

Linn. ed. Reich. I. 179. ed. Gil. 3. 82.
 s. veg. ed. Pers. 115. flor. suec. 69. 73.
 Roth. I. 36. 2. 98. Matuschk. I. 51.
 Reyg. ged. I. p. 39. n. 2. Jacq. vind.
 p. 15. Krock. I. 123. Oestr. fl. I. 57.
*foliis subulatis planis pedunculis rectis,
 flosculis basi pilosis, arista dorsali
 calyce breviore.* Vahl. Fl. dan. t. 961.
 Hoffm. 39.

Gramen avenaceum capillaceum, minoribus glumis
 argenteis, vix aristatis, foliis an-
 gustioribus. Scheuchz. agr. p.
 222.

*Radix perennis, fibrosa. Culmus erectus paulu-
 lum incurvus, pedalis - sesquipedalis, purpurascens,
 superne nudus, et pulcherrime striatus, nodis 3 - 4
 purpureis contractis instructus. Folia radicalia caes-
 pitosa, semiuncialia, plana, aetate convoluta, rigida,
 subulata, patentia, extus glaberrima, intus striato-
 sulcata, margine scaberima: culmea 3 - 4, fere bi-
 uncialia. Vaginae striatae, glabrae. Ligulae ova-
 tae, obtusae, bifidae, aut fissae. Panicula 2 - 3 un-
 cialis, patens. Pedunculi recti, gemini. Axis pilo-
 sus. Spiculae oblongae, approximatae parvae. Glu-
 ma calycina valvulis acuminatis, costatis, basi
 dorsoque atropurpureis, margine apiceque sordide
 albis, bidentatis. Glumae corollacea 2, sordide
 albae, basi pilis candidis duplo brevioribus circum-
 datae: inferior sessilis: superior pedicellata: val-
 vula exteriore quadridentata, dentibus inaequalibus,
 dorso infra medium arista scabra, paululum incras-
 sata, recta, valvulae longitudinem raro superante
 armata.*

Flor. Therm. — Fruct. & Jul. — & Sept.

*Habit. in collibus limosis, montosis, alpibus,
 sylvis; Germ. in Duc. Brem. Austr. Siles. Salisb.*

15. Avena airoides. Avoine airoïde. Schmiedenartiger Hafer. ***

Aira subspicata, foliis planis, panicula spicata, flosculis medio aristatis, arista reflexa, laxiore. Linn. ed. Reich. t. 178. ed. Gil. 3. 81. s. veg. ed. Pers. 115. Flor. suec. 65. 69. Flor. lapp. 47. Hoffm. 58. Jacq. vind. p. 14. Doerr. nass. p. 2. Roth. 1. 35. 2. 96. Weber. spic. p. 3. Oed. t. 228. Oestr. fl. 1. 56.

Avena diantha, panicula dense spicata. Hall. helv. II. 1490.

Gramen avenaceum paniculatum alpinum, humile, locustis in spicam congestis varicoloribus aristatis. Scheuchz. agr. p. 221. prodr. 24. t. 6. Hall. app. I. t. 6.

Radix perennis, fibrosa. *Culmus* digitalis et altior, sub spica villosus, ad basin binodis. *Folia* plerumque 3, mollia, glabra, 1-1 $\frac{1}{2}$ lineam lata, 6 lineas - pollicem longa. *Vaginae* glabrae. *Ligulas* obtusae, fuscae. *Panicula* pauciflora, 6 lineas - pollicem longa, dense spicata. *Pedunculi* villosi. *Spiculae* 2 lineas longae, violaceae aut spadiceae. *Gluma calycina valvulis* subaequalibus, mucronatis, ovatis, violaceis, apice aureo, corollaceis brevioribus. *Glumae corollaceae* 2, interdum 3, glabrae, intentes, inferior sessilis, superior breviter pedicellata; *valvula exteriore* ex purpureo-viridi- et aureo variegata, dorso supra medium aristata, *arista* basi recurva, spicula longiore, 2-2 $\frac{1}{2}$ lineas longa.

Flor. Mess. — *Fruct.* β. Jun. — β. Sept.

Habit. in ruderatis, montosis, alpinis: *Germ.* in Austr. Nassov. ad Harcyn.

1585
16. **Avena odorata.** Avoine odorante. Wohl-
riechender Hafer. ***

Holcus odoratus glumis trifloris, muticis, acuminatis, flosculo hermaphrodito diandro.
Linn. ed. Reich. 4. p. 310. ed. Gil. 4. 569. s. v. ed. Pers. 946.

Avena odorata. Hoffm. 58.
triantha, locustis paniculatis, hiantibus, flosculo tertio imperfecto. Hall. helv. n. 1496.

Aira foliis planis, floribus trifloris aristatis, flosculo intermedio mutico diandro. Fl. siuec. 70. 918. Sauv. 36.

Savastana hirta. Schrank. I. 337.

Hierochloe. Gmelin. sib. I. p. 101.

Gramen paniculatum odoratum. C. Bauh. pin. p. 3. prodr. p. 7. Scheuchz. agr. p. 236. t. 4. f. 26.

Mariae borussorum. Loes. pruss. III. t. 26.

Flor. dan. t. 963. Goian. hort. 514. flor. 130. Nekker. gallob. p. 415. Lamarck. 1195. 4. Roth. I. 429. 3. 543. Scholl. suppl. barb. n. 1089. Reyg. gedan. I. p. 238. n. I. Hofer in act. helv. II. p. 152. Willden. prodr. n. 141. Delarbre. 101. Oestr. fl. I. 55.

Facies Melicae. Radix perennis, fibrosa. Culmus pedalis — 2 pedalis, erectus, tenuis, glaber, striatus, maxima ex parte tectus, nodo 1 aut 2, 3-4 purpureis exiguis, glabris. Folia radicalia et culmea infima plana, striata, glabra, margine scabro, subtus nitida, supraglaucescens, digitalia — palmaria, et longiora, sesquilineam lata. Vaginae glabrae, striatae: infimae unciales — biunciales; infra medium culmi una alterave longior. Foliolo lanceolato, obtusiusculo, aut vix semiunciali aut minore terminata; superne una aut altera longissima, laxa,

versus apicem subventricosa, truncata, aphylla, membrana brevi, argentea *Ligulam* constitutae aucta. *Ligulae* breves truncatae. *Panicula terminalis* vix 2 pollices longa, pauciflora ex bruneo-flavescens, patentiuscula. *Pedunculi alterni*, glabri, solitarii, infra medium dichotomi, ramosi. *Pedicelli capillares*, pilosi, secundi. *Spiculae* solitariae, polygamicae. *Gluma calycina* triflora, hians; *valvulis* subaequalibus, siccis, albidis aut flavescentibus, glabris, nitidis, mucronatis. *Glumae corollaceae* longitudine calycinae: *masculae* 2, laterales, triandrae; *valvulis exterioribus* ovato-acuminatis, hirsutis, fuscis, infra medium *arista* dorsali, refracta, brevi, vix spiculam excedente praedita; *interiore* ciliata, apice emarginata, bidentata: *hermaphrodita* intermedia, diandra; *valvula* exterior glabra, mutica; *interiore* subciliata.

Var. 1. *Panicula bracteata*, bractea lanceolata alba, membranacea.

2. *Arista in gluma corollacea altera* carente.

Flor. Ventos. — *Therm.* Febr. — Aug.

Habit. in pratis et pascuis montosis, humidis, ad margines sylvarum *Gall.* in Depart. De la Dyle; de Lys; de l'Herault; du Haut-Rhin — prope Mühlhusiam; du Puy du Dome. — *Germ.* in Brand. Bavar. Baruth. Austr. Salisb. Barb.

17. *Avena mollis*. Avoine molle. Weicher Hafer. *

Holcus mollis, glumis bifloris mediussculis, flosculo hermaphrodito mutico, masculo; arista geniculata. *Linn.* ed. *Reich.* 4. 308. ed. *Gil.* 4. 568. s. v. ed. *Pers.* 946.

- Avena* Haller. helv. n. 1485.
mollis. Hoffm. 57.
Aira mollis. Schreber. spic. p. 51.
Gramen caninum paniculatum molle. Tourn. 522.
Scheuchz. agr. p. 235. Rupp. jen.
p. 312. Raj. hist. 1285.
longius radicatum. C. Bauh. pin.
p. 1. Lob. adv. p. 467.
miliaceum, aristatum, molle. Raj. syn. 3.
p. 404.
paniculatum molle, radice graminis canini
repente. Mor. h. 3. p. 202.
Lamarck. 1195. 2. Poll. 2. 655. Goitian. hort. 514.
flor. 130. Willden. pr. n. 139. Moench. m. 184. Panz.
12. 772. Curt. Lond. 5. 184. Timm. prodr. 669. Reyg.
gedan. 2. 152. Fl. d. Welt. 1. 134. Roth. 1. 428. 2. 541.
Schreber. Graes. 149. t. 20. f. 2. Ellw. Baruth. p. 21.
Nekker. gall. 415. Lestib. 231. Leyss. hal. 1004.
Schrank. 1. 313. Doerr. nass. p. 19. Leers. 221. t. 7.
f. 7. Wigg. prim. 72. Dietr. 3. 239. Delarbre. 101.
Oestr. fl. 1 56. Wibel. 120.

Tota planta ex viridi-glanca. Radix perennis,
mox solitaria, plerumque autem repens, articulata,
fibrosa, articulis et fibrillis tomentosis. Culmi interdum fasciculati, 1-3 pedales, basi plerumque geniculato-decumbentes, glabri, laeves, infra paniculam vero scabriusculi, maxima ex parte erecti, foliati, nodis oblongis angustioribus, pubescensibus, viridibus donati, inferne saepe ramosi. *Folia* 2-3 lineas lata, plana, *inferiora*, 2-4 pollices longa, *superiora* sensim breviora, sumnum vix pollicare, *omnia* villis brevissimis densis, vix conspicuis, fere sammetica, mollia. *Vaginae* pubescentes, laeves, valde striatae, summa subventricosa, laxa. *Ligulae* obtusae, crenulatae. *Panicula* 1-4 uncialis, ex albido-viridis, aetate flavescens, in anthesi patentior, antez

et postea vero magis contracta. *Pedunculi*, *Pedicelli*-
que alternatim gemini, raro solitarii, pauciori, lae-
viter villosi. *Spiculae inapertae* ex ovato - lanceo-
latae, compressiusculae, circiter sesquilineam longae,
plerumque omnes *polygamiae*. *Gluma calycina* bi-
flora; *valvulis* in anthesi patentibus, glabris, nervis
et carina ciliatis, *inaequalibus*, fere oppositis; *exterior*
breviore, angustiore, *nervo dorsali viridi*,
acuta, *albido-virente*, interdum basi violaceo, *interior*
longiore, latiore, *trinerviam*, *marginibus*
diaphanis *praeditam*, brevissime mucronatam *ante*
florescentiam amplexante. *Glumae corollacea*e *calycina* multo minores, enerviae, *viridiusculae*, *aetate*
albidae (*ciliatae dictae*, quod quidem nunquam ob-
servare potui). *Hermaphrodita inferior*, sessilis,
valvula exterior lateriore, paululum ventricosa;
interiore planiore, mutica, *aequalis* fere *longitudinis*: *Mascula superior*, *pedicellata*, *angustior*,
minor; *valvula exterior* *infra apicem Aristula* per lentem scabra, *dorsali*, *recta*, *dein geniculata*,
aetate curvato-reflexa, *aut* *gluma calycina longiore*,
aut *breviore donata*. *Filamenta* in utraque *gluma*
corollacea tria. *Antherae flavae*. *Ovarium* in her-
maphroditis subovatum. *Styli* patentibus plumosi.
Stigmata alba plumosa. *Rudimentum pistilli* in mas-
culis, *stylis* brevissimis villosis castratis *praeditum*.
Squamulae in hermaphroditis 2, lanceolatae, ovario
longiores; in masculis exiguae. *Semen parvum ova-*
tum acutum.

Var. I. *Gluma calycina*, una alterave trival-
vi, et triflora. *Gluma corollacea*
infima mascula, duabus superiori-
bus hermaphroditis *pedicello* op-
posito adfixis, quarum *altera*
arista *dorsali* *unica* *infra apicem*

armata, altera vero aristis 2 rectis terminata est. Roth.

2. Flosculo utroque hermaphrodito fertili. Roth.

3. Arista vix ulla (Maguntiacum).

Flor. Praer. — Fruct. Matur. Mess. — Vend.

β. Maj. — β. Sept. β Jun. — β. Oct.

Habit. in siccis, et humidis, sylvis, arenosis, pratis, sepibus, dumetis, ad margines agrorum et viarum, tot. fere *Gall.* et *Germ.* — In Depart. Montis Jovis prope Maguntiam in pratis Budenhemensibus: porro circa Lautern, Germersheim, Worms, Klingenmünster, Schoeneberg. — Quoque ad pedem Montis Feldberg prope Koenigstein.

18. **Avena lanata.** Avoine laineuse. Wolliger Hafer. *

Holcus lanatus glumis billoris, villosis hermaphrodito mutico, masculo arista recurva. Linn. ed. Reich. 4. 308. ed. Gil. 4. 569. s. v. ed. Pers. 946.

Avena lanata: Hoffm. 58.

diantha, floribus ovatis, perfecto mutico, imperfecto aristato. Hall. helv. n. 1484.

Aira flosculo masculo aristato, semineo, mutico. Hort. cliff. 27. Roy. lugdb. 66.

foliis pubescentibus, panicula contracta, flosculo hermaphrodito mutico, masculo arista uncinata calyce breviore. Fl. suec. 67. it. oll. 122. Berg. frc. p. 321. Boehm. lips. n. 616.

flore masculino aristato, femineo mutico. Sauv. 309. Zinn. goett. 64.

Gramen pratense paniculatum molle. C. Bauh. p. p. 2. prodr. p. 3. theatr. 27. Tourn. 522. Scheuchz. agr. p. 234. Mapp.

134. Magn. bot. 112. hort. 90. Volck. nor. p. 198. Dill. giess. p. 79. Loes. pruss. ic. 25. Rupp. jen. p. 312. Hoppe. ger. p. 167.

lanatum: Dalechamp. h. 425.

Dalechampii J. Bauh. h. 2. p. 466.

Lamarck. 1195. 3. Goian. hort. 575. fl. 130. Schreb. Graes. I. 145. t. 20. f. 1. Curt. Lond. t. 228. Willden. prodr. n. 140. Reyg. gedan. I. 239. Wigg. prim. p. 72. Lestib. 231. Tamm. pr. n. 670. Nekker. 414. Roth. I. 429. 3. 542. Fl. d. Wett. I. 135. Reich. frc. 2. 112. Weig. pom. n. 643. Leers. 221. t. 7. f. 6. Scholl. barb. n. 804. Scop. 2. 275. Jacq. vind. p. 176. Schrank. I. 312. Gmel. tub. p. 313. Doerr. nass. n. 19. Wilke. gryph. 531. Murr. prodr. p. 79. Matuschka. 2. 453. Ellw. baruth. p. 21. Panz. 12. 774. Leyss. hal. n. 1005. Moench. meth. 184. Delarbre. 100. Oestr. fl. I. 56. Wibel. w. 120.

Verisimiliter hæc *lanata*, et antecedens *mollis* aut progenies classificæ, aut varietates unius speciei sunt. *Lanatus* differt a *mollis*, cui valde similis, frequentior vero est:

Radice densiore, et fibrosoire: *Vaginis* praecipue inferioribus villosioribus: *Ligula* integerima obtusa: *Panicula* speciosiore, saepe 4 - 6 pollicari, pluriflora, ex albido et pallide roseo-variegata, raro viridi aut flavescente: *spiculis* (polygamicis) circiter 2 lineas longis, ciliatis, carina et nervis, interdum pubescentibus; inferioribus non raro sterilibus, emarginatis: *Gluma* corollacea hermaphrodita (per lentem) carina dorsali ciliata. *Arista* masculae minime aetate recurva, sed aetate antrorsum curvata, et armato oculo glabra: *squamulis* paululum brevioribus.

Var. vivipara.

Flor. Matur. et Hab. cum priore; in nostro Depart. prope Moguntiacum in pratis et munimentis abun-

abitnde, quoque circa Durckheim, Alzey, Heidesheim.

19. Avena elatior. Avoine élevée. (Fromental.) Hoher Hafer. *

Holcus avenaceus; glumis bifloris, arista florae masculi dorsali refracta. Wigg. prim.

p. 72. Roth. I. p. 429. 3. 544. Scopol. 2. 277. Moench. meth. 184.

Flor. d. Wett. I. 136. Oestr. fl. I. 55.

Avena elatior, paniculata, calycibus bifloris, flosculo hermaphrodito submutico, masculo aristato. Linn. ed. Reich. I. 221. ed. Gil. 3. 106. s. veg. ed. Pers. 125. Fl. sv. 98. 102. Berg. fr. p. 325.

Lamarck. 1182. 6. Goitian. h. 53. flor. 129. Curt. lond. 3. n. 32. Schreb. graes. 25. t. I. Poll. I. 122. Oeder. t. 165. Gesn. ic. cent. 152. Willden prod. n. 176. Boehm. lips. n. 627. Jacq. vind. p. 18. Timm. prodr. n. 657. Scholl. barb. n. 90. Schrank. I. 374. Gmelin. tub. p. 29. Leers. 40. t. 10. f. 4. Doerr. nass. p. 5. Dietr. I. 114. Leyss. hal. n. 117. Lestib. 226. Moench. hass. n. 91. Hoffm. 57. Ellw. baruth. p. 7. Murr. prodr. p. 42. Delarbre. 32. Wibel. w. 120. Krock. I. 185.

Avena diantha folliculis basi villosis, majori arista geniculata. Hall. helv. 1492.

calycibus bifloris, panicula laxa spicata, pendunculis prioribus fasciculatis. Zinn. goett. p. 69. Guettard. obs. I. p. 182. panicula nutante, calycibus bifloris, altero flosculo aristato. Roy. prodr. p. 66. Sauv. 38.

Gramén avenaceum, gemmea radice sive nodosa, minus. Moris. hist. 3. p. 214. s. 8. t. 7. f. 38.

panicula acerosa, semine pappo-
so. Raj. angl. p. 58. Dill. giess.
p. 93. app. p. 48.
elatius juba longa splendente.
Raj. meth. 179. Moris. h. 3. p.
214. s. 8. t. 7. f. 34. Scheuchz. agr.
p. 239. Rupp. jen. p. 317. Hopp.
ger. p. 381. Vaill. 89.
nodosum, *avenacea panicula, radice tuberi-*
bus praedita. C. Bauh. pin. p. 2.
prodr. p. 2. theatr. p. 18. Tourn.
525. Mapp. 138. Buxb. hal. p.
142. Raj. hist. 1284. Engl. l. c.
Vaill. par. p. 89. Scheuchz. agr.
p. 237. t. 4. f. 27. 28. Hall. goett.
p. 48. Rupp. jen. p. 318.
bulbosum nodosum. J. Bauh. h. 2. p. 456.
 Lob. ic. 23.

non nodosum. Mont. prodr. p. 53.

Radix perennis, stolonifera, fibrosa. *Culmus*
3-5 pédalis, erectus, teres, laevis, glaber, nódis
plerumque 4, interdum vero 5 - 6, glavescentibus,
rarius purpurascenscentibus, inferioribus approxima-
tis. *Folia plana, 3 - 4 lineas lata, 2 - 10 pollices*
longa, plerumque glabra, interdum villosa, striata,
utrinque scabra. *Ligulae breves, truncatae, inte-*
grae aut incisae. *Vaginae striatae, laeves, glabrae,*
inferiores non raro subvillosae, laxae. *Panicula*
6-15 pollices longa, primo coarctata, acuta nitida,
florens patula, laxa subnudans. *Pedunculi ramosi*
6 - 8 in semiverticilos alternos congesti, ad basin
saepe coaliti, tenues et secundum Roth interdum
bractea acuta brevi involucrati (annulum circularem,
rudimentum nempe nodi, in hoc loco, et rhachim
paululum flexam, vidi). *Pedicelli tenues, flexuosi.*
Spiculae juniores lanceolatae, subcompressae, 4 li-

neas longae, lineam latae, aut ex viridi-flavescentes, aut ex viridi-griseae, aut violaceae, erectae, polygamicae. *Gluma calycina* biflora; *valvula* inaequilibus pellucidis, mucronatis, laevibus; *exterior* longitudine dimidia spiculae; *interiore* duplo fere longiore. *Glumae corollaceae* subaequales, calycina vix majores, basi pilosae, circiter 7 nerviae, coloratae; *valvula* *exteriore* lanceolata, acuta, carina ciliata, raro crenata, *interiore* fere linearis, nervosa, venosa, margine ciliato. *Gluma cor: mascula* et *hermaphrodita* fere oppositae, illa autem sessilis et paululum inferior, haec subpedicellata, pedicello piloso, indeque superior. *Arista* supra basin dorso *valvulae* *exterioris* *glumae corollaceae* masculae inserta, tortilis, interdum colorata, spicula duplo longior, geniculata. *Squamulae glum: cor: masculae* 2, exiguae; *hermaphroditae* lanceolato-lineares, acuminatae, oyario longiores. *Ovarium* in masculis minimum, abortiens: in hermaphroditis obovatum, apice villosa. *Styli* toti villosi. *Filamenta* in utraque *gluma corollacea* 3. *Antherae* violaceae. *Semen* sulcatum, acutum.

- Var. I.* *Gluma corollacea* utraque inermi.
 2. *Radicis* fibris nodosis, tuberibus rotundis, albis, utrinque compressis, sibi incumbentibus.
 3. *Arista* in utraque spicula, eaque longior.
 4. — — — — —, in hermaphrodita corolla vero recta, brevi, et paululum infra apicem inserta.
 5. *Foliis* et *vaginis* plus minusve villosis.
 6. *Glumis corollaceis* pilis longioribus obvallatis.
 7. *Nodis* pilosis.

308 FIBICHIA. (ad Tab. XXVIII.)

Flor. Flor. — Vendem. Matur. Mess. — Bram.
β. Apr. — β. Oct. β. Jun. — β. Nov.
Habit. in pratis, pomariis, vineis; maritimis,
ad margines agrorum tot. fere *Gall.* et *German.* —
In Depart. Montis Jovis circa Maguntiacum in mu-
nimentis et pratis; porro circa Lautera, Werstadt,
Alzey, Oppenheim, Steinbach.

AD TAB. XXVIII.

XXVII. Fibichia. Fibiche. Fibichie.
(Panicum, Linn. Gram. Tourn. Digitaria,
Haller.)

In memoriam meritissimi Fibich, antecessoris
mei. In systemate artificiali neque ad Panicum, ne-
que ad Digitarium pertinet, ab utroque nominato ge-
nere quoad inflorescentiam praecipue vero structu-
ram spicularum differt; habitu vero iis simi-
lis est. *Involuci* pilosi rudimentum. *Spiculae* com-
pressae, in duobus lateribus planiusculae. *Gluma*
calycina, bivalvis, uniflora, *valvulis* compressis,
navicularibus, acutis, glumae corollaceae angulis
oppositis applicatis (minime lateribus), inaequalibus,
glumam corollaceam haud includentibus; altera ma-
jore, angustiore, superiore. *Gluma* *corollacea* bi-
valvis, *valvulis* compressis, navicularibus, carina-
tis, acutiusculis, altera margine rectiore, altera
margine magis curvato, latiore; aetate connatis, in-
natis semen includentibus. Cetera uti in Digitaria
et Panico.

Spicae plures umbellatae. *Spiculae* solitariae
sessiles.

Fibichia umbellata. Fibiche ombellée. Dol-
dénförmige Fibiche. *

Panicum Dactylon, spicis digitatis patentibus, basi
interiore villosis, floribus solitariis, sarmentis repentibus.
Linn. ed. Reich. I. 157. ed. Gil. 3. 69. s. veg. ed. Pers. 108. Lamarck. 1175. 8. Roth. I. 28. 2. 74. Goüan. hort. 35. flor. 115. Nekker. p. 33. Fl. d. Wetter. I. 8c. Dicks. h. s. 111. v. With. 2. t. 21. Hoffm. 31. Jacq. vind. p. 11. Schrank. I. 317. Poll. 1. 58. Dietr. I. 87. Lestib. 218. Delarbre. 146. Oestr. fl. I. 50. Krock. I. 92. Wibel. w. 128.

Ischaemum foliis rigidis spicis glabris. Sauv. 34.
Digitaria stolonibus teretibus, foliis patulis glabris,
spicis digitatis. Hall. helv. n. 1527.

Dactylon. Scop. I. 53.

Gramen crucis; seu cruciatum tetradactylon. Barr.
ic. 753. n. I.

Dactylon folio arundinaceo (majus et minus)
germanicum, aculeatum, forte
Plinii. C. Bauh. p. p. 7. théatr.
112. Zannichell. ven. p. 166. t.
192. n. 2. Moris. hist. 3. s. 8. t. 3.
f. 4. radice repente, sive officinarum.
Tourn. 520. Mapp. 132. Scheuchz.
agr. p. 104. t. 2. f. 11. Mont. ic.
99. Rupp. jen. p. 308.
repens cum paniculis graminis Mannae. J.
Bauh. hist. 2. p. 755.

legitimum. Clus. hist. 2. p. 217. Magnol. bot. III. hort. 90.

Radix (aut melius *culmus subterraneus*) perennis, longe lateque per terram et aquam repens, horizontalis, ramis perpendicularibus instructa, stolonifera, crassa, articulata, internodiis angulatis, squamis (vaginis) non raro foliolis instructis tecta, ad nodos fibras perpendicularares emittens. *Culmi* (*Rami*) decumbentes, alterni, florentes erecti, aut geniculata-erecti, ad basin saepe ramosi, digitales-pedales, glauco-virides, nodis 4 - 9 viridibus aut purpurascientibus praediti, infra paniculam non raro villosiusculi, ceterum glabri, obscure tetragonii, lateribus sulcati, inferne compressiores. *Folia* carinata, erecto-patentia, utrinque valde hirsuta, scabriuscula, laete aut glauco-viridia, rigidiuscula, acuminata, juniora complicato-compressa, 1-4 pollices longa, 1-2 lineas lata, *summum* brevissimum. *Vaginae* laxae, inferiores villosae, *summa* longissima non raro glabra, omnes laeves, ad apicem utrinque macula exigua triangulari fusca aut flava notatae. *Ligulae* loco margo elevatus, villosus. *Spicae* umbellatae, terminales, 3-7, quarum una interdum intermedia et semper erecta manet, alterae in juventute erectae, aetate extrorsum curvatae, demum horizontales, omnes ad basin villosiusculae, lineares, unilaterales, triquetrae, 6 lineas — 2 pollices longae, lineam latae, glauco- aut ex purpureo virides, aetate stramineae. *Rhachis* triquetra, angulo acutiusculo dorsali, glabra, scabriuscula, subflexuosa, non raro apice brevi quasi aristata. *Spiculae* nitidae, ovatae, acutiusculae, compressiusculae, lateri plano excavato et exteriori rhacheos adfixae, ad singulum denticulum solitariae, alternae, imbricatae, juniores et matuuae adpressoae, florentes patentiores, lineam anam longae, dimidiata latae, purpurascentes, aut

glaucō-virides; glabrae, lineam dimidiā a se in-
vīcēm distantes. *Gluma calycina viridis*; *valvulae*
lanceolatis, acutis; *majore* longitudine glumae co-
rollaceae rectiore; *minore* inferiore, paulūtū bre-
viore. *Gluma corollacea valvulata florentibus* vix
apertis; *majore* ovata, acutitūcula; *minore* angusti-
ore, acuta, parum breviore. *Antherae* purpureae.
Styli et *Stigmata* violacea.

Flor. Praer. — Vend. — *Matur.* Fruet. — Brum.
— Mai. — Oct. — Aug. — Nov.
Habit. in siccis et aquosis, arenosis, vineis,
agrīs, sylvis, pascuis, ad vias, muros, paludes,
tot. fere Gall. — in Départ. Montis Jovis, circa
Dirckheim; Frankenthal; Freinsheim; Worms;
Maguntiam, ad paludem (Birch), in monte Harten-
berg ad viam versus Gonzenheim, in pratis inter
Laubenheim et Nackenheim. — *Germ.* in Saxōn.
Austr. Siles. Bavar. Dārmst. Carniol. Wetterau.

AD TAB. XXIX.

XXVIII. Nardus. Nard. Borstengras.
(Gramen Tourn.).

Linn. ed. Gil. 2. 18. Vent. 2. III. Lam. t. 39.
Cayanielles Jc. et Descr. plant. quae sp. in Hisp. cr.
etc. t. 204. Moencli. meth. 294.

Perigynandum unicum, glumaceum, bivalve,
uniflorum, sessile. *Valvulae* inaequales: *exterior*
lanceolato-linearis, carinata, longa, mucronata,
basi et ventre interiore amplectens: *interior* minor,
angustior, linearis acuminata. *Filamenta* tria, ca-
pillaria, glumis breviora, infra ovarium inserta.
Antheras oblongae, versatiles. *Ovarium* oblongum.
Stylus unicus, pubescens, filiformis, longus. *Stig-*

ma simplex. *Perigynandum* semini adnatum non dehiscens. *Semen unicum*, rectum linearis-oblongum, utrinque acuminatum, superne angustius. *Flores spicati.* *Spica simplex*, linearis aut unilateralis. *Folia linearia.*

I. *Nardus stricta.* Nard serré. Steifes Borstengras.

Nardus stricta, spica setacea, recta, secunda. Linn. ed. Gil. 3. p. 62. ed. Reich. I. 144.

Flor. suec. 47. 52. s.v. ed. Pers. 104. spica linearis. Flor. lapp. 40. Hort. cl. 42. foliis capillaceis spica angustissima, recta, locustis aristatis, uno verso dispositis. Gleditsch ap. Boehm. lips. 598.

Spartum parvum Lobel. J. Bauh. hist. 2. p. 513. nostras parvum. Lobel. ic. 90.

Gramen spartium juncifolium. C. Bauh. p. p. 5. Raj. hist. 2. p. 1260. Syn. 3. p. 393. 4. p. 35. Dill. giess. p. 86. Rupp. jen. 307. Scheuchz. agr. 90. t. 2. f. 10.

hollandicum, capillaceo folio, et minus. C. Bauh. p. 5. prodr. II. Moris. hist. 3. p. 21. §. 8, t. 7 f. 8. basiliense, capillaceo folio majus. C. Bauh. pr. 29. pin. 69. no minus seu hollandicum. J. Bauh. hist. 2. p. 513.

loliaceum, minimum, foliis juncis, panicula unam partem spectante. Tourn. 517. Monti. p. 43. ic. 31.

spicatum, spartum spica sericea ex utriculo propendente. Rupp. jen. 307. vid. Roth. 3. 564.

Timm. prodrom. n. 612. Lamarck. 1165. r. Dalib.

par. 18. Gerard. gallop. p. 74. Vaill. par. p. 82. Seguier. veron. 3. p. 150. Nonne erf. p. 272. Plan. erf. p. 50. Oeder. t. 1022. Jacq. vind. p. 10. Poll. t. 49. Leers. II. t. 1. f. 7. Engl. bot. 291. Hall. goett. p. 41. helv. n. 1410. Fl. d. Wetter. 72. Oestr. fl. I. 41. Berg. fr. 316. Le- stib. 213. Hoffm. 27. et icon. Vibel. w. 102. Roth. I. p. 25, 2. p. 65. Panzer. Lin. 12. 165. Willd. pr. n. 118. Krocker. I. 78. Schreb. Gr. 65. t. 7. Reich. 166. Wigg. prim. p. 5. Nekker. gall. p. 29. Dietr. I. p. 78. Leyss. hall. n. 50. Matuschk. sil. I. n. 42. Moench. hass. n. 42. meth. 294. Zinn. goett. p. 59. Schrank. I. p. 272. Scholl. barb. n. 46. Weig. pom. n. 37. Scopol. I. p. 49. Moench. meth. p. 294. Delarbree. 138.

Radix perennis, subrepens, fibrosa, densa, squamis vaginantibus tecta, plures caules producens. *Culni* densissimi subangulati, erecti, interdum vero decumbentes, filiformes, subpubescentes, retrorsum scabriusculi, superne et maxima ex parte nudi, ad basin geniculati, nodo 1-3 donati, ex glauco-virides aut rubellis, palmates — sesquipedales. *Folia radicalia* fasciculata, caespitosa, setacea, striata, pubescentia, superne canaliculata, retrorsum scabriuscula; cum culmeis inferioribus per lentem striata, vaginantia. *Vaginae* striatae, glabrae, ex glauco-aut albido-virides aut rubellae, membranaceae, inferiores plerumque aphyllae: *summum folium* non vaginans sed basi tubulosum. *Ligula* prominula, obovata, tenuis, alba, brevis, subdentata. *Spica* recta, angusta, subulata, teres atque contracta, sesquiuncialis — ad tres pollices longa, florens secunda: *spiculis* distichis, per paria magis approximatis, angustis, membranula minima albida ad basin auctis, triquetris alternis, lanceolatis, rhachi adpressis donata. *Glumae* plerumque violaceae, pubescentes subaristatae, aristis debilibus. *Rhachis* hinc convexa inde excavata, marginibus alterna-

tim dentatis, scabris, in apice spicae nuda, mucronata.

Flor. Flor. — Therm. Matur. Mess. — Fruct. 15. Apr. — 15. Aug. 6. Jun. — 6. Sept.

Habit. in locis siccis, humidiusculis, arenosis, asperis, sylvis, aggeribus, montosis, pratis, ad vias tot. fere *Gall.* et *Germ.* In Depart. Montis Jovis prope Lautern, Bingen. — in Depart. Rheni et Mosellae prope Stromberg, Simmern, Kirchberg, Aegenthal, et in sylva Sohnwald. —

§. *Nardus aristata*. Nard courbé. Gékrümmtes Borstengras. ***

Nardus aristata, calycibus aristatis. Linn. ed. Gil. 3. 63. ed. Reich. I. 145. S. v. ed. Pers. 104.

incurva, spica incurva aequali, calycibus gluma exteriore aristato-acuminata,

Horibus distantibus alternis. Goian.

monsp. 33. flor. 114. spica subulata, articulata, incurva, tereti-

disticha. Ger. proy. 73.

disticha. Roy. lugdb. 18.

Aegilops incurvata. Linn. ed. R. 4. p. 317. ed. Gil. p. 570.

Agrostis incurvata. Scooli I. p. 62. ?

Rottboellia incurvata, spica tereti subulata; gluma calycina subulata adpressa bipartita. Oestr. H. I. 58.

Gramen loliaceum maritimum spicis articulatis.

Tourn. 97.

spicis articulosis erectis.

Scheuchz. agr. 93.

myuros erectum minimum arundinaceum.

Bocc. mus. 70. t. 59. 1.

exile arundinaceum minimum acumine reflexo. Boccon. mus. 2. p. 74. t. 57.
Scheuchz. agr. 41. t. I. f. 7. k.
junceum nodosum minimum capillare. Barr. rar. 106. t. 117. f. I. Lamarck. 165. 2.
sparteum monspeliacum, s. capillaceofolium minimum. Magn. bot. 119. hort. 92.

Radix perennis, plures culmos emittens. Culmi 6 pollices — 2 pedes longi, inferne decumbentes, dein ascendentibus, versus basin ramosi, foliatis, valde fragiles, articulati. Folia plana, angusta, radicalia longa, caespitosa, densa; culmea 1-2 pollices longa. Spica linearis, articulata, ex albido viridis, apice incurvo, angusta. Spiculae alternae, rhachi adpressae. Glumae valvula exterior acuminato-aristata.

Flor. Floreal. — Messid. — β. Maj. — β. Jun.

Habit. in locis aridis, arenosis, paludosis. — Gall. meridion. Germ. in Austr. littorali.

3. Nardus gangitis. Nard recourbé. Zurückgekrümmtes Borstengras.

Nardus gangitis spica recurva. Linn. ed. Gil. 3. p. 62. ed. Reich. 1. p. 144. S. v. ed. Pers. 104.
spuria narbonensis. C. Bauh. pin. 13.
gangitis spuria narbonensis. Lob. ic. 84. Morison. hist. 3. p. 257. s. 8. t. 13. f. ult. Raj. hist. 1911.

Planta obscura, an N. aristatae varietas? spica recurva.

Habit. in Gall. meridion.

AD TAB. XXX.

XXIX. Hordeum. Orge. Gerste.

Tourn. 295. Linn. ed. Gil. 2. 27. Venten. 2. 106.
Lam. t. 49. Gärtn. 2. 10. t. 81. Moench. n. 197.

Glumae calycinae bivalves, in quovis rhacheos gradu tres (raro 2.) *involucrum* hexaphyllum (raro tetraphyllum) mentientes. *Valvulae calycinae* nempe ad quemvis gradum rhacheos 6, per paria basi connata, congestae, raro solitariae, ante glumas tres corollaceas positae, lineares, acuminatae aut subaristatae. *Setae* tres, raro 2, inter spiculas et rhachim, solitariae, lateri interiori spicularum adpressae. *Glumae corollaceae* terneae, raro binae, bivalves, *valvulis* oppositis; *exteriore* ventricosa, angulata, ovato-acuminata, *calycinis* longiore, in *aristam* longam desinente: *interiore* lanceolata, plana, minore. — In quibusdam speciebus et varietatibus *spiculae* omnes hermaphroditae reperiuntur, in nonnullis *spicae polygamiae* occurunt. — In *spiculis hermaphroditis*: *squamulae* 2 ex ovali-acuminatae, ciliatae. *Filamenta tria*, capillaria, gluma corollacea breviora. *Antherae oblongae*. *Ovarium* ovato-obtusum: *styli* et *stigmata* 2, villosa, reflexa. *Glumae corollaceae* plerumque semini adnata non dehiscens: *semen* oblongum, ventricosum, angulatum, utrinque acuminatum, uno latere sulcatum. — In *polygamia spiculae* intermediae hermaphroditae sunt et sessiles, laterales vero *masculae* et breviter pedicellatae, *staminibus* instructae, *Pistillique* rudimento tantum praeditae.

Spica (aut in sensu strictissimo *Panicula spiciformis*) aut disticha, aut hexasticha, aut quadrangularis vel compressa, *spiculis* intermedii sessilibus, *lateralibus* pedicellatis.

1. *Hordeum vulgare*. Orge ordinaire. (Epaute. Escourgeon). Gemeine Gerste. *

Hordeum vulgare, *flosculis omnibus hermaphroditis*, *aristatis*, *ordinibus duobus* *erectoribus*. Linn. ed. Reich. I. 235. ed. Gil. 3. 118. S. veg. ed. Pers. 130. Lamarck. 1188. 5. Mill. dict. I. Goian. hort. 58. fl. 129. Flor. der Wetter. 157. Moench. meth. 197. Delarb. fl. 101. Kerner. t. 428. Schrank. I. 385. Martens. 28. Lestib. 229. Oestr. Hor. I. 66.

flosculis omnibus hermaphroditis, *seminibus corticatis*. Hort. cliff. 24. ups. 22. Mat. med. 47. Roy. lugdb. 69. Blackw. t. 423.

spica subdisticha, *calyce folioso setaceo*, *floribus omnibus hermaphroditis* *longe aristatis*. Hall. helv. n. 1533.

(*polystichon*) *flosculis omnibus fertilibus*, *ordinibus indistinctis*. Hall. in nov. Comm. goett. 6. p. 5. t. 2.

polystichum vernum. C. Bauh. theatr. p. 439. pin. p. 22. Moris. h. 3. s. 8. t. 6. f. I.

coeleste flosculis omnibus hermaphroditis *seminibus decorticatis*. Hort. lips. 23.

nudum gymnochiton. J. Bauh. hist. 2. p. 430. Zeocriton vel Tritico - speltum. C. Bauh. theatr. 423.

Radix annua, *fibrosa*. *Culmi 2-3 pedales*, *glabri*, *teretes*, *laeves*, *erecti*, *striati*, *vaginis usque ad spicam saepe tecti*, *nodis viridibus aut purpureis* 3-4, *instructi*. *Folia 6 pollices* — *pedem et ultra*

longa, 3-6 lineas lata, glabra, scabra, striata, nervo albido dorsali praedita, mucronata, ad basim utrinque auriculis falciformibus, amplexicantibus aucta. *Vaginae* nervosae, glabrae, laeves, uti folia læte virides. *Ligulae* brevissimae, integrae, obtusissimae. *Spica* cum aristis, palmaris, pedalis, ex tereti compressa, disticha, seriebus spicularum oppositis 2 majoribus, et 4 minoribus, indeque obscure hexasticha. *Rhachis* flexuosa, compressa, internodiis parvis, alternatim uno latere convexioribus, altera excavatis, gradibus latioribus. *Spiculae* approximatae, erectae, sese partim tegentes. *Glumae calycinae* valvulis breviter aristatis. *Glumae corollaceae* in quovis gradu rhacheos ternae, omnes hermaphroditae, inferiores tamen sicuti serierum 4 lateralium minorum haud raro abortientes; *valvula* exteriore magna concava, lateribus amplexantibus, glabra, nonnunquam dorso ciliato, trinervia, nervo dorsali, et 2 marginalibus, in aristam decurrentibus. *Arista* scaberrima, 2-8 uncialis: praecipue autem *aristae* serierum 2 majorum et quidem spicularum inferiorum longae observantur: omnes compressae, marginalibus oppositis. *Valvula* interior corollacea lanceolato-obtusa, angustior, plana, mutica. *Antherae* flavae. *Stigmata* alba.

Var. coeleste. Glumis corollaceis maturis dehiscentibus. Seminibus sponte decorticatis.

Flor. Praer. — Mess. *Matur.* Mess. — *Fruct.*
β Maj. — β Jul. β Jun. — β Sept.

Habit. circa samum Russiae et (secund. Riedesel) circa Marzameni in Sicilia.

Colitur ubique in Gall. et Germ.

2. *Hordeum hexastichum*. Orge hexastique, ou d'hyver. Sechszeilige oder Wintergerste. ** 1621

Hordeum hexastichum flosculis omnibus hermaphroditis aristatis, semiinibus sexfariam positis. Linn. ed. Reich. I. 236. ed. Gil. 3. 118. S. veg. ed. Pers. 130. hort. ups. 23. Mill. dict. n. 6. Fl. d. Wetter. I. 159. Dietr. I. 127. Gaertn. 2. 10. t. 81. f. 3.

floribus omnibus hermaphroditis, spica sexfariam imbricata. Moench. meth. 198. Oestr. fl. I. 66.

pulchrum. J. Bauh. hist. 2. p. 129.

polystichum hibernum. C. Bauh. theatr. p. 439. Tourn. 513. Moris. hist. 3. s. 8. t. 6. f. 3.

spica polysticha, floribus omnibus hermaphroditis longe aristatis. Hall. helv. n. 1534.

floribus omnibus fertilibus, spica sexfariam sulcata. Hall. in nov.

Comm. goett. 6. p. 2.

vulgare. variet. Lamarck. 1185. 5. B.

Differt a vulgari, cuius verisimiliter varietas est: *Spica crassiore*, *torosiore*, *superne truncata*, *quasi quadrangulari*, *manifeste hexasticha*, *seriebus 6aequalibus*, *spiculis*, *exceptis imis*, *omnibus hermaphroditis*, *fertilibus*, *et aequaliter aristatis*, *aristis brevioribus*. *Gluma corollacea* matura nec dehiscens.

Flor. et matur. cum antecedente.

Habit. non raro in terra valde fertili inter vulgarem.
Colitur passim in *Gallia* et *Germania*.

3. *Hordeum distichum.* Orge distique. (Pamele.) Zweizeilige Gerste. *

Hordeum distichum, flosculis lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus imbricatis. Linn. ed. Reich. 1.236. ed. Gil. 3.118. s. veg. ed. Pers. 130. Mat. med. p. 47. Hort. ups. 23. Mill. dict. p. 3. Nekker. gall. p.73. Roiian. hort. p.58. fl. 130. Fl. d. Wett. 1.160. Moenck. m. 198. Delarbre fl. 101. Kerner t. 429. Schrank. 1. 385. Gärtn. 2. 10. t. 10. f. 1. Oestr. fl. 1.66. *nudum* flosculis lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus imbricatis, decorticatis. Linn. l. c. quod spica binas ordines habeat, Plinio. Tourn. 513. *distichum*. C. Bauh. theatr. p. 440. Magn. hort. 99. Lamarck. 1188. 6. Lestib. 229. *vulgare distichum*. Moris. hist. 3. s. 8. t. 6. f. 1. Hall. helv. n. 1535. *aestivum* spicis explanatis, flosculorum duobus ordinibus fertilibus, internodiis quaternis, sterilibus. Hall. in nov. Comm. goett. 6. p. 6. t. 3. ubi cum Zeocrit. conj. *Differt*

Differt a vulgari cuius verisimiliter progenies classifica est:

Spica magis compressa, disticha, superne pauculum latiore, seriebus spicularum 2 oppositis, intermediis, hermaphroditis, fertilibus, aristatis; 4 autem lateralibus masculis muticis; seminibus majoribus.

Var. 1. nudum; seminibus majoribus, sponte décorticatis.

2. ramosum; culmo altiore, crassiore, et inferne ramoso.

Flor. et matur. cum antecedentibus.

Colitur frequentius quam vulgaris in Gallia et Germ. circa Moguntiam et vicos propinquos frequenter.

Habit. ad Samaram, Tartariae fluvium.

4. Hordeum Zeocriton. Orge Zéocrite. (Riz rustique.) Reis- oder Bartgerste. **

Hordeum Zeocriton, flosculis lateralibus masculis muticis, seminibus angularibus patentibus corticatis. Linn. ed. Reich. I. 236. ed. Gil. 3. 119. s. veg. ed. Pers. 130. hort. ups. 23. n. 5. Schreber. Graes. 125. t. 17. Mill. dict. n. 2. Moench. m. 198.

distichum: var. Lamarck. 1188. 6. a.

Dietr. I. 129.

spica lata, compressa, breviore. Moris. 3. p. 206. s. 8. t. 6. f. 2.

breviore et latiore granis confertis. Tourn. 513. Raj. hist. 1243.

X

168

dictum Germanis Oryza. J. Bauh. hist. 2.
p. 429. Mont. prodr. 5.

Zeocriton s. Oryza germanica. C. Bauh. pin. p. 22.
theatr. 1121.

Differt a disticho:

*Culmo farina albida adsperso; Vagina infima
aphylla: spica breviore lanceolata, basi crassiore et
latiore, versus apicem sensim tenuiore et angustio-
re: aristis valvularum corollacearum exteriorum
(septinerviarum, glauco-viridium), longis, paten-
tioribus: seta (solitaria inter quamvis spiculam et
rhachim) intermedia pilosa, lateralibus glabris:
Valvula inteniore corollacea binervia apiceque emar-
ginato.*

Flor. et matur. cum antecedentibus.

Colitur in Gallia. Olim quoque in Germania.

5. Hordeum murinum. Orge des Murs. Mauergerste. *

Hordeum murinum. J. Bauh. hist. 2. 431.
flosculis lateralibus masculis
aristatis, involucris inter-
mediis ciliatis. Linn. ed.
Reich. 1. 237. ed. Gil. 3. 119.
s. vég. ed. Pers. 130. hort.
cl. 24. fl. suec. 107. 113.

flosculis lateralibus masculis
aristatis, dorso glabris,
involucris intermediis cilia-
tis. Roth. 1. 51. 2. 149.

spicis crassis, longe aristatis, calycinis
glumis aristatis. Haller.
helv. 1536.

Gramen hordeaceum minus et vulgare. C. Bauh. pin.
p. 9. Magn. bot. 121. hort. 92.

Scheuchz. agr. p. 14. Buxb. hal. p. 147. Volck. norimb. p. 196.
spontaneum spirium, Holcus Plinii anguil-larae. Lob. ic. 30. obs. p. 18.
spicatum vulgare secalinum. Tourn. 517. Mapp. 130. Rupp. jen. p. 306.
secalinum et *secale sylvestre*. Dill. giess. p. 103.
vulgatissimum viarum. Moris. hist. 3. p. 179.
t. 6. f. 4.

Herba phoenicea, nobis *Hordeum murinum*: Plin. Lib. 22. n. 65.

Lamarck. 1188. 3. Wigger. prim. p. 11. Berg. frc. p. 327. Curt. Lond. 5. n. 55. Flor. dan. t. 629. Roy. lugdb. 69. Wilke gryph. n. 70. Schöll. barb. n. 100. Willd. prodr. n. 195. Gmelin. tub. p. 33. Goett. hort. 58. fl. 130. Nonne. erf. p. 280. Plan. erf. p. 61. Zinn. goett. 71. Moench. hass. n. 164. meth. 198. Boehm. lips. n. 622. Scop. 2. 377. Leyss. hal. n. 125. Poll. 1. 133. Delarbre. fl. 101. Matuschk. 1. 77. Dietr. 1. 130. Murr. prodr. p. 33. Schrank. 1. 385. Doerr. nass. p. 20. Reich. 21. Weig. pom. n. 85. Lestib. 228. Oestr. fl. 1. 66. Krock. 1. 207. Vibel. w. 102.

Radix annua, fibrosa, pubescens. *Culmi* plenumque basi et ad nodos incurvi, erecti, fere toti vaginis tecti, teretes, glabri, digitales — 2 pedales, inferne nonnunquam ramosi, nodis 4-5 purpureis. *Folia* plana, patentia, laeviter pubescentia, mollia, ad basin auriculato-plicata, nervo albido-flavescente dorsali donata, mucronata, 3-5 pollicēs longa, 2-4 lineas lata, laete viridia, scabriuscula, nervo dorsali albido. *Vaginae* glabrae, striatae, inferiores hirsutae, summa spicam juniorēm tegens, inflato-ventricosa. *Ligulae* brevissimae, obtusae. *Spica* densa, lanceolata, subhexasticha, ex tereti compressiuscula, 2-3 pollicēs longa, 5-6 lineas lata. *Spiculae* in

quovis gradu rhacheos alternat^{im}ernae; *intermedia hermaphrodita*, fertilis, sessilis, laterales masculae pedicellatae, (saepe neutrae). *Glumae calycinae valvulis* fere setaceis et fere aequalibus, ad quamvis spiculam 2: certe *intermediis* pubescentibus et ciliatis, striatis, aristatis, 10-15 lineas longis, basi linea^e vix quadrantem latae, lateralibus pedicello spiculorum insidentibus, fere setaceis, subciliatis. *Setae solitariae*, ad latera interiora spicularum; *laterales minores*, adpressae. *Glumae corollaceae maturaæ non dehiscentes*; *valvula exteriore* dorso glabro: *spicularum intermediarum* ad basin latiore, *interiorum valvulam* ex magna parte amplexante, maxime ciliata, ex ovato-lanceolata, carinata, sulcato-striata, absque arista 4-5 lineas longa; *lateralium scabra*. *Aristae valvularum exteriorum corollacearum subtriquestræ*, latere interiori canaliculatae, 1-1½ pollicem longae, scabrae: *spicularum muscularum minores*. *Valvula interior corollacea angusta*, mucronata, præcipue spicularum lateralium. *Antheræ flavae*. *Stigmata alba*.

Flor. Praer. — Vend. *Matur.* Therm. — Brum.
β. Maj. — β. Oct. — β. Jul. — β. Nov.

Habit. in ruderatis, ad muros, vias, sepes tot. fere *Galliae* et *German.* in nostro Depart. et circa Moguntiam fere ubique.

6. Hordeum secalinum. Orge seiglin. Roggengerste. **

Hordeum secalinum. Lamarck. 1188. 4. Tabl. enc. n. 1155. Fl. d. Wetter. 1. 161. Lestib. 229.

flosculis lateralibus masculis aristatis; involucris setaceis scabris. Schreb. spic. p. 148. Leyss.

- hal. n. 126. Reich. frc.
2. 169. Hoffm. 64.
lateralibus masculis bre-
viter aristatis, invo-
lucris omnibus sca-
bris intermediis nu-
dis. Willd. prodr. n.
196.
lateralibus sterilibus fi-
liformibus aristatis,
dorso glabris, invo-
lucris setaceis sca-
bris. Roth. 1. 51. 2.
15. Oestr. fl. 166.
lateralibus masculis ari-
statis, calycum val-
vulis setaceis. var. &
Gmelin. sib. 1. p. 125.
murinum. var. Linn. l. c. Scholl. barb. l. c.
Zinn. goett. l. c.
spica disticha, folliculo brevi, glumis ca-
lycinis aristatis. Grimm. isen.
em. p. 121.
spicis distichis, folliculo brevi, glumis ca-
lycinis aristatis. Hall. helv.
n. 1538.
maritimum. Fl. dan. t. 630.
Gramen secalinum. Raj. syn. 3. p. 392. Buxb. hal. p. 147.
Rupp. jen. p. 306. Hall goett. p. 41.
spica secalina. C. Bauh. p. 9. prodr. p. 18.
spicatum secalinum, minus. Tourn. 518.
Schenchz. agr. p. 17. n 3. Murr.
130. Berg. frc. p. 327. Vaill. par. p.
83. t. 17. f. 6.
Radix perennis, fibrosa. Culmas gracilis, ere-
ctus, glaber, 1-2½ pedalis, nodis 3-4 purpureis in-

structus, (tenuior et altior, quam in *Murino*). *Folia* pauca, plana, 1-1 $\frac{1}{2}$ lineam lata, plerumque pilosa, mollia, striata, subtus scabra. *Vaginae* glabrae, striatae. *Ligulae* brevissimae, ciliatae. *Spica* 1-1 $\frac{1}{2}$ pollicem longa, tenera, compressiuscula, subdisticha (planior, gracilior, brevior, quam in *murino*). *Spiculae* ad quamvis rhacheos gradum ternae; *intermediae hermaphroditae* fertiles, sessiles; *laterales* pedicellatae *neutrae*. *Glumae calycinae valvulis* setaceis, fere aequalibus, scabris, (brevioribus quam in *murino*), omnibus glabris. *Setae* uti in *murino*. *Glumae corollaceae valvula* exteriore glabra, aristata, aristis haud pollicem longis, tenuissimis, scabris: *intermedia* majore, latiore, ex ovato-lanceolata: *lateralibus* tenuissimis, filiformibus, armato oculo pubescentibus.

Var. foliis glabris.

Flor. Praer. — *Therm.* Matur. Mess. — *Fructid.* β. Maj. — β. Aug. β. Jun. — β. Sept.

Habit. ad vias, sepes, in pratis siccis, locis incultis *Galliae* et *German.* — in nostra vicinitate, ad pedem des Höhegebirges?

7. Hordeum maritimum. Orge maritime. Meergerste. ***

Hordeum maritimum flosculis lateralibus spuriis aristatis, dorso hirsutissimis, involucris scabris. Roth. Beitr. 2. p. 97. Bot. Abh. und Beob. p. 12. n. 16. Flor. I. 51. 2. 150. Hoffm. 65. Moench. meth. 198. Vahl. symb. 2. p. 25.
geniculatum culmo decumbente, foliis obtecto, summo spathaceo spicae subjecto, supremo nudo in-

curvato. Allion. ped. n. 2274.

t. 91. f. 3.

Gramen spicatum secalinum maritimum minus.
Scheuchz. agr. p. 18.

Radix perennis (annua. Moench.) fibrosa. *Culmus palmaris* — 3 pedalis, nodis incurvis, inorassatis, teres, glabra. *Folia* plana, sicca convoluta, mucronata, supra laeviter striata, glauca, pubescens aut villosa et laevia, subitus et marginibus scabra. *Vaginae* striatae, inferiores praecipue hirsutae. *Ligulae* loco margo vix manifestus: *spica* 2-3 pollices longa, hexasticha, saepe purpurascens. *Spiculae* laterales plerumque abortientes, *intermediae* fertiles. *Gluma calycina* valvulis setaceis, scaberrimis. *Gluma corollacea* valvula exteriore spicularum lateralium lanceolata, dorso villosa, *intermediarum* dorso glabra.

Var. Spiculis viviparis.

Flor. Praer. — *Therm.* — *8. Maj.* — *8. Aug.*

Habit. in pratis, ad ripas. *Germ.* Brem. Jever.

8. Hordeum rigidum. Orge roide. Steife Gerste. ***

Hordeum rigidum flosculis lateralibus spuriis aristatis, involucri lateralis foliolo altero margine exteriore alato; Roth. Verzeich. I. 24. Hoffm. 65. marinum, flosculis lateralibus masculis aristatis, involucro interno florum lateralium semiovato. Huds. angl. ed. 2. p. 57.

Differt a maritimo praecipue:

Valvulis alteris calycinis spicularum lateralium semiovatis, *margine nempe exteriore membranaceo-* alato.

Flor. Praer. — *Therm.* — *β. Maj.* — *β. Aug.*
Habit. ad littora. — *Germ.* Oldenb.

AD TAB. XXXI.

XXX. Cuviera. Cuviere. Cuviere. (Elymus et Hordeum script.)

In Memoriam celeberrimi Zoologi parisiensis.

Differt ab Hordeo:

Spiculis plerumque 2 — (raro 3 rarissime 1) floris.

Ab Elymo:

Glumis calycinis involucra hexaphylla mentientibus.

Cuviera europaea. Cuviere européenne. Eu- ropäische Cuviere **

Elymus europaeus spica erecta, spiculis bifloris in-
volucro aequalibus. Linn. ed.
 Reich. I. 233. ed. Gil. 3: 116. s.
 vég. ed. Pers. 129. Manti 35. Roth.
 I. 52. 2. 152. Hoffm. 65. Weber.
 spic. p. 5. Delarb. fl. 77. Wigg.
 prim. p. 11. Haenk. bot. Beob. p.
 47. Willden. prodr. n. 191. Krock.
 I. 206.

Hordeum europaeum. Allion. pedem. 2. 260.

sylvaticum. Hudson.

cylindricum. Murray. prodr. 43. Fl. d.
 Wetter. I. 161. Moench. meth.
 198. Honkenü syn. pl. germ. I.
 n. 456.

montanum. Schrank. I. 386.

spicis rigidis cylindricis, calycinis glumis
aristatis. Hall. helv. n. 1537.
 Reich. frc. 21. 2. 169.

flosculis lateralibus imperfectis mere aristatis. Zinn. goett. p. 71.

Gramen secalinum altissimum, spica brevi, aristatis exstantibus. Dill. giess. p. 129.
majus sylvaticum. Rupp. jen. p. 306.

hordeaceum montanum, spica strigosoire, brevius aristata. Scheuchz. agr. p. 16. prodr. t. I. f. 1. app. t. I. f. 1. Hall. goett. p. 42.

montanum sive majus. C. Bauh. pin. p. 9. theatr. 135. Raj. angl. 3. p. 393. hist. 1258.

Radix perennis, superne squamis tecta, fibrosa. *Culmus erectus*, 2 - 2½ pedalis, rigidus, striatus, scabriusculus. *Folia plana*, striata, praelonga, 3-5 lineas lata, scabra, glabra, aut pubescentia. *Vaginae* siriatae, scabrae, aut pubescentes. *Ligulae* breves. *Spica cylindrica erecta*, rigida, 2-3 uncialis, multo macilentior et nudior quam in *Hordeo murino*. *Spiculae ternae* omnes hermaphroditae, *ordinum intermediorum* maiores, et longiores, quam in *nominato Hordeo*; *laterales* pedicellatae. *Glumae calycinae valvulis* scabris, per paria basi connata congestis; *aristis* scabris brevibus, versus basin compianatis, instructis. *Glumae corollaceae* in quavis spicula 2; *valvula exteriore* aristata; *arista in intermediis* unciali, in *lateralibus* breviore.

Var. 1. Spiculis omnibus fertilibus.

2. — lateralibus abortientibus.

3. — 3 floris.

4. — 1 floris.

Flor. Mess. — *Fruct.* Matur. *Fruct.* — *Vend.*

β. Jun. — β. Sept. β. Aug. — β. Oct.

Habit. in sylvis, pascuis, pratis, ad vias: *Gall.* — in Depart. du Cantal, de l'Allier, de la

Crenze etc. Germ. in Hols. Brand. Hannov. Austr. Siles. Hass. Saxon. Bavar. ad pedem tractus montium Höhegebirge.

AD TAB. XXXII.

XXXI. Elymus. Elyme. Haargras. (Gramen. Tourn.)

Linn. ed. Gil. 2. 26. Venten. 2. 105. Lam. t. 49.
Flor. dan. t. 847.

Spiculae ad quemvis gradum rhacheos plerumque geminae, ternae et plures, sessiles, aut sessiles et pedicellatae. *Gluma calycina* bivalvis, *valvulis* fere aequalibus, oppositis, subulatis, carinato-compressis, angustis, aut muticis aut aristatis. *Glumae corollaceae* in singulis spiculis 2-4; *inferiores* hermaphroditae, *superiores* masculae; *valvula exteriore* maiore, aut acuminata, aut aristata, aut mutica: *interiore* plana. *Squamulae* 2 lanceolatae. *Filamenta* 3, capillaria brevissima. *Antherae* oblongae, basi bisidae. *Ovarium* cordato-obtusum. *Styli* 2, divaricati, pilosi, reflexi. *Gluma corollacea* semen involvens. *Semen* unicum, lineare, hinc convexum. *Spica* aut *panicula* spiciformis contracta.

i. Elymus arenarius. Elyme des sables. Sand-Haargras.

Elymus arenarius, spica erecta arcta, calycibus tomentosis, flosculo longioribus. Linn. ed. Reich. 1. 231. ed. Gil. 3. 116. s. veg. ed. Pers. 129. foliis mucronato-pungentibus. It. scan. 336. Goüan. h. 56. flor. 127.

Triticum radice perenni, spiculis binis lanuginosis.
Gmelin. sib. p. 119. t. 25.
foliis acuminatis pungentibus. Roy. lugd.
71. Sauv. 39.

Secale spiculis geminatis. Flor. suec. 106. III. Sauv.
311.

Hordeum villosum. Moench. meth. 199.
Gramen caninum maritimum spica triticea, nostras.
Scheuchz. agr. p. 6. Raj. hist.
1256. syn. 3. p. 390.

loliaceum radice repente maritimum. Tourn.
516.
maritimum, spica magis albican-
te. Mont. prodr. p. 41.
maritimum, vulgato canino simile. Lob.
illustri, p. 24.

Lamarck. 1187. Roth. 1. 52. 2. 152. Viborg.
 Strand - Gew. p. 2. Wilke. gryph. n. 69. Hofm. 65.
 Lestib. 228. Wigg. prim. p. 11. Dietrich. 1. 126.
 Gort. ingr. 19. Hopp. herb. cent. 2. 14. Weig. pom.
 p. 84. Schreber. Graes. 2. 85. t. 40. Timm. prodr.
 n. 666.

Tota *Planta* albido - viridis, et farina tenui ad-
 spersa. *Radix* perennis, repens, articulata, squa-
 mis tecta, albida, fibrosa. *Culmi* 2-4 pedales, erecti,
 teretes, laeves, duri, vaginis tecti, inferne saepe
 ramosi, nodis 4-6 instructi. *Folia* 1-2 pedalia et
 longiora, 3-5 lineas lata, dura, tenacia, striato -
 sulcata, supra scabriuscula, subtus laevia, plana aut
 involuto - mucronata, pungentia, *inferiora* basi arti-
 culata, *summa* parva, angusta, *omnia* pagina supe-
 riore albida, inferiore viridiore. *Vaginae* glabrae,
 laeves, striato - sulcatae, *summa* interdum subven-
 tricosa. *Ligulae* loco margo albidus aut fuscus, va-
 ginarum inferiorum non raro ciliatus. *Spica* 4-9
 pollices longa, erecta stricta, compressa, rigida.

Rhachis subflexuosa, dentibus subremotis, alternis, internodiis ciliatis, altero latere subconvexis, altero planioribus, angulis 2 argutis oppositis. Ad singulos rhacheos gradus 1) *Spiculae sessiles* binae aut ternae, 2 nempe perfecte sessiles, et tertia si adest saepe subpedicellata, omnes adpressae, et compressae. *Gluma calycina* singularum spiculatum bivalvis; *valvula* angusto-lanceolatis, compresso-carinatis, valvulae corollaceis plerumque longioribus, interdum brevioribus, subaequalibus, plurimum 5-6 lineas longis, albido marginatis, supra basin attenuatam lineam dimidiata latis, pubescentibus et ciliatis, raro glabris, dorso, praecipue versus apicem subpungentem scabris. *Glumae corollaceae* in quavis spicula plerumque 2, aut 3, raro 4-5 distantes, *inferior* sessilis, *summa* pedicellata; *inferiores* hermaphroditas fertiles, *superiores* masculae: *valvula* exterior calycinis lato, villosiore, lanceolata, carinata, compressa, nervosa, acuminate, fere pungente, (spiculae inferioris *infima*), 4 lineas longa: *valvula* interior quadruplo vel triplo breviore, plana, membranacea, marginibus viridis nervosis, ciliatis, apice bifido. *Antherae* pallide flavae. *Stigmata* alba. *Squamulae* ciliatae. *Ovarium* pilosum. 2) *Spiculae pedicellatae*, unico nempe pedicello insidentes binae, ternae, raro 4-5 distantes; *inferior* sessilis, *summa* pedicellata, aut rarius *summæ* 2 conjugatae. In hisce spiculis cetera uti in sessilibus. *Pedicellus* et *Ax̄is* spiculatum compressi sunt, internodiis superne latioribus, viride submarginatis, ciliatis, angulis, praecipue insimorum internod., oppositis subsulcatis. — Versus apicem spicæ, *spiculae pedicellatae* saepe carent, aut vix manifestae sunt, imo in tota spica saepe non adsuunt.

Flor. Mess. — *Fruct.* *Matur.* *Fruct.* — *Vend.*
& Jun. — *& Sept.* *& Aug.* — *& Oct.*

Habit. in arena mobili, praecipue ad littora maris et fluviorum *Gall.* in Depart. de l'Hérault, des Landes etc. — *Germ.* in Holsat. Megap. Pomer. Brand. Bavar. Saxon.

2. Elymus caninus. "Elyme canin. Hunds-Haargras, ^{**}

Elymus caninus, spica nutante arcta, spiculis rectis, involucro destitutis, infimis geminis. Linn. ed. Reich. I, 233. ed. Gil. 3. 116. s. veg. ed. Pers. 129. Flor. suec. 2. 112.

Festuca nutans. Moench. meth. 191.

Bromus villosus. Scopoli. I. 83. var. β .

Triticum sepium. Lamarck. 1190. 12. Lestib. 230. caninum. Goian. hort. 58. fl. 128. Zinn. goett. p. 67. Schreb spic. p. 51. Grimm. isen. p. 268. Moench. hass. n. 101. Flor. d. Wetter. I. 168. Huds. angl. n. 58. var. β . Hall. n. 1426. radice perenni, spiculis solitariis longissime aristatis. Gmel. sib. I. p. 122. t. 27.

Gramen spica tritcea compacta, aristis longioribus. Scheuchz. agr. p. 10.

loliaceum, fibroso radice, aristis donatum. Tourn. 516. Vaill. par. 82.

? radice repente, s. gramen officinarum aristis longioribus donatum. Tourn. 516. Vaill. par. 81. t. 17. f. 2. Mapp. 128.

? angustiore folio et spica aristis
donatum. Vaill. par. t. 17.
f. 3.

caninum arvense. Magn. bot. 112. hort. 92.
non repens elatius, - spica aristata.
Moris. hist. 3 p. 177. s. 8.
t. 1. f. 2. Buxb. cent. 4. p.
29. t. 50.

maritimum spicatum. Magn. bot.
112. hort. 90.

aristis longis donatum. Mont.
prodr. 41. f. 26.

Wigg. prim. p. 11. Hoffm. 64 Roth. 1. 51. 2. 151.
Schrank. I. 383. Leers. 45. t. 12. f. 4. II. Reich. frc. 21.
Leyss. hal. n. 127. Doerr. nass. p. 16. Delarbre. 77.
Scholl. barb. n. 101. Jacq. vind. p. 20. Panz. Lin. 12.
519. Oestr. fl. I. 66. Krock. I. 205. Wibel. w. 103.

Radix perennis, repens, fibrosa, longa. *Culm*
erecti 2-5 pedales, glabri, nodis 5-6 purpureis, lae-
viter pubescentibus, donati. *Folia* supra subpubes-
centia aut glabra, plana, margine et subtus scabra,
basi auriculata, apice mucronata, 5-10 pollices lon-
ga, 2-5 lineas lata, glauco- aut laete viridia. *Vagi-
nae* longae, striatae, glabrae, interdum scabriuscu-
lae. *Ligulas* breves, obtusae. *Spica* 5-10 pollices
longa, 4-5 lineas lata, disticha, adultior nutans.
Rhachis tenuis, debilis, internodiis plurimis spicu-
lis brevioribus. *Spiculae* oblongae, juniores teretes,
adultiores ex tereti compressiusculae, erectae, ad-
pressae, sessiles, glabrae, absque aristis 8-9 lineas
longae, 1-1½ lineam latae, ex flavicante virides, so-
litariae, alternae, insimae autem saepe geminae. *Glu-
ma calycina* valvulis lanceolatis, striatis, absque
aristis 5-lineas longis, scabris, *arista* 1-1½ lineam
longa instructis. *Glumae corollaceae* 3-7, *valvula*
exteriore lanceolata, scabra, absque arista 5-6 line-

as longa, *arista* 5-8 lineas longa, saepe curvata, praedita: *valvula* *interiore* marginē viridi nervoso, valde ciliato. *Squamulae* basi hemisphaericæ. *Antheræ* flavae. *Stigmata* alba.

Var. dumetorum; spica erecta, arcta, spiculis compressis rectis, involucro destitutis, plerisque geminis. Hoffm. 64. Leers. t. 12. f. 4. I.

Differt: Culmo orgyali, inferne crassitie digitii minoris: *Foliis* latoribus, nudis, scaberrimis: *spica* densiore, arctiore, fere pedali, ad basin crassitie pollicis, semper erecta: *spiculis* majoribus, valde distichis, superioribus solitariis, inferioribus usque ad medium geminis, infimis saepe ternis. *Glumis corollaceis* 7-9. (habit. Herboni. — In hortum transplantata in sequenti anno in priorem transiit, secund. Leers.).

Obs. Varietas *spiculis* *solitariis* *differt* a *Triticu* *repente* cui valde similis: 1) *Aristis* *longioribus*. — 2) *Valvula* *interiore* *corollacea*, magis ciliata. — 3) *Spiculis* *longioribus*, angustioribus.

Verisimiliter haec plantæ *Triticumque repente* nil aliud quam progenies classificæ unius speciei sunt.

Flor. Praer. — Mess. — Matur. Mess. — Vend. — Mai. — Jul. — Jun. — Oct.

Habit. in cultis, collibus, sylvis, saepibus, aptaque dumetis tot. fere *Gall.* et *Germ.* — In Depart. Mont. Jovis circa Steinbach et Hartenburg: — Rheni et Mosellæ prope Stromberg.

AD TAB. XXXIII.

XXXII. *Triticum*. *Froment*. Weizen und Quekke.

Lian. ed. Gil. 2. 28. Tourn. 6. 292. 293. Venten.

2. 106. Lam. t. 49. Moench. meth. 174. Gaertn. 2. 8.
t. 81. f. 1.

Spicula in quovis rhacheos dente unica. *Gluma calycina* bivalvis, *valvulis* ovatis, obtusiusculis concavis. *Glumae corollaceae* 2-5, bivalves, intermediae aut superiores non raro *masculae*: *valvulis* subaequalibus, magnitudine calycinarum; *exteriorē* saepe ventricosa, aut obtusa, aut acuta, vel aristata, vel mutica, vel acumine parvo ex apice mutico instructa: *interiore* plana. *Filamenta* tria, capillaria. *Antherae* oblongae, bifurcatae. *Ovarium* obtusum, *Styli* 2 capillares, reflexi. *Stigmata* plumosa. *Gluma corollacea* aut semen fovea, dehiscens, demittens, aut adnata nec dehiscens. *Semen* unicum, oyato-oblongum utrinque obtusum, hinc convexum, inde sulcatum, raro trigonum.

Spica spiculis lateribus rhachim spectantibus.

1. *Triticum sativum*. Froment cultivé.
Weizen. *

Triticum sativum. Lamarck. 1190. I. Lestib. 230.
cereale. Schrank. I. 387. Fl. d. Wett. I. 165.
vulgare. Mästersteck. Bonn. 29.
aristatum. Dietr. I. 130.
I. — — *aestivum* (Froment d'Eté. Sommerweizen)
calycibus quadrifloris, ventricosis, glabris, imbricatis, aristatis. Linn. ed. Reich. I. 238.
ed. Gil. 3. 120. s. veg. ed. Pers. 131. hort. ups. 21. Mill. dict. n. I.
Gouan. hort. 57. flor. 128.
Moench. meth. 174. Delarb. 202.
Kerner. t. 292. Gärtner. t. 81.
Oestr. fl. I. 66.
locustis imbricatis, quadrifloris,
glabris

glabris aristatis. Hall. helv. n.

1422. ♂.

quadrifloris, basi subhirsutis, glumis exterioribus floralibus aristatis. Hall. in nov. Comm. goett.

5. p. 5. t. 1. f. 1.

radice annua, spica glabra aristata. hort. cliff.

24. Roy. lugdb. 70. Sauv. 39.

aristatum. Blackwell. t. 40. f. 4 - 5.

aestivum. C. Bauh. pin. 21.

aristis circumvallatum. Tourn. 512.

hybernum (Froment d'hyver. Winterweizen.) *calycibus quadrifloris ventricosis laevibus imbricatis submuticis.* Linn. ed. Reich. 1. 238. ed. Gil. 3. 120. s. veg. ed. Pers. 131. hort. ups. 21. Mat. med. p. 47. Mill. dict. n. 1. Blackwell. t. 40. f. 12. 3. Kerner. t. 243. Gaertner. t. 81. Goian. hort. 57. flor. 128. Delarbre. 202. Moench. 174. Oestr. fl. l. c.

radice annua, spica mutica. hort. cliff. 24.

Roy. lugdb. 70. Sauv. 39.

locustis imbricatis, quadrifloris, glabris, muticis. Hall. helv. n. 1422.

quadrifloris glabris, basi subhirsutis, glumis submuticis. Hall. in nov. Comm. goett. 5. p. 7. t. 1. f. 2.

hybernum aristis carens. C. Bauh. pin. 21.

Tourn. 512. Magnol. bot. 271.

hort. 200.

rufum grano maximo. C. Bauh. theatr. 358.

album. Gaertner. t. 81.

2. *turgidum* (Blé d'Angleterre. Englischer Weizen.), calycibus quadrifloris, ventricosis, villosis, submuticis, imbricatis, obtusis. Linn. ed. Reich. I. 239. ed. Gil. 3. 121. s. veg. ed. Pers. 131. Flor. d. Wetter. I. 165. calycibus quadrifloris, ventricosis, villosis, imbricatis, subaristatis. hort. ups. 21. Mill. dict. n. 2. *locustis* quadrifloris, hirsutis, basi pilosis. Hall. in. nov. C. goett. 5. p. 12. t. I. aristatum, spica maxima cineritia, glumis hirsutis nostras. Raj. 1232. radicc annua gluminis villosis. hort. ups. 24. Roy, lugdb. 70. spica villosa quadrata breviore, et turgidore. Moris. hist. 3. p. 176. s. 8. t. I. f. 14.
3. *compositum* (Ble de Miracle. Wunderweizen.), calycibus quadrifloris ventricosis, spica composita. Linn. ed. Reich. I. 239. ed. Gil. 3. 121. s. veg. ed. Pers. 131. Moeich. meth. 175. spica basi ramosa. Hall. helv. Tom. 2. p. 208. multiplici. Tourn. 512. Moris. hist. 3. s. 8. t. I. f. 7.
4. *spelta*, (Fausse Epeautre. Spelz.) calycibus quadrifloris truncatis, flosculis aristatis hermaphroditis, intermedio neutro. Linn. ed. Reich. I. 240. ed. Gil. 121. s. veg. ed. Pers. 131. hort. ups. 21. Kniph. orig.

cent. 2. n. 97. Lamarck. 1190. 6.
Gouan. hort. 57. fl. 128. Flor. d.
Wetter. I. 165. Dietr. I. 135. Ker-
ner. t. 290. Schrank. I. 389. Les-
tib. 230.

*Floribus quaternis, duobus secundis, glu-
minis adhaerentibus. Hall. helv. n.
1424.*

*locustis trifloris, calycibus truncatis, nu-
cronatis, cartilagineis semen con-
tinentibus. Hall. in nov. Comm.
goett. 5. p. 17.*

?*Hordeum flosculis lateralibus muticis involucro de-
stitutis.* Sauv. monsp. 39.

Zea dicoccus vel *spelta major.* C. Bauh. pin. 22. theatr.
412. t. 414. Moris. hist. 3. s. 8. t. 6. f. 1.
amylacea. Moris. hist. 3. s. 8. t. 6. f. 3.

Radix biennis et annua, fibrosa. *Culni* erecti,
2-4 pedales, teretes, glabri, laeves, superne nudi,
virides, nodis 5-6 viridibus aut purpureis, con-
tractis. *Folia* plana, saete viridia, 3-8 lineas lata,
pedalia et longiora, glabra, tota laevia aut margini-
bus vix scabriusculis, nervo dorsali albidiore praed-
ita. *Ligulae* prebreves, obtusae. *Vaginae* glabrae,
laeves, striatae, coloris foliorum. *Spica* crassa, to-
rosa, plus minusve quadrangularis et arcta, truncata,
2-4 pollices longa, 5-8 lineas lata. *Rhachis*
flexuosa, gradibus alternis, internodiis curvatis,
uno latere planis altero convexioribus, basi angusti-
oribus. *Spiculae* perfecte sessiles, plus minusve
imbricatae, ventricosae, crassae. *Gluma calycina*
valvulis ventricosis, subcarinatis, apice aut truncato
emarginato, aut ex truncato-acutiusculo, aut acuto,
aut acuminato et subaristato, marginibus mem-
branaceis. *Glumae corollaceae* 4-6, inferiores her-
maphroditae, fertiles, intermediae et superiores saepe

abortientes aut masculae; *summa* pedicellata: *valvulis* semen maturum vel demittentibus, vel arcte in-cludentibus: *exterior*e ventricosa, ad apicem nervosa, dorso convexo, apice mutico, acuminato, aut aristato, *arista* brevi aut longa, triquetra, latere interiore flava aut albida, 2 exterioribus viridibus angulis albidis, scabris, interdum fuscis aut nigrescentibus: *valvula* interiore dorso plana, binervia, nervis pubescentibus aut membrana pellucida auctis, marginibus latis inflexis. *Antherae* pallide flavae. *Stigmata* alba.

Progenies classificae: (Raçes. Rassen.)

I. *Hybernum*: *Valvulis* corollaceis muticis aut brevissime aristatis, semen demittentibus, *rachis* pubescente. (*vulgatum*.)

Var. I. annuum.

2. biennie.

3. *Valvulis* corollaceis glabris.
Statura majore.

4. *valvulis* ad basin pubescentibus.
Statura minore.

5. *provinciale*. *Spiculis* inferioribus muticis, superioribus aristatis.

6. *burgundicum*. *Spiculis* 5 floris, flore unico sterili, 4 fertilibus.

7. *pungens*, aristis superioribus brevioribus.

8. *canadense*; vix aristatum; seminibus magnis.

9. *rubrum*. *Spiculis* trifloris, *valvulis* breviter aristatis, et seminibus ex flavescente-rubellis.

10. album. *Valvulis acuminatis. Semine albido.*
11. *Siculum sive Valachiense. Spiculis 5 floris: 2 fertilibus, 3 sterilibus. Semina magna flava.*
12. *Monsbellicardense. Spiculis 5 floris: 2 fert., 3 sterilibus. Semen minus, albidius.*
13. *glaucum. Farina albida adspersum.*
14. *typhinum. Spica brevi, crassa, aristis mediocribus.*
15. *africanum. Spiculis 4 floris: 1 steril. 3 fertilibus.*
16. *Sardinicum. Spiculis 5 floris: 3 fert., 2 sterilibus. Valvulis pubescentibus violaceis.*
17. *capense. Spiculis 6 floris.*
18. *hispanicum. Aristis nigrescentibus.*
19. *agrigentinum, valvulis et aristis nigrescentibus.*
2. *Aestivum. Valvulis aristatis, vel muticis, culmo et foliis minoribus. Valvulis demittentibus. Rhachi pubescente. (Verisimiliter eadem progenies quam anteced.)*
- Var. 1. annuum.*
- 2. biennie.*
3. *Turgidum. Spica magis quadrata, villosiore, valvulis valde ventricosis. Spiculis quadrifloris, semen demittentibus. Rhachi pubescente.*
- Var. 1. annuum.*

2. bienne.

3. muticum.

4. aristatum.

5. rubrum. Valvulis et seminibus
rubellis.6. album. Valvulis ex viride —
albidis.

a) seminibus albidis.

b) seminibus rubellis.

7. barbatum. Aristis longis bar-
batis.

4. **Compositum.** Spica inferne ramosa. Rhachi pubescente. Spiculis 4floris. *Valvulis hermaphroditis* aristatis, semina demittentibus, masculis muticis.

Var. 1. Valvulis glabris.

2. — villosis.

3. Spica haud ramosa. — In locis
montosis siccissimis.

5. **Spelta.** Rhachi glabra. Spiculis 2-4floris. Glumis corollaceis 2-3 fertilibus, 1-2 sterilibus. Calycinis valvulis aut truncatis, aut acuminatis, et subaristatis. Glumis corollaceis, glabris, fertilibus breviter aristatis aut muticis, semen arcte includentibus, nec demittentibus, sterilibus semper muticis. Valvula interiore corollacea nervis dorsilibus membrana auctis. Spica compressiuscula. Foliis pallidioribus ex viridi - flavescensibus.

Flor. Praer. — Mess. Matur. Mess. — Fruct.

β. Maj. — β. Jul. β. Jun. — β. Sept.

Habit. in campis apud Baschkirs.

Colit. in Gall. et Germ., ubi omnes variet. occurunt.

2. *Triticum polonicum*. Froment de Pologne.
Pohlnischer Weizen. **

Triticum polonicum, calycibus bifloris nudis, flosculis longissime aristatis, racheos dentibus barbatis. Linn. ed. Reich. I. 239. ed. Gil. 3. 191. s. veg. ed. Pers. p. 135. Mill. dict. 5. Dietr. I. 135.

laevissimum, locustis trilloris, floribus calycem excedentibus, compressis, longissime aristatis. Hall. in. nov. Comm. goett. 5. p. 17. t. I. f. 16.

majus, longiore grano, glumis foliaceis, polonicum. Moris. hist. 3. p. 175. s. 8. t. I. f. 8.

glaucum. Moench. m. 174.

polonicum. Pluk. phyt. 231. f. 6.

Differt a Sativo:

Spica majore (glauco-cinerea): *Spiculis longioribus* 2-4floris, *glumis corollaceis* 2 fertilibus, et 1 aut 2 sterilibus. *Rachis* valde villosa. *Valvulis* oblongis sublinearibus; *calycinis* bidentatis; *corollaceis* hermaphroditis longissime aristatis, *aristis* inaequalibus: *masculis* muticis.

3. *Triticum monococcum*. Epeautre. Dinkel. **

Triticum monococcum calycibus subtrifloris, primo aristato, intermedio sterili. Linn. ed. Reich. I. 240. ed. Gil. 3. 122. s. veg. ed. Pers. 131. Lamarck. 1190. 4. Moench. m.

175. Dietr. I. 136. Kerner. t.
 291. Gärtn. t. 81. Roth. I. 50.
- spica disticha*, floribus ternis, fertili unicō, glumis tridentatis, florali aristato. Hall. helv. n. 1425.
- disticha*, locustae floribus ternis, binis aristatis. Hall. in nov. Comm. goett. 5. p. 18. t. 1. f. 17.
- involucris unifloris*, floribus aristatis, *spica disticha*. Sauv. monsp. 39.
- Goüan. hort. 57. fl. 128.*
- Hordeum distichum*, *spica nitida*, *Zea s. Briza nuncupatum*. Tourn. 513.
- Zea Briza dicta*, si *monococcus germanica*. C. Bauh. piu. 21. Moris. hist. 3. s. 8. t. 6. f. 2. Magn. bot. 282.
- Zea sive spelta*. Magn. hort. 292.
- monococcus*, *sive simplex*, *sive Briza*. Volck. norimb. 407.
- Briza monococcus Dodonaei*. Lib. ic. 31.
- Radix annua*, *fibrosa*, *alba*. *Culni* erecti 1 - 3 pedales, *glabri*, *teretes*, *firmi*, *laeves*, aut *infra paniculam scabriuscui*, *striati*, ad tertiam partem superne *nudi*, *nodis purpureis parvis pubescentibus 5 - 6 praediti*. *Folia ex viridi-flavescētia*, *pubescētia*, raro *glabra*, *subscabra*, *praecipue inferioria*, 3 - 4 *lineas lata*, 8 - 10 *pollices longā*, *striata*, *muicronata*, *plana*, ad basin *attenuata*, et hic *vaginis angustiora*, utrinque *macula triangulari notata*. *Vaginae glabrae*, aut, *praecipue ad nodos*, *hirsutae*, *semper ciliatae*, *striatae*, *laeves*, aut *scabriuscuae*. *Ligulae loco utrinque pili longi albi*. *Spica compressa disticha*, *subanceps*, *arcta*, *ex viridi brunea*, *aestate fusca*, *absque aristis 1 - 1 $\frac{1}{2}$ pollicem longa*, 3 - 4 *lineas lata*. *Rhachis gradibus alternis approximatis*,

internodiis flavis, nitidis, compressis, angulis ciliatis. *Spiculae* sessiles, arcte imbricatae et adpressae, 3 - 4 lineas longae, 2 lineas aut paulo magis latae, irregulariter quadrangulares, dorso piano, latere vero rhachim spectante piano excavato donatae, pubescentes, juniores splendentes. *Gluma calycina valvulis* aequalibus, pubescentibus, ciliatis, margine, membranaceo, nervis 2 dorsibus, angulos 2 dorsales constituentibus; dorso planis, subscabris, apice obtuso bidentato, dentibus inaequalibus, dente, respectu spicularum, exteriore longiore. *Glumae corollaceae* 2 - 4; *inferior* superiores vaginans et plerumque *fertilis*; *maturae* semen haud demittentes; 1-2-3 *steriles*, *summa* semper sterilis et pedicellata: *valvula exteriore* pubescente, ciliata, complicato compressa; *naviculari*, dorso scabriuscule, irregulariter ex ovato-lanceolata, albida, apice fusco bidentato, dentibus aequalibus; *glumae fertilis infra* apicem *arista* spica longiore, tenui, stricta, fusca, per letem compressa, scabra, donata; *glumae sterilis inferioris* *arista* brevissima, aut mucrone praedita, indeque quasi tridentata; *glumiarum summarum* mutica: *valvula interiore* membranacea, acuta, integerrima, glaberrima, diaphana, margine nervoso, membranaceo, lateribus complicato-reflexis. *Antherae sulphureae*. *Stigmata* alba. *Semen* flavescens, triquetro-compressum, hinc sulcatum.

Var. glumis fertilibus 2.

Flor. Praer. — *Mess.* *Matur. Mess.* — *Fruct.*
β. Maj. — *β. Jul.* — *β. Jun.* — *β. Sept.*

Cölitur passim in *Gall.* et *Germ.* — In Depart. Montis Jovis circa Werstadt, Alzey, Partenheim, Marienborn etc.

4. Triticum dicoccon. Epautre à deux grains.
Emmerkorn. ***

Triticum dicoccón, calycibus acutis quadrifloris, floribus omnibus aristatis, aristis florum duorum fertilium spiculis octuplo longioribus. Schrank.

I. 389.

Différat ab antecedente:

Spiculis, glumis corollaceis 2, fertilibus praeditis.
Valvulis calycinis acutis nec dentatis. Valvulis exterioribus corollaceis omnibus aristatis.

Colitur in Sueviae Ducat. Wirtemb.

5. Triticum repens. Froment rampant.
(Chiendent) Quekke. *

Triticum repens calycibus quadrifloris, subulatis acuminatis, foliis planis. Linn. ed. Reich. I. 241. ed. Gil. 3. 122. s. veg. ed. Pers. 131.

radice repente, foliis viridibus. Flor. lapp. 33. fl. suec. 105. 114. hort. cliff. 24. Mat. med. 48. Roy. lugdb. 70. Sauv. 39. Berg. frc. n. 326. Boehm. lips. n. 621. Zinn. goett. p. 66.

calycibus subulatis, trifloris, acuminatis.

Nonne erf. p. 279.

subulatis quadrifloris aristatis.

Nonne l. c.

dumerorum. Roth. Verz. I. p. 363. n. 314.

radicibus repentibus vaginosis, foliis hirsutis, locustis 5floris. Hall. helv. n. 1426.

repentibus, foliis hirsutis; locustis 8floris. Hall. helv. n. 1427.

- Bromus villosus.* Scopoli. I. 83. n. 23.
glaber. Scopoli. I. 84.
- Gramen caninum*, *arvense* s. *primum*, s. *Gramen*
Dioscoridis. C. Bauh. pin. p. 1.
theatri. 7. Scheuchz. agr. p. 5.
 ii. 2. Volck. norimb. p. 196.
 Hall. goett. p. 43.
repens vulgatus. Moris. hist. 3.
 p. 178. s. 8. t. 1. f. 8.
- loliaceum* *radice repente*, *sive gramen officinarum.* Tourn. 516. Mapp. 127. Buxb. hal. p. 145. Mont. p. 41. Rupp. jen. p. 304.
radice repente s. *gramen officinarum aristis donatum.* Vaill. par. 81. t. 17. f. 2.
- spica triticea*, *repente*, *vulgaris varietas*, *cum spica aristata.* Scheuchz. agr. p. 9. Raj. hist. 1255. angl. 3. p. 390.
compacta hirsutum aristatum. Scheuchz. agr. p. 9. n. 7.
- latifolium* *spica triticea compacta.* C. Bauh. p. 8. prodr. p. 18. theatr. 131. n. 1.
 Scheuchz. agr. p. 4. n. 1. Volck. norimb. p. 196. Moris. hist. 3. p. 177. s. 8. t. 1. f. 1. Buxb. hal. p. 147. Rupp. jen. p. 305. Hall. goett. p. 43. Zinn. goett. p. 67.
spica triticea divisa. C. Bauh. p. 8. prodr. p. 18. Hall. goett. p. 43.
- angustifolium* *spica triticea compacta.* C. Bauh. pin. p. 9. theatr. 131. n. 3.
avenaceum dumetorum spicatum. Dill.

giess. p. 117. app. p. 170. t. 15.
Rupp. jen. p. 116.

Lamarck. 1190. II. Leers. 44. t. 12. f. 3. Wigg.
prim. p. 11. Schrank. I. 389. Jacq. vind. p. 29. Gmelin.
sib. I. p. 118. t. 24. 28. Willd. prodr. n. 199. Plan. erf.
p. 62. Wilke gryph. n. 71. Roth. I. 50. 2. 148. Nekker.
p. 77. Marterst. 30. Fl. dan. t. 748. Blackw. t. 537.
Gmelin. tub. p. 34. Poll. I. 134. Schreb. graes. t. 26.
Delarb. 202. Leyss. hal. n. 174. Goilian. h. 57. fl. 128.
Grimm. isen. p. 268. Flor. d. Wetter. I. 166. Moench.
hass. n. 100. meth. 175. Herb. viv. pl. off. fusc. I. n. 8.
Dietr. I. 135. Murr prodr. n. 43. Hoffm. 65. Reich. 21.
Doerr. nass. p. 30. Weig. pom. p. 86. Lestib. 230.
Scholl. barb. n. 99. Matuschk. I. 79. Oestr. fl. I. 65.
Wibel. w. 107. Krock. I. 208.

Radix perennis longe lateque repens, articulata,
teres, alba, nitida, nodosa, squamis vaginan-
tibus, glabris aut pilosis, apice bifidis tecta, fibris
aucta. *Culmus* supra terram erectus, 2-4 raro — 6
pedalis, tenuis, laevis, aut infra paniculam sca-
briusculus (praecipue in varietate aristata), glaber,
simplex, nodis 5-6 purpureis aut viridibus donatus.
Folia 3-4 lineas lata, 5-9 pollices longa, plana, ad
basin saepe undulata, pilosa, aut inferne glabra, pa-
tentia, striata, superne et in margine scabra, laete
aut ex flavicante viridia, ad basin utrinque auricula
falciformi fusca instructa, acuminata, interdum un-
dulata. *Vaginae* glabrac, aut pilosae, teretes. *Li-*
gulæ loco margo albido, elevatus. *Spica* 3-8 pol-
lices longa, 4-5 lineas lata, obtusa, compressa, di-
sticha. *Rhachis* flexuosa, scabra, internodiis com-
pressis, glabra, aut pilosa. *Spiculae* plurimum so-
litariae, sessiles, juniores ex tereti - compressius-
culae, lanceolato - acutae, adultiores compressae,
absque aristis (si adsunt) 6-9 lineas longae, 1-1½
lineam latae, latero plano rhachi obversae, glabrae,

laete aut ex flavescenti-virides, raro purpureae; *terminalis* lateralibus directione contraria. *Gluma calycina valvulis* subaequalibus, 3 - 4 lineas longis, lanceolatis, lateribus inaequalibus, 5 nerviis, margine membranaceo, apice obtuso, aut acuminato, aut aristato, *aristis*, si adsunt, 1 - 2 lineas longis, aut infra apicem aut ex apice membranaceo provenientibus, dorso scabro aut laevi. *Glumae corollaceae* 5 - 12, *suprema* pedicellata et sterilis, *matura* semēn demittentes: *valvula exteriore* figura calycinarum, fere enervia, 4 lineas longa, margine aut scabriusculo aut laevi, ad basin membranacea, mutica aut *arista* 1 - 3 lineas longa, plerumque rubella, parum infra apicem, aut immediate ex eo armata: *interiore* breviore, margine viridi, nervoso, ciliato, scabro, infexo, apice truncato. *Squamulae* ex ova-to-lanceolatae, basi carnosae. *Antherae* longae, rubellae aut flavae. *Stigmata* alba. *Semen* oblongum, angustum, compressum.

Var. 1. muticum. *Spiculis* 3 - 5 floris, *rhachis* glabra. *Statura* minore.

2. aristatum; *statura* majore, *spiculis* plurifloris.

a. *rhachi* glabra.

b. — villosa.

3. spica ramosa.

4. spiculis inferioribus binis aut ternis.

5. spiculis approximatis aut remotioribus.

Flor. Flor. — Vend. *Matur.* Mess. — Brum.

β. Apr. — β. Oct. β. Jun. — β. Nov.

Habit. in agris, vineis, hortis, dumetis, ad vias. t. f. *Gall.* et *Germ.* — prope Moguntiam abunde.

Radix offic. *Radix graminis.*

6. Triticum juncetum. Froment joncier.

Binsen - Quekke. ***

Triticum juncetum, calycibus quinquefloris truncatis,
foliis involutis. Linn. ed. Reich.
I. 241. ed. Gil. 3. 132. s. veg. ed.
Pers. 131. Mont. 327. Amoen.
acad. 4. p. 266.
radice repente, culmo duro, foliis hirsutis,
locustis 5 floris. Hall. helv. n. 1428.

Cramen angustifolium spica tritici mutici simili.

C Bauh. pin. p. 9. prodr. p. 18. t. 17.
theatr. 132. Scheuchz. agric. p. 7.
Moris. hist. 3. p. 178. s. 8. t. 1. f. 5;
Vail. par. 81.

Festuca juncea. Moench. meth. 190.

Bromus truncatus. Scopoli. 1. 85. ?

Lamarck. 1190. 7. Roth. 3. p. 566. Flor. dan. t. 916.
Gmelin. sib. I. p. 118. n. 54. Hoffm. 65. Lestib. 230.
Krock. I. 212.

Tota planta glauco-viridis, farinaque tenuissima alba adspersa est, et vel fere glabra, vel villoso-rufa, occurrit.

Var. glabra.

Culmi pedales — 2 pedales, aut prostrati, adscendentia (nti ad littora maris baltici et septentrionalis) aut stricte erecti basi interdum incurviuscula; (prope Moguntiacum) glaberrimi, laevissimi, tenues, firmi, nodis 4-5 purpurascensibus, teretes et striati (prope Moguntiam) aut subangulosi (in Megap. Oldenb.). Folia digitalia — semipedalia, erecto-patentia, raro ad basin plana, plerumque tota convoluto-pungentia, recta, explanata 1-2 lineas lata, superiore pagina scabriuscula et villosa (certe circa Moguntiam) subtus laevissima, glaberrima, vix striata. Vaginae teretes, laevissimae, ad basin interdum

purpurascentes, glaberrimae. *Ligulae breves, truncatae. Inflorescentia uti in Triticum repente. Spica* 2-6 pollices longa, disticha, laxa, rigida, matura valde fragilis. *Rhachis* glabra, laevis, dentibus alternis, internodiis uno latere planis, curvatis. *Spiculae* 6 - 12 (raro purpurascentes), 4 lineas -- pollucem longae, glaberrimae, sessiles, adpressae, interdum basi squamula (a Roth observata) aucta. *Gluma calycina* valvulis acutis, per lentem obtusiusculis, interdum aristatis, *arista* per breve, ceterum glaberrimis, nervosis, striatis, aut subaequalibus, aut (sicuti ad Rhenum) inaequalibus, *interiore* nempe 3 lineas longa, angusta, lanceolata, *exteriore* latiore, ex ovato-lanceolata 2 lineas longa. *Glumae corollaceae* 3-7, *inferiores* 2-3 *hermaphroditae* fertiles, semen demittentes (sec. Moench. semi adnatae), *superiores* masculae, *summa* pedicellata; *valvula exteriore* calycinae majorisimili, aut obtusa, aut (raro) acuta et ex apice aristata, *arista* scabra, 2 lineas longa; *valvula* *interiore* minore, truncata, submembranacea, margine ciliato. *Antherae* *Hayæ*. *Stigmata* alba.

Habit. in arena mobili, pratis et aggeribus, sylvisque arenosis, dumetis *Gall.* -- haud procul *Lutet.* *paris.* etc. circa *Moguntiacum* in *sylva Gonzenhemensi*, propeque officinam laterariam inter *Moguntiacum* et *Mombach*, et in sic dicto *Sand am Caroussel.* *Germ.* in *Megapol.* *Oldenb.* *Siles.*

2. *Var. villosa.*

Differit ab antecedente;

Statura paululum majore. *Rhachi* scabriuscula et subvillosa. *Spiculis* pubescentibus.

Habit. in pratis arenosis, humidiusculis, haud procul *Moguntiam* in pratis *Gonzenhemensibus.*

Flor. *Praer.* — *Vend.* *Matur.* *Mess.* — *Brum.*

& Maj. — *& Oct.* *& Jun.* — *& Nov.*

7. *Triticum unilaterale*. Froment délicat.
Einseitige Quekke. ***

Triticum unilaterale, calycibus unilateralibus, alternis, muticis. Linn. ed. Reich. 1. 243. ed. Gil. 3. 124. s. veg. ed. Pers. 132.

tenellum. Lamarck. 1. 90. 13. Lestib. 231.

Goiian. flor. 129. Delarbre. 202.

Festuca, spica secunda recta, spiculis compressis subaristatis. Gerard. prov. 96.

Gramen sparteum monspeliacum, sive *capillaceo folio minimum*. Magn. bot. 120. hort. 92.

loliaceum minus, spica simplici. C. Bauh. pin. 8. prodr. 11. Magn. bot. 112. hort. 92.

foliis et spicis tenuissimis. Tourn. 517. Moris. hist. 3. p. 182. s. 8. t. 2. f. 3.

minimum. J. Bauh. hist. 2. p. 469.

pusillum unciale, panicula foliacea. Baccon. mus. 2. t. 57.

exile duriusculum maritimum. Raj, hist. 1287. Pluk. phyt. 32. f. 7. Scheuchz. agr. 272.

Radix annua, fibrosa. *Culmus spirhameus*, tener, filiformis, simplex, parum foliatus, nodis nigriscentibus donatus. *Folia involuto-setacea*, brevia, tertiam aut medium lineae partem vix lata, glabra, viridia, superiora vaginis breviora. *Spica secunda*, fere unilateralis, tenuis, saepe longitudine culmi. *Rhachis* plurimum torta. *Spiculae* 4-7, omnes sessiles, alternae, a se invicem distantes, adpressae, juniores teretiusculae, aetate compressae, parvae, facie *Poae*. *Gluma calycina valvulis inaequa-*

qualibus, altera angusta, obtusa, altera latior mucronata. *Glumae corollaceæ* 3-5, calycina latiores, *valvula exteriore* ovato-acuta, mutica aut breviter aristata.

Var. Spiculis pedunculatis, inferioribus interdum binis, ternis.

Habit. in agris humidiusculis, glareosis, argillosis, ad vias, inque maritimis *Gall.* — in Depart. du Cantal, de l'Allier, de la Creuse, de l'Herault, du Var, des Bouches du Rhône, de la Vaucluse etc.

8. Triticum maritimum. Froment maritime. Meer-Quække. ***

Triticum maritimum, calycibus multifloris, flosculis mucronatis, spica ramosa. Linn. ed. Reich. I. 242. ed. Gil, 3. 123. s. veg. ed. Pers. 131. Lamarck. 1190. 14. Dietr. I. 136. Roth. 3. 567. panicula coarctata secunda rigida, spiculis subsessilibus, unilatéralibns, multifloris, foliis planis submucronatis. Oestr. fl. I. 66.

Poa panicula ramosa, floribus alternis sessilibus. Roy. lpgdb. 274.

Festuca panicula coarctata secunda, spiculis rigidis, pedicellis acutangulis. Ger. prov. 94.

Gramen exile duriusculum maritimum, foliolis circumvolutis, subjunceis, brevibus. Pluk. phyt. 32. f. 7.

maritimum, paniculis asperis foliaceis. Boccon. mus. 2. p. 135. t. 95.

panicula loliacea. C. Bauh. p. 8;

Z

18. Tourn. 517. Moris. hist. 3.

s. 9. t. 2. f. 6.
caninum maritimum paniculatum. Raj.
hist. 1286.

loliaceum, panicula ramosa, maritimum.
C. Bauh. theatr. 130. Scheuchz. agr.
274. t. 6. f. 5.

Differit ab antecedente: culmo subramoso, ad basin geniculato; Foliis

longitudine culmi vix lineam latit. Vaginis purpu-
rascentibus; Spica secunda, rigida, ad basin parum
ramosa, indeque fere paniculata; Spiculis 8 - 10
floris rigidis, alternis, et solitariis, lanceolatis, ses-
silibus, compressis, basi crassiusculis, unilaterali-
bus.

Habit. in maritimis arenosis Galliae meridiona-
lis. *Germ.* in Insula Wangerogensi Dyn. Jeveran.
Austr.

9. *Triticum cristatum*. Froment crête. Kamm-
Quekke. ***

Triticum cristatum calycibus quadrifloris, aristatis,
spicis lanceolatis, imbricatis,
culmis pubescentibus. Schreb.
Graes. t. 23. vol. 2. p. 12.

Bromus cristatus, spiculis distiche imbricatis, sessi-
libus, depresso-sessilibus. Linn. ed. Reich.
1. 217. ed. Gil. 3. p. 106. syst. veg.
ed. Pers. 124. Amoen. acad. 2. p. 339.
Delarbre. 39.

Festuca culmo spicato, spiculis multifloris. Gmelin.
sib. I. p. 32. t. 50. f. 3.

Gramen triticum, spica latiore, compacta, crista-
tum. Buxb. cent. II p. 32. t. 50. f. 3.

Radix fibrosa, alba, tomentosa. Culmi pedales
et longiores, inferne prostrati, teretes, tenues, ner-

vosi, superne villosi, nodis fuscis glabris. *Folia* lata, plana, auriculata, nervosa, pallide viridia, superiore pagina pilosa, margine cartilagineo scabriusculo, acuta. *Vaginae cylindraceae*, striatae. *Ligulae brevissimae* obtusae. *Spica* 1 - $1\frac{1}{2}$ pollicem longa, compressa, lanceolata, disticha. *Rhachis* gradibus alternis, manifestis, internodiis pilosis. *Spiculae imbricatae*, sessiles, lanceolatae, compresae, glabrae. *Gluma calycina valvulis* aequalibus, distantibus, angustis, canaliculatis, glabris, pallide viridibus, lateribus inaequalibus, nervo dorsali catinante, apice aristatis, *arista* duplo longiore, alba, capillari. *Glumae corollaceae* 5, (superior sterilis) *valvulis* fere aequalibus, oblongis; *exteriore ventricosa*, glabra, dorso angulis eminentibus 3 praedita, apice acuto *arista* breviore capillari armata: *interiore membranacea*, glabra, margine ciliato, apice bifido. *Squamulae* ovales, acuminatae.

- Var.*
1. *Spica ramosa.*
 2. *magis glabra.*
 3. *villosior et glauca.*
 4. *mutica.*

Hab. in montosis *Gall.* — in Dep. du Puy du Dome. —

AD TAB. XXXIV.

XXXIII. Aegilops. Egilope. Bartgras. (Gramen Tourn.)

Linn. ed. Gil. 2. 196. Vent. 2. 103. Moench. meth.

175. Cav. hisp. t. 90. Gärtner. 2. 467. t. 175.

Gluma calycina bivalvis, valvulis maximis, ovatis, truncatis, coriaceis, striatis, ex apice aristatis, aristis (3-4) variis. Glumae corollaceae 3-4, bivalves, 2 laterales hermaphroditae aut feminineae, intermediae aut masculae aut hermaphroditae, saepè

abortientes: *Valvula exteriore* ovata *aristis* 3-4 terminata; *Valvula interiore* lanceolata, erecta, mutica, margine, reflexo. *Filamenta* 3, capillaria. *Antherae* oblongae. *Ovarium* obtusum. *Styli* 2 reflexi. *Stigmata* pilosa. *Squamulae* 2 lanceolatae. *Gluma calycina* et *corollacea* persistentes, semina tegentes, tandemque demittentes. *Semen* in quavis gluma fertili unicum, oblongum, convexum, hinc excavato-sulcatum.

Spica dura scopiformis.

1. Aegilops ovata. Egilope ovale. Kurzes Bartgras. ***

Aegilops ovata, spica aristata, calycibus omnibus triaristatis. Linn. ed. Reich. 4. 316. ed. Gil. 4. 571. s. veg. ed. Pers. 948.

spica ovata aristis breviore. hort. ups. 301.

Aegilops Dod. pempt. 73. Cam. epit. 928. f. 2. Roy. lugdb. 72.

Festuca graminea annua, seu *Aegilops* capitulis duris. Moris. hist. 3. s. 8. t. f. 50.

sive *Aegilops* narbonensis. Lob. 34.

Phleum *Aegilops*. Scopoli. 2. 55.

Gramen sive *Festuca* altera capitulis duris. C. Bauhin. pin. p. 10. theatr. 151. Magn. bot. 122. hort. 92.

spicatum durioribus et crassioribus locustis
spica brevi. Tourn. 519. Scheuchz.
agr. II. t. 1. f. 2.

Gärtn. 2. 467. t. 175. Goiani. hort. 515. fl. 132. Dallib. par. 304. Sauv. monsp. 40. Lamarck. 1193. I. Delarbre. 3. Moench. m. 175. Dietr. 3. 229. Roth. in Uster. ann. St. 4. p. 42. Lestib. 231. Oestr. fl. I. 58.

Tota planta glauco - aut albido - viridis. *Radix* biennis, fibrosa. *Culmi* tenues, fere filiformes, debiles, curvato - erecti, inferne non raro decumbentes, ramosique, ramis spiciferis, laeves, semipedales — pedales, glabri, teretes, nodis incurvis flavescentibus 3 - 4 instructi. *Folia* 1 - 2 pollices longa, 1 - 2 lineas lata, erectiuscula, plana, villosa, scabriuscula, ad basin plicata et paululum auriculata. *Vaginae* laeves, teretes, glabrae. *Ligulae* loco margo elevatus, pilosus. *Spica* torosa, disticha, absque aristis 6 lineas -- pollicem longa, scoparum instar aristata. *Rhachis* flexuosa, gradibus alternis, interno-diis compressis, latere dorsali ex albido - et viridi-striatis, pubescentibus, interiore flavescente. *Spiculae* 3 - 4 sessiles, adpressae, absque aristis 4 - 5 lineas longae, lineas 2 - 2 $\frac{1}{2}$ latae, alternae, ovatae, ventricosae, ex albido - viridique striatae, pubescentes, obtusae. *Gluma calycina* valvulis aequalibus, perfecte oppositis, nervis albidis donatis, scabriusculis, coriaeeis, concavis, 2 - 3 lineas longis, 2 - 2 $\frac{1}{2}$ latis, apice truncato lato, *aristis* 2 - 4, planis, submembranaceis, viridibus, marginibus albis, scaberrimis, inaequalibus, circiter pollicem longis armatis. *Glumae corollaceae* 3 - 4, calycina longiores angustiores, summa pedicellata, et interdum mutica; *valvula* exteriora infra medium glabra, enervia et flavescente, 4 lineas longa, 1 $\frac{1}{2}$ - 2 lineas lata, ex apice truncato *aristas* 2 - 4, calycinis similes, sed minores, tenuiores, et paulo breviores emittente: *valvula* interiora plana, ex ovato-lanceolata, membranacea, dia-phana, margine nervoso ciliata. *Squamulae* ciliatae. *Antherae* flavae. *Stignata* alba.

Flor. aestate. *Matur.* Autumno.

Habit. in arvis, pratis mont. incultis, *Gall. me-*
ridionalis. — *Germ.* in Carn.

2. *Aegilops elongata*. Egilope alongée. Laén-
geres Bartgras. ***

Aegilops elongata. Lamarck. 1193. 2. Lestib. 231.
triuncialis, spica aristata, calycibus infe-
rioribus bariastatis. Linn. ed.
Reich. 4. 316. ed. Gil. 4. 571.
s. veg. ed. Pers. 948. Mant. 501.
spica oblonga aristata, aristis geminis ter-
nisve. Schreb. graes. 80. t. 10. f. 1.
Festuca altera, capitulis duris, spica triunciali,
C. Bauh. p. 10.
Gramen spicatum durioribus et crassioribus aristis,
spica longissima. Tourn. 519.
Scheuchz. agv. 12. Vaill. par. p. 82.
t. 17. f. 1.
secalinum spica longiore. Mont. prodr. p. 61.
sive *Festuca altera*, capitulis duris, spica
longiore. Magni. bot. app. alt. 311.

Kniph. orig. cent. II. n. I. Goian, hort. 515.
flor. 134. Dietr. 3. 229. Roth. I. c. Oestr. fl. I. 58.

Differt ab antecedente:

Radice perenni. Foliis longioribus, radicalibus,
caespitosis. *Vaginis marginibus saepe ciliatis. Spica*
circiter 3 pollices longa. *Spiculis 5-6*, remotioribus,
parum angustioribus. *Glumis viridi-purpu-*
rascentibus. *Aristis* multo longioribus, in quavis
valvula calycina et corollacea exteriore 1-4 plerum-
que vero 2.

Flor. et Matur. cum priore.

Habit. in locis aridis, incultis. Germ. in Carn.
et Austr. litt. *Gall.* — circa Lutet. paris. et in De-
part. de l'Herault, et des Bouches du Rhône etc.

AD TAB. XXXV.

XXXIV. Lolium. Ivroie. Lolch.
(Gramen Tourn.)

Linn. ed. Gil. 2. 105. Lam. t. 48. Moerich.
meth. 53. Flor. Dan. t. 160.

Glumae calycinae inferiores et superiores plerumque univalvæ, raro bivalvæ, ^{rarus} summa semper bivalvis: *valvula* rhachi opposita, subulata, persistente, altera, si adest, rhachi adpressa. *Glumae corollaceæ* 3-15, bivalves, inter valvulam calycinam et rhachim *valvulis* inaequalibus, aristatis aut muticis; *exteriore* angusto-lanceolata, convoluta, obtusiuscula, aut acuminata: *interiore* breviore, linearis, obtusiore. *Squamulae* 2 ovatae. *Filamenta* 3, capillaria, gluma corollacea breviora. *Antheræ* oblongæ. *Ovarium* obtusum. *Styli* 2, capillares, reflexi. *Stigmata* plumosa. *Gluma corollacea* aut semen fovens, dehiscens, demittens, aut valvula interiore semini adnata non demittens. *Semen* unicum, oblongum, hinc convexum, inde planum sulcatum.

Spica plerumque disticha, compressa, spiculis plus minusve compressis, planis, alternis, *lateris* angusto altero rhachi adpressis.

1. *Lolium perenne*, Ivroie vivace. (Fausse
Ivroie.) Gemeiner Lolch. *

Lolium perenne, spica mutica, spiculis compressis multifloris. Linn. ed. Reich. I. 230. ed. Gil. 3. 115. s. vég. ed. Pers. 128.

spica mutica. Nonne erf. p. 284. Zinn. goett. p. 67.

lanceolata, spiculis alternis sessilibus multifloris muticis subremotis:
Gmelin. tub. p: 32.

spicis muticis, radice perenni. hort. cliff.
24. flor. suec. 104. 110. Berg. frc.
p. 326. Boehm. lips. n. 645. Roy
lugdb. 69.

mediis latioribus. Zinn. Goett. p. 68.
compressis radice perenni. fl. lapp. 32.
radice perenni locustis octifloris con-
tiguis. Hall. helv. n. 1416.

Gramen loliaceum angustiore folio et spica (s. *Phoe-*
nix *Dioscoridis*). C. Bauh. pin.
p. 9. theatr. 127. Tourn. 516.
Magn. bot. 120. hort. 92. Scheuchz.
agr. p. 25. 26. Mont. prodr.
p. 19. Buxb. hal. p. 146. Raj.
hist. 2. p. 1263. Dill. giess.
p. 118. Moris. hist. 3. p. 182. t. 2.
f. 2. Zannich. ven. p. 117. t. 61. f. 1.
Rupp. jen. p. 196. Hall. goett. p.
42. Mapp. 128.

spica lata ex plurimis spicis dupli-
versu dispositis constante.
Scheuchz. agr. p. 29. app. t. 2.f. 1.
spicis brevibus et latioribus, com-
pressis. Vaill. par. 81.

minus supinum spica multiplici.
Magn. bot. 120. hort. 92.
latifolium spica angustiore. C. Bauh.
p. 9. prodr. p. 60. theatr. 127.
Scheuchz. agr. p. 27.

Lamarck. 1186. 2. Scopol. 90. Gmelin. tub. p. 31.

Reyg. ged. 1. p. 47. n. 1. Plan. erf. p. 61. Leers. 46.
t. 12. f. 1. Weig. pom. n. 82. Hoffm. 62. Roth. I. 52.
2. 153. Goüan. hort. 55. flor. 127. Jacq. vind. p. 19.
Nekker. p. 70. Matuschk. 1. 74. Willd. prodr. n. 188.
Delarbre. 124. Wilke gryph. n. 67. Flor. d. Wetter.
1. 152. Reich. frc. 22. Moench. hass. n. 105. Meth.

§3. Dietr. 1. 125. Flor. dan. t. 740. Schreb. 2. 79. t.
 37. Scholl. barb. n. 102. Doerr. nass. p. 23. Engl.
 bot. 315. Lestib. 328. Wigg. prim. p. 11. Gunn.
 norw. 2. n. 709. Vibel. w. 103. Oestr. fl. 1. 66.
 Krock. 1. 202. Schrank. 1. 379.

Radix perennis, fibrosa, densa, subrepens.
Culmi caespitosi, juniores decumbentes, adscendentes, adultiores erecti, pedales -- bipedales, inferneteres, superne subcompressi, inodis 3-4 olivaceis aut purpureis praediti. *Folia* plana, 4-6 pollices longa, 2 lineas lata, glabra, mucronata, laete viridia, nervo albido dorsali, et ad basin auriculis fuscis plicatis notata; *culmea* supra scabra, et latiora; *radicalia* caespitosa, angustiora, laevia. *Vaginae* colore foliorum, laeves, striatae, glabrae. *Ligulae* perbreves, truncatae, incisae. *Spica* disticha, plerumque subnutans, compresso-plana, 3-10 pollices longa, 4 lineas lata. *Rhachis* subflexuosa, gradibus alternis, internodiis fere quadrangularibus, latere dorsali planiusculo et subsulcato, latere opposito excavato-canaliculata, angulis scabriusculis, latere dorsali in junioribus non raro subvillosa. *Spiculae* compressae, planae, alternae, muticae, glabrae, ovatae, virides aut ex viridi-albidae, raro purpurascentes, 5-7 lineas longae, 1½ - 2 lineas latae, canali racheos adpressae. *Gluma calycina* spicularum adpressarum univalvis, *valvula* mutica, rhachi opposita, lanceolata, obtusiuscula, spicula breviore, 3 lineas longa, vix lineam lata, striata, glabra; *spiculae ultimae* terminalis bivalvis, *valvulis* inaequilibus, inferiore triplo breviore. *Glumae corollaceae* 4-13, *valvulis* muticis, exteriore nervosa, lanceolata, apice membranaceo, obtusiusculo, glabra, 2 lineas longa; interiore margine nervoso viridi ornata, planiore, interdum exteriore paulo longiore, et acutiuscula. *Squamulae* ovatae, obtusae. *Antherae*

purpureae, aetate flavae. *Stigma alba.* *Semen dissecdens non adnatum.*

- Var. 1.* *Spica brevi ovata, secunda, saepe incurva, spiculis approximatis sibi contiguis, 10 - 13 floris.* — (ad viam ante portam Raimundi.)
- 2.* *Spica ramosa, ramis spicatis, spiculis approximatis, ad ramificationes interdum geminis. Valvula calycina majore.* — (Circa Kleinwinterkheim.)
- 3.* *Spiculis viviparis.*
- 4.* *Spica ramosa, spiculis approximatis, elongatis, ultra pollicaribus, 10 floris, floribus distantibus. (Glumis corollaceis valde remotis.)* (Prope Moguntiam ad viam rhenanam (Chaussée) versus Mombach.)
- 5.* *Spiculis remotioribus aut approximatis.*
- 6.* *Valvula calycina nulla.*
- 7.* *Culmo spithameo.*

Flor. Praer. — Vend. *Matur.* Mess. — Brum. β Maj. — β Oct. β Jun. — β Nov.

Habit. ad vias, margines agrorum, muros, inversuris, vineis, pratis, pascuis tot. fere *Gall.* et *German.* — Prope Moguntiacum abunde.

2. *Lolium tenui.* Ivroie mince. Schmaler Lolch. **

Lolium tenui, spica mutica tereti, spiculis trifloris.
Linn. ed. Reich. I. 231. ed. Gil. 3. 115.
s. veg. ed. Pers. 128.

Graminis loliacei angustiore folio et spica Varietas.
C. Bauh. p. p. 9.

Gmelin. tub. p. 31. Hoffm. 65. Schrank. I. 381.
Roth. I. 52. 2. 154. Delarbre. 124. Willd. prodr. n.

189. Flor. d. Wetter. I. 152. Panz. lin. 12. 516. Oestr. fl. I. 66.

Differt a priore (cujus verisimiliter Varietas est): statura graciliore: Culmo siliformi: Foliis angustioribus: Ligula fusca: Spica angustiori, ex teretiusculo-compressa, pauciflora: Spiculis minoribus, angustioribus, teretiusculis: Glumis corollaceis 3-5.

Flor. Praer. — Therm. Matur. Mess. — Fruct. β. Maj. — β. Aug. β. Jun. — β. Sept.

Habit. in herbidis, collibus, limosis, ad margines agrorum et viarum, interque segetes: Gall. — circa Lutet. paris. et in Depart. du Cantal, de l'Allier, de la Creuze etc. circa Maguntiacum in declivitate loricae extimae. — Germ. in Austr. Brand. Brem. Virtemb. Wetterau, Siles. Bavar. Salisb. Hass. Hannov.

3. *Lolium temulentum*, Ivroie. Betäubender Loich. *

Lolium temulentum, spica aristata, spiculis compressis multifloris. Linn. ed. Reich. I. 231. ed. Gil. 3. 115. s veg. ed. Pers. 128.

verum Gesneri. Moris. hist. 3. s. 8. t. 2.

spica aristata. Flor. suec. 2. n. 109. Nonne. erf. p. 284. Zinn. goett. p. 67. spicis aristatis, radice annua. hort. cliff. 23.

Roy. lugdb. 69. Berg. frc. p. 325. Boehm. lips. n. 646.

gramineum spicatum, caput tentans. J. Bauh. hist. 2. p. 437. Dill. giess. p. 155. annum. Lamarck. 1186. 3. Lestib. 228.

locustis dissitis. Hall. helv. n. 1420.

Lolium, Mathiol. comm. p. 41. Cam. epit. p. 198. Dod. pempt. p. 538. Tabern. hist. p. 550.

Graepalia temulenta. Schrank. I. 382.

Gramen loliaceum spica longiore s. Lolium Dioscoreidis. C. Bauh. pin. 9. theatr. 121.
Maynol. bot. 120. hort. 92. Scheuch. agr. p. 31. t. 1. f. 7. E. F. Volek. norimb. p. 196. Hall. goett. p. 43.
spica longiore aristas habens.
Tourn. 516. Mont. 39. t. 18. Mapp. 128. Buxb. hal. p. 146. Rupp. jen. p. 305.
spica longiore sine aristis. C. Bauh. pin. p. 2. Buxb. hal. p. 146. Rupp. jen. p. 305.

Goüan illustr. p. 5. hort. 55. Flor. 127. Roth. I. 53. 2. 154. Dietr. t. 126. Oeder. t. 160. Schreb. Graes. 2. 74. t. 36. Willd. prodr. n. 190. Wilke. gryph. n. 68. Leers. 47. t. 12. f. 2. Wigg. prim. p. 11. Poll. I. 131. Plan. erf. p. 61. Gunn. norw. I. n. 163. Murr. prodr. p. 43. Delarbre. 124. Jacq. vind. p. 19. Hoffm. 63. Scopol. I. 90. Moench. hass. n. 106. Flor. d. Wetter. I. 153. Doerr. nass. p. 23. Reich. 22. Leyss. hal. n. 129. Matuschk. 75. Weig. pom. n. 83. Moench. meth. 53. Gmelin. tub. 31. Willich. syll. n. 10. Wibel. w. 103. Oestr. fl. I. 66. Krock. I. 203.

Radix annua, fibrosa, subtomentosa, albida.
Culmi 2-4 pedales, rigidi, erecti, scabri, teretes, nodis 3-4 purpureis notati. *Folia plana, supra scabra, mucronata, auricula falcata fusca utrinque ad basin donata, 8-10 pollices longa, 3-4 lineas lata, laete aut ex flavescenti-viridia, nervo albido dorsali instructa.* *Vaginae striatae, scabrae, superne pilis raris nonnunquam ciliatae.* *Ligulae breves, subcrenulatae.* *Spica 5 pollices-sesquipedem longa, 6 lineas lata, plana, compressa, disticha.* *Rhachis scabra, flexuosa, dentibus alternis, internodiis qua-*

drangularibus, uno latere canaliculatis. *Spiculae* alternae sessiles, ovatae, oblongae, glabrae, virides et albidae, laeves aut lateribus scabriusculis, compressae, absque aristis 6-8 lineas longae, 2 lineas latae. *Gluma calycina* spicularum lateralium plerunque univalvis: *valvula* mutica, laevi, mucronata, nervosa, 7 lineas longa, 1 lineam lata (longitudo spiculae, aut longiore aut parum breviore): *Spiculae terminalis* semper bivalvis *valvulis* aequalibus. *Glumae corollaceae* 5-9, ovato-oblongae, *valvulis* calycina brevioribus, *exteriore* 3 lineas longa, nervosa, ovata, obtusa, concava, margine albido, membranaceo, sub apice non raro bilido membranaceo *aristam* rectam, scabram, 2-10 lineas longam, emitte: *interiore* plana, obtusa, nervis marginalibus viridibus. *Squamulae* ovatae. *Antherrae* lavae. *Stigmata* alba. *Semen valvulae interiore corollaceae* adnatum haud discedens.

Var. 1. Valvulis corollaceis muticis.

2. Graepalia. valvulis calycinis 2, (praecipue spicularum inferiorum) *altera interiore* multo minore, oblonga, obtusa, convexa subbisida, aut integrerima (uti circa Maguntiam), canali rhacheos impressa.

3. Culmo vix pedali incurvo. (In ruderatis Temp. St. Crucis.)

4. Ramosa, ramis sterilibus. in eodem loco.

Flor. Praer. — Therm. *Matur. Therm.* — Vend. 6. Maj. — 6. Aug. 6. Jul. — 6. Oct.

Habit. inter segetes, in ruderatis, totius sere

Gall. et Germ. — In Depart. Montis Jovis circa

Lautern, Maguntiacum, Hechtsheim, Werstadt. — Circa Hallgarten (Rhenogav) plantam spica sesquipedali inter avenam inveni. —

4. *Lolium multiflorum*. JVroie multiflore.
Vielblütiger Lolch. ***

Lolium multiflorum. Lamarck. 1186. 4. Lestib. 228.
remotum. Schrank. I. 382.

spica subaristata mutica, spiculis
compressis multifloris re-
motis. Hoffm. 63.

? perenne locustis dissitis quadrifloris. Hall.
helv. n. 1428.

? spica aristata, spiculis teretibus, aristatis,
sexfloris. Gmelin. tub. 32.

? *Gramen loliacei*, angustiore folio et spica, varie-
tas, spica tereti angustissimo.
Scheuchz. agr. 28.

? *loliaceum*, angustiore folio et spica, aris-
tis donatum. Vaill. paris. t. 17.
f. 3.

Differet a temulento:

Culmo glabro. *Spica* interdum semipedali, sae-
pe incurva. *Spiculis* glabris valvula calycina exterio-
re longioribus, 10 - 15 floris. *Glumis corollaceis*,
breviter aristatis, inferioribus saepe muticis. *Val-
vula calycina* interiore, si adest, lanceolata integra.

Var. 1. Spiculis remotis.

2. — paucifloris, *glumis corolla-*
ceis 4 - 8.

Flor. et Matur. cum priore.

Habit. in agris, Germ. Bavar. — *Gall. in De-
part. de la Somme.*

AD TAB. XXXVI.

XXXV. Secale. Seigle. Roggen.
(Korn.)

Linn. ed. Gil. 2. 27. Tourn. t. 294. Lam. t. 49.
Gaertner. 2. 9. t. 81. f. 2. Venten. 2. 107. Moench.
meth. 174.

Gluma calycina in singulis gradibus rhacheos unica, bivalvis: *valvulis* oppositis, distantibus, erectis, fere linearibus, acuminatis, glumis corollaceis minoribus. *Glumae corollaceae* 2, sessiles, *hermaphroditae*, raro quoque *tertia mascula*, intermedia pedicellata: *valvula exteriore* rigidiore, subventricosa, acuminata, ciliata, compressa, *arista* immediate ex apice longa terminata: *interiore* plana, lanceolata. *Filamenta tria*, capillaria, extra glumas corollaceas pendula. *Antherae oblongae*, furcatae. *Ovarium obtusum*. *Styli duo*, reflexi, villosi. *Stigmata plumosa*. *Gluma corollacea* semen fovens, dehiscens, demittens. *Semen unicum*, oblongum, subcylindricum, uno latere subsulcatum, nudum, hinc acuminatum.

1. Secale cereale. Seigle commun. Gemeiner Roggen. *

Secale cereale, glumarum ciliis scabris. Linn. ed. Reich. I. 234. ed. Gil. 3. 117. s. veg. ed. Pers. 130. hort. ups. 22. Dietr. I. 126. Schrank. I. 384. Hall. helv. n. 1421. Mairerst. 26. Lestib. 228. Gaertner. I. c. Lamarck. 1189. Gotian. hort. 56. flor. 127. Flor. d. Wetter. I. 155. Moench. meth. 174. Delarb. 181.

Secale. Fuchs germ. ic. 439. Blackw. t. 424. Moris,

1672.

hist. 3. s. 8. t. 2. f. 1. Cam. epit. 190. Dod.
cereal. p. 50.
glumis floralibus glabris, ora denticulata.
Holl. in nov. comm. Goett. 6. p. 12.
hybernum vel majus. C. Bauh. piu. p. 22.
theatr. 425. Tourn. 513. Magn. bot.
235. hort. 182.
vernun vel minus. C. Bauh. pin. p. 23.
Tourn. l. c. Magn. l. c.

Radix biennis, fibrosa, albida. Culmi teretes,
erecti, 2 - 6 pedales, striati, laeves, glabri, infra
paniculam vero plerumque villosi et scabriuscui,
nodis contractis, purpureis 5 - 6 notatis. Folia 2 - 5
lineas lata, 4 - 15 pollices longa, plana, aetate, certe
superiores, convoluta, glabra, ad apicem scabra, mu-
cronata, striata, laete viridia, nervo albido dorsali
donata. Vaginae striatae, laeves, glabrae. Ligulae
perbreves, truncatae. Spica 3 - 7 pollices longa,
4 - 5 lineas lata, compressiuscula, disticha. Rhachis
flexuosa, gradibus approximatis, alternis, interno-
dijis compressis flavescentibus, angulis oppositis bar-
batis. Gluma calycina valvulis aequalibus, opposi-
tis, quadrantem lineae vix latis, 4 - 5 lineas longis,
mucronato-acuminatis, scabris, glabris. Gluma
corollaceae valvula exteriore lanceolata, 5 - 6 lineas
longa, naviculariter compressa, carina dorsali sca-
berrima, 7 nervia, glabra, marginibus versus apieem
ciliis rigidis, scabris, ex apice arista scabia, 1 - 4
pollices longa, instructa. Valvula interiore dorso-
plicato-sulcato, lateribus inflexis ovarium aut semen
foventibus, nervis dorsalibus 2 donata, apiceque
bifido, longitudine valvulae exterioris. Antheras
flavae. Stigmata alba.

Var. 1. Spicis ramosis.

2. Vernum. Statura minore, radice
annua.

Flor.

Flor. Flor. — Praer.. *Matur.* Mess. — Therm.
 β. Apr. — β. Jun. β. Jun. — β. Aug.

Habit. in Creta.

Colitur in Gall. praecipue vero in German.

2. *Secale villosum.* Seigle vélu. Haariger
 Roggen. ***

Secale villosum glumarum ciliis villosis, squamis
 calycinis cuneiformibus. Linn. ed.
 Reich. I. 235. ed. Gil. 3. p. s. veg.
 ed. Pers. 130. Goian. hort. 56. flor.
 127. Dietr. I. 127.

Gramen spicatum secalinum, glumis villosis in aristas
 longissimas desinentibus. Tourn.
 518.

secalinum maximum. Park. theatr. 1144.
 creticum spicatum secalinum glumis ciliari-
 bus. Tourn. cov. 39. Buxb. cent. 5.
 p. 21. t. 41.

Habit. in Gall. Depart. de l'Herault. —

AD TAB. XXXVII.

XXXVI. *Cynosurus. Cretelle. Kamm-*
gras. (*Gramen Tourn.*)

Linn. ed. Gil. 2. 24. Venten. 2. 105. Moench. m.
 220. Lam. t. 47. Gaertn. I. 5. t. 1. f. 8. Oed. t. 233.

Bracteae interstinctae, laterales, saepe triphyllae,
 interdum magnae, integrae aut pinnatifidae aut pecti-
 niformes. *Gluma calycina* bivalvis, *valvulis* sub-
 aequalibus, linearibus, acuminatis. *Glumae coroll-*
laceae 2 - 4, calycina longiores, bivalves: *valvulis*
 inaequalibus: *exteriore* concava, longiore, aristata;
interiore plana mutica aut aristata. *Squamulae* 2, lan-
 ceolato-acuminatae. *Filamenta* tria, capillaria. An-

A a

therae oblongae. Ovarium obtusum. Stylus 1 bifidus aut 2, villosi, reflexi. Stigmata simplicia. Gluma corollacea semen arcte obvolvens, denum demittens. Semen unicum, oblongum, utrinque acuminatum, hinc sulcatum.

Spica aut Panícula spiciformis secunda.

1. Cynosurus echinatus. Cretelle hérissée.

Igelartiges Kammgras. ***

Cynosurus echinatus, bracteis pinnato-paleaceis aristatis. Linn. ed. Reich. I. 198.

ed Gil. 3.93. s. veg. ed. Pers 119.
dentibus bracteae lanceolato-linearibus.
Hall. helv. n. 154.

Grainen cum cauda leporis aspera. J. Bauh. hist. 2.

p. 474.

alopecuroides, spica aspera. C. Bauh. pin.
p. 4. Scheuchz. agr. p. 80. t.
2. f. 8. D. Volck. norimb. p.
196. Magnol. bot. 116. hort. 91.

alopecurum spica aspera. Barr. rar. t. 123.

spicatum echinatum, loculis unam partem
spectantibus. Tourn. 519.

panicum spica aspera latiore. Moris. hist.
111. s. 8. t. 4. f. 13.

Lamarck. 1185. 2. Sauv. 39. Gaertn. l. c. Roth. I.

53. 2. 157. Scopoli. I. 68. Roy. lugdb. 64. Goian. hort.
47. Oestr. fl. I. 67. flor. 126. Moench. meth. 200. De-
larbre. 72. Dietr. I. 103. Kröcker. I. 155.

Radix perennis (Lamarck.) annua (Moench.)
fibrosa. *Culmus pedalis-bipedalis; nodis 4-5 incur-*
vis, purpureis, contractis, laevis, glaber, teres,
striatus, basi plerumque ramosus. Folia plana, gla-
bra, oblique inserta, erecta, valde nervosa, nervis
albidis, 4-10 pollices longa, 2-4 lineas lata, scabra,
lanceolata, mucronata. Vaginae glabrae, nervosae,

sublaxae, ventricosae, praecipue superior. *Ligulae oblongae, obtusae, subdecurrentes, tenuissimae.* *Panicula spiciformis, erecta, semiuncialis, et uncialis, densa, ovata, secunda, paulo longior, quam latior. Pedunculi alterni, breves, rigidi, divisi.* *Bracteae 2-3, alternatim pinnatae, spiculis longiores, laxae, pinnis paleaceis utrinque 6-8 patulis, lanceolato-aristatis, aristis capillaribus longis.* *Spicula in quovis pedunculo solitaria, aut gemina, 2 lineas absque aristis longa, vix unam lata.* *Gluma calycina valvulis oblongis, membranaceis, diaphanis, tenuissimis, laxis, apice valde acuminatis, glumis corollaceis longioribus, subaristatis.* *Glumae corollaceae 2-3, valvula exteriore quinquenervia, rigidiuscula, lanceolata, concava, immediate ex apice aristam rectam, setaceam, scabram, valvula duplo longiorem saepe rubellam emittente: valvula interiore mutica, planiuscula, acuminata.* *Styli duo.*

Habit. in incultis et ad margines agrorum *Galliae meridionalis.* *Germ.* in Austr. Siles. ?

2. *Cynosurus cristatus.* Cretelle à épi long.
Langaehriges Kammgras. *

Cynosurus cristatus, bracteis pinnatifidis. Linn. ed.
Reich. I. 198. ed. Gil. 3. 93.
s. veg. ed. Pers. 119. hort. cliff.
493. flor. suec. 81. 88.

bracteis pinnatis retusis. Hall. helv. n.
1545.

Phleum cristatum. Scop. I. 57.

Gramen pratense cristatum s. *spica cristata laevi.* C.
Bauh. p. 3. prodr. p. 8. theatr. 42.
Magn. bot. 114. hort. 91. Buxb. hal.
p. 145. Schleuchz. agr. p. 79. Dill.
giess. p. 89. Volck. norimb. p. 197.
Hall. goett. p. 51.

- cristatum. J. Bauh. hist. 2. p. 468. Lob. adv.
 2 p. 467. Raj. angl. 3. p. 4. p. 49.
 hist. 2. p. 1269.
 anglicum. Park. theatr. 1159. Moris.
 hist. 2. p. 194. s. 8. t. 4. f. 6.
 spicatum glumis cristatis. Tourn. 519. Rupp.
 jen. p. 307. Mapp. 131.
 loliaceum spicae locustis cristatis. Mont.
 prodr. p. 42. ic. 23.
 typhinum plantaginis spica glumosa hetero-
 malla digitata majus et minus.
 Barr. n. 1186. 1187. ic. 27. f. 1. 2.
 Lamarck. 1185. 3. Reich. frc. 22. Oeder. t. 238.
 Sauv. 37. Wigg. prim. p. 8. Leers. 47. t. 7. f. 4.
 Scholl. barb. n. 104. Schrank. 1. 349. Jacq. vind. p. 20.
 Goian. hort. 47. flor. 126. Nonne. erf. p. 283. Plan.
 erf. p. 57. Reyg. 1. p. 45. Murr. prodr. p. 42. Mat-
 tuschk. 1. 60. Willd. prodr. n. 159. Hoffm. 48. Lestib.
 227. Roth. 1. 53. 2. 155. Weig. pom. n. 66. Stilling-
 fl. t. II. p. 390. Schreber. graes. 69. t. 9. f. 1. Kerner.
 oek. I. t. 86. Moench. flor. n. 107. meth. 200. Boehm.
 lips. p. 637. Engl. bot. 316. Grimm. isen. p. 268. De-
 larbre. 72. Leyss. hal. n. 130. Wilke. gryph. n. 54.
 Roy. lugdb. 64. Doerr. nass. p. 15. Poll. 1. 67. Dietr.
 1. 101. Berg. frc. p. 323. Flor. d. Vetter. 1. 115.
 Panz. 12. 374. Gimel. tub. 25. Zinn. goett. p. 70. Nekker.
 p. 57. Oestr. fl. 1. 67. Wibel. w. 110. Krock. 1. 151.
 Radix annua, fibrosa. Culmi pedales - 3 peda-
 les, tenues; erecti, basi incurva saepe ramosi, tere-
 tes, laeves, laete virides, nodis 3 - 5 contractis, pur-
 pureis aut viridibus. Folia pauca, plana, fere laevia,
 vix margine versus apicem scabriuscula, laete viri-
 dia, glabra, 2 - 6 pollices longa, lineam 1 - 2 lata.
 Vaginae colore foliorum, glabrae, laeves, striatae,
 teretes. Ligulae breves, truncatae, integrae aut fis-
 sae, margine prominulae, decurrentes. Panieula

spiciformis, densa, aetate laxior, 2-4 pollices longa, 3-4 lineas lata, unilateralis secunda, florens semiteres, obtusa. *Rhachis* lateraliter flexuosa, dorso plano, lateribus pubescentibus, striata, glabra, laevis. *Pedunculi* breves, solitarii, alterni, duplice serie unilateraliter positi, raniosi, pedicellis brevissimis, 3-5 spiculas gerentes. *Bracteae* ad quemvis pedunculum ternae, raro 2 subsessiles, spiculis distichis sterilibus similes, alternatim pinnatae, obverse ovatae, convexo-planae, spicularum longitudine aut parum longiores, *intermedia* minor: *pinnis* 5-15 angustis, subulatis, fere setaceis, albidis, nervo viridi intermedio ornatis, membranaceis, mucronatis, scabris, approximatis, *axi* subflexuoso insidentibus. *Spiculae* in pedunculis sessiles et pedicellatae, oblongae, ovatae, subaristatae, compressae, distichae, 2 lineas longae, lineam — $\frac{1}{2}$ latae, fasciculatae. *Gluma calycina* spicularum fere longitudine, *valvulis* subaequalibus, lanceolatis, mucronatis, angustis, compressis, albidis, carina dorsali viridi notatis: *exteriore* ab *interiore* basi remota, sursum arcuata, magis scabra. *Glumae corollaceae* 2-5; *valvula exteriore* oblonga, concava, glabra, viridi, margine angusto albido laterali, ex apice *arista* perbrevi armata: *interiore* oblonga, plana, membranacea, albida, apice integerrimo acuto, (bisido. Scopoli. Fl. d. Wett.) glabro (piloso: Schreb.) *Squamulae* lanceolatae. *Antherae* violaceae. *Stigmata* alba.

Var. I. Viviparus. *Spica* ovata, ventricosa, spiculis foliaceis.

2. *Peduncularum seriebus* 3-4.

Flor. Praer. — *Therm. Matur.* *Therm.* — *Vend.*

$\beta.$ *Maj.* — $\beta.$ *Aug.* — $\beta.$ *Jul.* — $\beta.$ *Oct.*

Habit. in pratis, pomariis, pascuis, tam siccis quam humidis, ad vias et margines agrorum totius fere *Gall.* et *German.* — In nostro Depart. circa

Lautern; Werstadt: Maguntiam, in pratis Budenhemensibus et prope Gonzenheim.

**3. Cynosurus coeruleus. Cretelle bleue.
Blaues Kammgras.***

Cynosurus coeruleus, bracteis integris. Linn. ed. Reich. I. 199. ed. Gil. 3. 94. s. veg. ed. Pers. 120. hort. cliff. 495. flor. suec. 82. 99. sesleria. Schrank. I. 350.

Aira foliis planis spica subovata densa. Jacq. vind. p. 15.

Sesleria. Adanson. p. 15. Fam. pl. P. 2. p. 496. coerulea. Ard. spec. 2. p. 18. t. 6. f. 3. 4. 5. Scop. I. 63.

locustis trifloris imbricatis, flore tricorni. Hall. hely. 1446.

Gramen glumis variis. C. Bauh. pin. p. 18. prodr. p. 21. Scheuchz. agr. p. 83. t. 2. f. 9. A. B.

versicolor. J. Bauh. 2. 466.

spicatum glumis variis. Tourn. 519. Mapp. 130. Rupp. jen. p. 307.

phalaroides, montanum, spica versicolore. Mont. prodr. 48. Seguier. ver. app. 153.

Lamarck. 1185. 8. Grimm. isen. p. 268. Roy. lugd. 64. Weber. spic. p. 4. Goian. ill. 4. Plan. erf. p. 57. Hoffm. 48. Boehm. lips. n. 636. Flor. d. Wetter. I. 116. Jacq. vind. Vol. 2. p. 66. Roth. I. 5. 3. 2. 156. Dietr. I. 102. Murr. pr. 42. Leyss. hal. n. 132. Delarb. 72. Hopp. pl. rar. cent. I. Berg. frc. 323. Panz. 12. 379. Oestr. II. I. 67. Wibel. w. 110. Krock. I. 153.

Radix annua, fibrosa. Culmi caespitosi, decumbentes, adscendentibus, et erecti, tenues, maxi-

ma ex parte nudi, 7-10 pollicés longi, compressi ad basin tantum nodosi. *Folia* lanceolata, plana, carinata, striata, obtusa, glabra, laevia, margine vero indurato-scabra, 1-1½ lincam lata, sicca con-duplicata. *Vaginae* perbreves, glabrae. *Ligulae* brevissimae, suscae, lacerae. *Panicula* spiciformis, ex tereti compressa, oblonga, ovata, aequalis, obtusa, uncialis, imbricata, densa, nitida, actate coerulescens, aut violacea. *Pedunculi* breves, *Spiculae* pubescentes, ovatae. *Bracteae* ovales, membranaceae, integrae, mucronatae. *Gluma calycina* val-vulis ovatis, subaristatis. *Glumae corollaceae* 2-3, valvula exteriori tridentata, interiori bidentata. *Semen* hirsutum.

Flor. — *Therm.* *Matur.* — *Vend.*

β .Apr. — β .Aug. β .Jul. — β .Oct.

Habit. in pascuis uliginosis, pratis, ad salinas, rupes, *Gall.* et *Germ.*

4. *Cynosurus microcephalus*. Cretelle à épis courts. Kleinaehriges Kammgras. ***

Cynosurus microcephalus, bracteis integris subdentatis, corollis aristatis, spicis subrotundis. Wulf. in Jacq. misc. 2. 71. Hoffm. 49. Hopp. pl. rar. cent. I.

Differet ab antecedente:

Bracteis subdentatis. Valvula corollacea exteriore multiaristata, (interiore biaristata). Spica exovoato subrotunda (coerulea). Planta triplo aut quadruplo priore tenerior.

Flor. Messid. — *Therm.* — β .*Jun.* — β .*Aug.*

Habit. in alpinis Germ. Austr. Carinth. Tyrol.

Salisb. — *Salisbury* — *Salisbury Plain* — *Salisbury Cathedral* — *Salisbury House*

5. *Cynosurus sphaerocephalus*. Cretelle à epi sphérique. Kugelaehriges Kammgras. ***

Cynosurus sphaerocephalus bracteis integris, spicis globosis. Linn. s. veg. ed. Pers. 120. Jacq. misc. Vol. 2. p. 71. ic. pl. rar. t. 20. Oestr. fl. I. 69.
bracteis ovatis stibdenta-
tis, corollis acuminati-
tis, spicis sphaericis.
Hoffm. p. 49. Hopp. pl.
rar. cent. I.

Differt a coeruleo:

Bracteis subdentatis. *Spica sphaerica*, albida aut dilute coerulecente, involucrata; *Involucro universalis triphyllum*; suborbiculari, dilute coerulecente. Tenerior, brevior angustior *coeruleo*.

Flor. Therm. — Fruct. — & Jul. — & Sept.

Habit. in alpinis Germ. Carinth. Carn. Salisb. Tyrol.

AD TAB. XXXVIII.

XXXVII. Lamarckia. Lamarcke. Lamarckie. (*Cynosurus L. Gramen Tourn.*)

In memoriam celeberrimi auctoris Florae gallicae.

Moench. meth. 201.

Differt a Cynosuro.

Spiculis sterilibus pendulis, muticis, ad basin fertilium Involucra aut Bracteas mentientibus.

Panicula spiciformis subsecunda.

Lamarckia aurea. Lamarcke dorée. Goldne Lamarckie. ***

Lamarckia aurea panicula composita erecta, subse-

cunda, ramis adpressis, spiculis pendulis etc. Moench. meth. 201.

Cynosurus aureus spiculis sterilibus pendulis ternatis, floribus aristatis. Linn. ed. Reich. I. 201. ed. Gil. 3. 95. s. veg. ed. Pers. 121. Murr. prod. p. 138. Kniph. orig. cent. 8. n. 37. Lamarck. 1185. 5. Dietr. I. 103.

Gramen barcinonense, panicula densa aurea. Tourn. 523. Shaw. afric. 232. f. 232.

panicula pendula aurea. Bauh. pin. 3. theatr. 32. Scheuchz. agr. 149.

sciurum s. *alopeturum minus*, heteromalla panicula. Barr. rar. 1180. t. 4.

Radix annua, fibrosa. *Culni articulati*, foliati, 4 - 7 pollices longi, decumbentes. *Folia* glabra, 2 - 3 lineas lata. *Vaginae* glabrae. *Ligula* alba. *Panicula* spiciformis, angusta, 2 - 3 pollices longa, subsecunda densa, nitida, lava, erecta. *Spiculae steriles* ternae aut plures, pendulae, muticae, loco bractearum aut involucri ad basin pedunculorum fertilium: *glumis calycinis* bivalvibus; *valvulis* linearibus, acuminatis, *glumas* plurimas *corollaceas* univalves, alternas, steriles, ovatas, concavas involventibus. *Pedunculi* breves biflori: *Spiculas fertiles* 2, pedicellatas gerentes. *Gluma calycina* fertilium quoque bivalvis; *valvulis* linearibus, longitudine corollacearum. *Glumae corollaceae* spiculorum fertilium 2 - 3 bivalves, *inferior* sessilis, *altera* pedicellata, et *tertia*, si adest, minor, intermedia, quoque pedicellata, abortiens aut plane sterilis: *valvula exteriore* ovata, ex apice (infra apicem Linn.) aristam longissimam capillarem, rectam, emittente. *Semen* oblongum, *gluma* *corollacea* *tectum*.

Habit. ad rupes: *Gall.* in Depart. du Var, de la Vaucluse, des Bouches du Rhône, des basses Alpes.

AD TAB. XXXIX.

XXXXIII. *Cenchrus.* Racle. Stachelgras. (*Gramen* Tourn. *Panicastrella* Mich.)

Linn. ed. Gil. 2. 195. Vent. 2. 102. Moench. meth. 251. Gärtner. 2. 4. t. 80. f. 3. Schreber. graes. 2. p. 9. t. 23. f. 1. 1752. *Gramen* Tourn. 1753.

Involucra plura, laciniata, echinata, in *capitulum* congesta, singula sessilia, spiculas 3-4 includentia. *Gluma calycina* corollacea brevior, bivalvis; *valvulis* membranaceis, lanceolatis, concavis, acuminatis. *Glumae corollaceae* 2-3, altera hermaphrodita, altera mascula, raro etiam hermaphrodita, bivalves: *valvulis* membranaceis, lanceolatis, concavis, acuminatis, carinatis, muticis: *interiore* minore. *Filamenta* tria, capillaria, longitudine valvularum. *Antherae* sagittatae. In *hermaphroditis*: *Ovarium* subrotundum, *stylo* filiformi, longitudine filamentorum, *stigmatibus* 2 oblongis, plurinosis, patentibus instructum. *Semen* subrotundum, nec incrustatum, nec rectum.

Spica capitata.

Cenchrus capitatus. Racle capitée. Kopfför-
miges Stachelgras. ***

Cenchrus capitatus spica ovata simplici. Linn. ed. Gil. 4. 570. ed. Reich. 4. 314. s. veg. ed. Pers. 947. Roy. lugdb. 71. Lamarck. 1192. 1. Goian. hort. 515. flor. 131. Sauv. m. 42. Dietr. 3. 240. Loefl. it. 172.

Gramen spica subrotunda echinata. C. Bauh. pin. 7.

pr. 16. Tourn. 519. Scheuchz.
agr. 74. Magnol. bot. 116. hort 91.
montanum echinatum, tribuloides, capitatum.
Col. ecphr. I. p. 340. t. 338.
f. 1.
minimum spica globosa echinata. Barr. rar.
1176. t. 28. f. 1. t. 862. f. 2.

Radix annua, fibrosa. Culmi uninodes, tenues, teretes, ad basin tantum foliati, 2-6 pollices longi. Folia glabra 1-1½ lineam lata, omnia radicalia, caespitosa. Spica capitata, viridis, echinata, brevis, ex ovato-globosa, 4-5 lineas lata.

Habit. in locis aridis Gall. meridionalis.

AD TAB. XXXX.

XXXIX. Tragus. Trage. Bocksgras. (Cenchrus L. Gramen Tourn.)

Haller. helv. 2. p. 203. Moench. meth. 53. Allion. ped. II. p. 241. Schreb. Graes. I. 45. t. 4.

Difffert a Cencho:

Involucris nullis. Glumae calycinae univalves, tot in spicula quot glumae corollaceae: valvula rigida, muricata, acuminata. Glumae corollaceae (aut melius spiculae) 4-5, in quavis spicula (spica minore) bivalves, superiores abortientes; valvulis tenuerrimis, majore rhachim, minore valvulam calycinam spectante. Antherae rotundae. Semen gluma corollacea demittente tectum, ovale, compressum.

Panicula spiciformis fere linearis (spica composita racemosa, spicis minoribus, spiculas 4-5 gerentibus).

Tragus racemosus. Trage. Bocksgras. ***

Tragus. Hall. helv. n. 1413.

muricatus. Moench. m. 53.

1495

Cenchrus racemosus, panicula spicata, glumis muri-
catis, setis ciliaribus. Linn. ed.
Reich. 4. 312. ed. Gil. 4. 570.
s. veg. ed. Pers. 947. Schreb.
Graes. l. c. Goüan. hort. p. 514.
flor. 131. Sauv. 40. Dietr. 3240.
linearis. Lamarck. 1192. 2.
panicula spicata. Guett. obs. I. p. 188. Da-
lib. par. 305.
Phalaris maricata. Forsk. aeg. p. 202.
Agrostis panicula spicata, glumis echinatis. Mant.
501. Gerard. gallop. p. 83.
Gramen caninum maritimum spica aspera. Bauh. pin.
2. prodr. 2. theatr. p. 16. Moris.
hist. 3. p. 177. s. 8. t. 2. f. 4.
maritimum spicatum, echinatis
glumis. Barr. rar. 1169. ic. 718.
maritimum spica echinata. Scheuch-
zer. agr. p. 76. t. 1. f. 7. C. D.
Magn. bot. 114. hort. 91.
spicatum locustis echinatis. Tourn. 519.
parvum echinatum. J. Bauh. hist. 2. p. 467.
Mont. prodr. p. 64. Seg. ver. I. p.
359. Gesn. fasc. I. p. 120. t. 3. f. 20.
Radix annua, fibrosa, longa. *Culmi* decum-
bentes, repentes, ad nodos purpureos glabros saepe
radicantes et ramosi, dein adscendentibus, semipedem-
pedem longi, geniculati, teretiusculi, glabri, nitidi,
albidi et rubelli, usque ad paniculam tecti, basi squa-
mis incisis donati. *Folia* 1 - 2 pollices longa, 2 - 3
lineas lata, curvato-patentia, saepe undulata, firma
lanceolata, glabra, marginibus aculeis parvis rigidis
curvis ciliata, pallide aut glauco-viridia, nervo dor-
sali albido instructa. *Vaginae inferiores* compressae,
carinatae, foliis breviores, *superiores* teretes, *summa*
subventricosa. *Ligulae pilosae*. *Panicula* spicifor-

mis simplex (aut si mavis *spica* composita racemosa) erecta, linearis, 2-5 pollices longa, cylindracea, laxa, interrupta. *Rhachis* angulata, saepe torta, pubescens. *Pedunculi* breves, setis mollibus brevibus donati, simplices, spiculam unam (spicam minorem) gerentes, medii ab infimis vagina summa tectis remoti. *Spiculae* (*spicæ minores*) ovatae, compressae, 4-5 florae (*spiculis minoribus unilloris*, alternis, 4-5, *superioribus brevioribus*, abortientibus compositæ.) *Axis* brevis, angulatus. *Gluma calycina* ad basin cuiusvis glumæ corollaceæ (*spiculae*) univalvis, *valvula* minore corollaceæ adpresso, cartilaginea, oblonga, ovata, ventricosa, acuminata, nervosa, nervis eminentibus, aculeis mollibus recurvis diaphanis, aetate rubris, armata. *Glumæ corollaceæ* (*spiculae*) bivalves; *valvulis* inaequalibus, tenerimis, ciliatis; *majore* ventricosa, ex viridi-albida, acuminata, longitudine valvulae calycinae: *minore* latere dorsali valvula calycina tecta, angustiore, lanceolata, albida, margine infexo. *Squamulae* oblongæ acutæ. *Antheræ* rotundæ, albidae. *Stigmata* albida. *Semen* ovale, compressum, glabrum, flavescens.

Habit. in arenosis, lapidosis, siccis, sepibus, ruderatis, maritimis, ad margines agrorum. *Gall.* — circa Lut. paris. in Depart. de l'Hérault, de la Vaucluse, des basses Alpes, des Bouches du Rhône, du Var, etc.

AD TAB. L.

XXXX. Zea. Mays. Mays. (Mays.
Tourn.)

Linn. ed. Gil. 2. 254. Venten. 2. III. Moench. m. 176. Tourn. t. 303-305. Lam. t. 749. Gaertn. I. 6. t. 6. f. 9.

Gramen Monoicum.

1) *Panicula mascula terminalis.* *Gluma calycina* bivalvis; *valvulis* ovato-oblongis muticis. *Glumae corollaceae* 2, altera non raro neutra, bivalves; *valvulis* oblongis, muticis, longitudine glumae calycinae. *Squamulae* 2, compressae, brevissimae. *Filamenta* 3, capillaria. *Antherae* quadrangulares, quadritoculares, apice dehiscentes. *Pistillum* nullum. (Raro inter spiculas masculas *hermafroditae* fertiles occurunt.)

2) *Spicae femineae plures, axillares, inferiores.* *Gluma calycina* bivalvis; *valvulis* squamiformibus, subrotundis, crassis, brevissimis, margine membranaceo ciliato: *exteriore* crassiore. *Gluma corollacea* 1, bivalvis; *valvulis* membranaceis, latis, brevissimis. *Squamulae* 2. *Ovarium* exiguum. *Stylus* filiformis, longissimus, pendulus: *Styli* omnes uniti, et in fasciculum terminalem collecti sunt. *Stigma* simplex, versus apicem pubescens. *Rhachis* maxima, longa, cylindracea, fungoso-suberosa, alveolata (undique floribus aut semi-nibus, per series longitudinales digestis, tecta, in qua *semina* incrustata, solitaria, approximata, nitida, colorata, in tota gente graminea maxima, aut ex rotundato-compressa, basi angulata, aut rotundato-subreniformia, compressiuscula, ad dimidiam partem demersa, glumaque calycina et corollacea cincta sunt.

694. Zea Mays. Froment des Indes. Welschkorn. *

Zea Mays. Linn. ed. Reich. 4.97. ed. Gil. 4.492.
s. veg. ed. Pers. 885. Schrank. I. 309.
Lestib. 237. Goian. hort. 481. flor.
III. Kerner. t. 351. 352. Sauv. 40.

Flor. d. Wetter. 3. 302. Schkuhr. t.
283. Panz. 12. 644.

Zea. Hort. cliff. 437. ups. 281. Roy. lugdb. 73.
Blackw. t. 547. w. b. Kniph. orig. cent. 3. n. 99.
Mays Zea. Gaertn. l. c. Moench. meth. 176.
acostae. Magn. hort. 132.
granis anreis. Tourn. p. 531.

Frumentum indicum Mays dictum. Bauh. pin. 25.
theatr. 490. Moris hist. 3. sect. 8.
t. 13. f. 1. 2.
turicum. Fuchs. hist. germ. ic. 473.
Camer. epit. 186. Dod. pent. 509.
Tabern. Krb. 616. sqq.

Radix annua, ramosa, fibrosa, albida. Culmus articulatus, plenus, 3-6 pedalis, crassus, teres, inferne latere altero sulcatus, laevis, glaber, striatus. Folia latissima, pedalia — bipedalia, lanceolata, basi angustata, utrinque macula triangulari fusca aut flava notata, striata, scabriuscula, margine ciliato, scabro, pubescentia, aut subhirsuta, nervo dorsali ad basin valde crasso instructa, laete viridia. Vaginae ad apicem utrinque auricula et pilis praeditae, ceterum glabrae, angulato-striatae, laeves, subcarinatae. Ligulae brevissimae, obtusae, integrae, aut lacerae. Panicula mascula circiter pedalis, erecta, terminalis, multiflora. Rhachis pubescens, subteres. Pedunculi solitarii, et binii, ternii, alterni, semiverticaliter erecti, pubescentes aut villosi, compressiusculi, subramosi. Spiculae sessiles et pedicellatae, 4-5 lineas longae, 3 lineas latae, ovato-oblongae, viridiuseculae. Gluma calycina valvulis subaequalibus, diaphanis, pubescentibus, 7-11 nerviis, margine pellucido: valvula exteriore acuminata. Glumae corollaceae calycina minores, valvula exteriore majore, latiore; interiore apice integro, raro bifido. Spicae femineae plerumque tres, axillares, ju-

*niores intra vaginam foliaceam, spadiceae, crassae.
Reliqua generis.*

*Var. 1. Respectu figurae et coloris seminum
(vid. char. gen.) seminibus flavis,
rubris, violaceis, nigris, punctatis,
variegatis etc.*

*2. Spiculis pluribus paniculae masculae
hermaphroditis, fertilibus.*

*Flor. Therm. — Fruct. Matur. Vend. — Brum.
f. Jul. — f. Sept. f. Sept. — f. Nov.*

Habit. in America.

*Judigena facta ubique fere in Gall. et Germ.
colitur.*

Typis VARRENTRAAPP et WENNER.

Emendanda et errata corrigenda.


Pag. lin.

- 6 — 22 loco Octobr. leg. Sept. loco Dec. leg. Oct.
17 — 16 -- virides leg. viride.
17 -- rufa leg. rufum.
21 penult. -- albo leg. alba
22 antepenult. deleat.) penult. et ult. loco Rothiae
l. Fibichiae.
23 -- 19 loc cerule l. caule. 25 ult. l. Rudimentum
27 -- 5 ante uti pone ceterum.
29 — 7 et 8 deleatur aut
31 — 18 loco tabulosa l. tubulosa.
41 -- 31 -- Aug. l. Jul. — & Sept.
48 -- 8 -- subamplectentem l. subamplectente.
53 — 2 post werth. add. p. 125.
— antepen. post albida pone,
60 — 31 loco amplexicantes l. amplexantes
62 — 8 -- Poll. l. Pall.
70 — 33 post aequalibus adde aut
71 — 28 -- officinali adde; lin. 29 post panicu-
lae loco. pone,
72 — 7 -- linearis lege linearis.
73 — 19 -- suprema leg. supremi. et penult. loco
spicaliter l. spiraliter.
82 — antepen. post sunt adde)
85 — 31 ante am pone et
88 — 23 post 55 adde Roth I. 31. 2. 82. Scopoli I.
60. Schrank. I. 324. Hoffm. 34.
Kopp. pl. rar. c. I.
89 — 7 loco corollacea l. calycina et 10 loco caly-
cina lege corollacea.
92 — 12 -- longas l. longos et 13 loco expilatos
l. capitatos
95 — 19 -- Dactylo lege Panico. lin. 28. post Rheni
adde prope Maguntiam im Sande
et Harteberge.
100 — 14 post vero pone nullae.
106 -- antepen. loco aristata lege aristatam
108 -- 23 post pedicellis deleatur, 24 post subsecun-
dae ponatur, 25 post arista deleatur,

Pag. lin.

- 123 -- 21 loco Touan. l. Tourn.
124 -- 26 -- exteriore l. exteriore et 28 loco proveniente l. proveniens
131 -- 5 -- longior l. longiore
132 -- 15 -- plurifera l. pluriflora.
136 -- 27 post neutrius pone , et deleatur conicum
138 -- 17 et 18 lege uti vaginae striatae sursum scabra.
138 -- 28. 151. lin. 34 et 154 lin. 5. lege semiverticilos
alternos
149 -- 9 loco 25, leg. 20
157 -- 2 -- fuscentes lege fuscescentes
159 -- 7 -- formantes lege formantia et lin. 26
loco inclinato l. inclinata
166 -- 32 post ita pone plerumque
185 -- 12 loco goett. lege gotl.
190 -- 16 post decumbentes pone unciales - 'palmares
192 -- 26 loco glabris l. glabri
197 -- 20 -- juniores l. juniora
213 -- 20 -- $\frac{1}{2}$ lege $1\frac{1}{2}$.
218 -- penult. loco patentes lege patentia
229 -- 13 post 6 deleatur ,
230 -- 32 loco ic. nro. 18.
238 -- 23 post florentes deleatur , et lin. penult. loco
inter in
263 -- loco et lege vix
272 -- ultim. deleatur , 273 lin. 3 loco ; , et lin. 24
post siccata deleatur ,
in Lit. R error typograph. in numerat. pag.
313 -- 33 loco distichis lege distiche positis
332 -- 21 post pungente adde , et post) deleatur ,
338 -- 32 post l'ausse deleatur .
345 -- 15 loco sterilibus lege steriles
352 -- 30 -- mediam lege dimidiam.
368 -- 14 -- notatis lege notati.

Alii errores, e. g. interpunctionis, minoris momenti. nec notatu digni sunt. Plures ex transcriptione necessaria manuscripti, partem tantum operis majoris formantis, originem traxerunt.





New York Botanical Garden Library

QL 34 .A1 K5

Koeler, Georg Ludwi/*Descriptio Graminum*

gen



3 5185 00063 8336

